

российск, близ Геленджика); **ЗЗ**: Туап.-Адл. (окр. Сочи, Хосты), Абх. (окр. Сухума, Гагры), Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.

Указан для **ВП**: Тер.-Кум. (Танфильев, Кононов, 1982: 33); **ЗК**: Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1978: 202), Уруп-Теб. (Галушко, 1978: 202; Танфильев, Кононов, 1987: 33); **ЦК**: В. Тер; **ВК**: В. Сулак. (Галушко, 1978: 33; Муртазалиев, 2009, 1: 64); **ВЗ**: Мург.-Муровд. (Чайкенд) (Гроссгейм, 1945: 84; Ахундов, 1952: 150).

Атл., Сев., Центр., Южн., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция).

Самый распространенный в Северном полушарии и наиболее обособленный таксономически вид рода *Aristolochia*. Внешне похож на дальневосточный вид *A. contorta* Bunge, у которого также по 2–8 цветков в пазухах листьев и прямая трубка околоцветника. Р. E. S. Duchartre (1864) на основании этих признаков поместил их рядом в подсекции *Aristolochia* секции *Diplobobus* Duch. как наиболее близкие виды. Позднее O. Schmidt (1935) перенес *A. contorta* в подсекцию *Podanthemum* Klotzsch на основании строения околоцветника и завязи: у *A. contorta* мешочек (нижняя вздутая часть) околоцветника на коротком стебельке, отходящем от завязи, в то время как у *A. clematitis* (подсекция *Aristolochia*) мешочек не имеет стебелька и «сидит» на завязи.

6 (18). **A. fimbriata** Cham. 1832, *Linnaea*, 7: 210, tab. 6, fig. 2; Alexander, 1964, *Adissonia*, 24, 4: 51, pl. 94.

Описан из Бразилии.

Указан для **ЗЗ**: Абх. («заносное или одичавшее р., собранное в Сухумском бот. саду и окр. Сухуми в 1946 г.» — Колаковский, 1948: 306; «Сухуми, Келасури» — Гроссгейм, 1949: 265).

Южн. Америка (Бразилия, Уругвай, Аргентина).

Вид из секции *Gymnolobus* Duch., в которой только американские виды. Культивируется очень широко благодаря не только ярким пурпурово-коричневым цветкам с выступающими желтыми жилками и длинными железистыми волосками по краю отгиба околоцветника, но и ярко-зеленым листьям с белыми жилками, образующими сетчатый рисунок на поверхности.

## Superordo Lauranae

### ORDO 3. LAURALES

#### Fam. 25. LAURACEAE Juss., nom. cons.\*

##### Subfam. LAUROIDEAE Burnett

#### 1 (5). *Laurus* L.

1 (19). **Laurus nobilis** L. 1753, Sp. Pl.: 369; Палиб. 1937, Фл. СССР, 7: 572; Tutin, 1964, Fl. Europ. 1: 246; Demiriz, 1982, Fl. Turk. 7: 535; Browicz, 1984, Chorol. trees a. shrubs S. W. Asia a. adjac. reg. 3: 17–18, map 22; Meikle, 1985, Fl. Cyprus, 2: 1421; Jalas a. Suominen, 1991, Atlas fl. Europ. 9: 29, map 1983; Зернов, 2006, Фл. Сев.-Зап. Кавк.: 278.

Описан из Южной Европы.

**СЗЗ**; **ЗЗ**: Туап.-Адл.; Адж. (Батуми). Культивируется, дает самосев, дичает.

\* Н. Н. Имханицкая.

Атл., Центр. (Швейцария), Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция). Повсюду широко культивируется и во многих районах натурализовался, но происходит, по-видимому, из Малой Азии и с Балканского п-ова.

## Superordo Nymphaeanae

### ORDO 4. NYMPHAEALES

#### Fam. 26. NUPHARACEAE A. Kern.\*

(*Nymphaeaceae* subfam. *Nupharoideae* M. Ito: Takht. 2009, Flow. Pl. ed. 2: 16)

#### 1 (6). *Nuphar* Sm., nom. cons.

1 (20). **N. lutea** (L.) Sm. 1809, in Sibth. et Sm. Fl. Graec. Prodr. 1: 361. — *Nymphaea lutea* L. 1753, Sp. Pl.: 510.

Описан из Европы.

**ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ЗЗ:** Абх., Адж.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Н. Буш, 1901: 3; Галушко, 1978: 269; Зернов, 2006: 261); **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум. (Н. Буш, 1901: 3; Галушко, 1978: 269); **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Зернов, 2006: 261); **ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир. (Н. Буш, 1901: 3; Кемулариа-Натадзе, 1973: 162; Гагнидзе, Кемулариа-Натадзе, 1985: 94).

Сев., Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср., Центр. Азия.

#### Fam. 27. NYMPHAEACEAE Salisb., nom. cons.\*

(*Nymphaeaceae* subfam. *Nymphaeoidae* Arn.: Takht. 2009, Flow. Pl. ed. 2: 16)

#### 1 (7) *Nymphaea* L., nom. cons.

1 (21). **N. alba** L. 1753, Sp. Pl.: 510. — *Castalia alba* (L.) Woodv. et Wood, 1806, in Rees, Cycl. 6: *Castalia* 2 [764]; Гроссг. 1930, Фл. Кавк. 2: 87.

Описан из Европы.

**ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Сулак.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.

Указан для **ЗП:** 3. Ставр.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум. (Н. Буш, 1901: 3; Гроссгейм, 1950: 8; Галушко, 1978: 269); **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер. (Галушко, 1978: 269); **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Зернов, 2006: 261); **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт. (Кемулариа-Натадзе, 1973: 160), Лори (Гроссгейм, 1950: 8, Тахтаджян, 1954: 116).

Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Иран), Вост. (Китай — натурализовавшееся), Юго-Вост. (натурализовавшееся) Азия.

2 (22). **N. candida** J. Presl, 1821, in Bercht. et J. Presl, Rostl. 1, 1: 10, tab. 2, fig. 1–4; J. Presl et C. Presl, 1822, Delic. Prag.: 224; Ком. 1937, Фл. СССР, 7: 8, cum auct. Presl, 1822; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 8, cum auct. Presl, 1822; Tutin, 1964,

\* В. В. Шванова.