

## Superordo Rafflesianae

### ORDO 6. RAFFLESIALES (CYTINALES)

#### Fam. 29. CYTINACEAE A. Rich.\*

##### 1 (9). *Cytinus* L., nom. cons.

1 (26). *C. ruber* (Fourr.) Fritsch, 1922, Excursionsfl. Österreich, ed. 3: 69, in clav.; Govaerts a. Nickrent, 2010, Curtis's Bot. Mag. 26 (4): 320. — *Hypocistis rubra* Fourr. 1869, Ann. Soc. Linn. Lyon, sér. 2, 17: 148. — *Cytinus hypocistis* (L.) L. var. *kermesinus* Guss. 1844, Fl. Sicul. Syn. 2: 619; Мушинский, 1920, Тр. Тифл. бот. сада, 48: 37; Гроссг. 1930, Фл. Кавк. 2: 38. — *C. hypocistis* subsp. *clusii* Nyman, 1881, Consp. Fl. Europ. 3: 645. — *C. hypocistis* subsp. *kermesinus* (Guss.) Arcang. 1882, Comp. Fl. Ital.: 612. — *Hypocistis kermesina* (Guss.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 563. — *Cytinus clusii* (Nyman) Gand. 1916, Fl. Cret.: 92. — *C. hypocistis* subsp. *kermesinus* (Guss.) Wettst. 1917, Ber. Deutsch. Bot. Ges. 35: 91, comb. superfl.; McKean, 1982, Fl. Turk. 7: 550. — *Hypocistis hypocistis* (L.) Linding. var. *kermesina* (Guss.) Linding. 1926, Abh. Auslandsk., Reihe C, Naturwiss. 8: 258, comb. inval. — *C. ruber* (Fourr.) Kom. 1936, Фл. СССР, 5: 442, «*rubra*», comb. superfl.; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 85; Гвиниан. 1975, Фл. Груз. изд. 2, 3: 107; Колак. 1985, Фл. Абх. изд. 2, 3: 147; D. A. Webb a. Akeroyd, 1993, Fl. Europ. ed. 2, 1: 90; Читанова, 2004, Фл. Колх.: 134. — *Cytinus kermesinus* (Guss.) Bouchard, 1968, Fl. Corse, ed. 2: 126, comb. inval.

Описан из Португалии, Испании и Франции («...in Hispania, praesertim Batica, tum in Lusitania et Gallia Narbonensi»). Lectotypus (Tatanov, hoc loco; Govaerts, Nickrent, 2010: 320, «type», inval.): [Icon] C. Clusius, 1576, Rar. Stirp. Hispan. Hist.: 135 (*Hypocistis rubra*).

**ЗЗ:** Абх. (Пицундский мыс и прилегающая Каваклукская возвышенность).

Атл. (юг), Южн., Юго-Вост. (юг) Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (от Турции до Израиля); Сев. Африка (Канарские о-ва, от Марокко до Ливии).

Название *Hypocistis rubra* Fourr. валидизировано М. Fougreau (1869) путем непрямого ссылки («*H. rubra* Clus.») на ранее обнародованное С. Clusius (1576). Лектотипом названия вида нами обозначен рисунок, приведенный Clusius при описании.

Впервые *Cytinus ruber* (sub nom. *Cytinus hypocistis* var. *kermesinus*) для Кавказа («в Пицундской сосновой роще») указал Я. Я. Мушинский (1920) по личным сборам 1920 г. В Гербарии LE имеется более ранний сбор Г. Сахарова 1918 г.

Паразитирует на корнях *Cistus tauricus* С. Presl.

---

\* И. В. Татанов.