

Описан из восточной Грузии. *Lectotypus* (Imchanitzkaja, hoc loco): «Transcaucasia, in montibus prope Lagodechi Kachetiae australis, lecta initio Martii mensis 1879, № 2813, mis[it] M. N. Smirnow, 1879» (LE!, cum isolectotypis 3).

ВЗ: Алаз.-Агрич.

Эндемик.

2 (13). *Leontice* L.

1 (33). *L. armeniaca* Boivin 1846, *Voy. Indes Or.*: tab. s. n., fig. A; Тахт. и Фёд. 1972, Фл. Ерев.: 60; Stearn, 2002, *Bot. Mag. Monogr. Epimedium*: 236. — *L. minor* Boiss. 1867, *Fl. Or.* 1: 100; Рзазаде, 1953, Фл. Азерб. 4: 107. — *L. leontopetalum* L. subsp. *armeniaca* (Boivin) Coode, 1964, *Notes Roy. Bot. Gard. Edinb.* 26, 1: 42.

Описан из северного Ирана. *Lectotypus* (Stearn, 2002: 236, «type»): [Icon] C. P. Bélanger, 1846, *Voy. Indes Or.*: tab. 2, fig. A.

ЮЗ: Ерев.

Указан для **ЮЗ:** Нах. (Рзазаде, 1953: 107, sub nom. *L. minor*; Тахтаджян, 1954: 230).

Юго-Зап. (Сирия, Иордания, Ирак, Иран), Ср. (южн. Узбекистан) Азия.

Subfam. 2. EPIMEDIOIDEAE Nakai

3 (14). *Bongardia* C. A. Mey.

1 (34). *B. chrysogonum* (L.) Spach, 1839, *Hist. Nat. Vég.* 8: 65; Coode, 1965, *Fl. Turk.* 1: 212; Browicz, 1973, in *Rech. f. Fl. Iran.* 101: 4; Б. Федч. 1937, Фл. СССР, 7: 552, cum auct. comb. Boiss. 1867; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 81; Рзазаде, 1952, Фл. Азерб. 4: 108. — *Leontice chrysogonum* L. 1753, *Sp. Pl.*: 312; Н. Буш, 1903, *Мат. Фл. Кавк.* 3, 3: 211. — *Bongardia olivierii* C. A. Mey. 1831, *Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.*: 175. — *B. rauwolfii* C. A. Mey. 1831, l. c.: 174, nom. illeg.

Описан из Греции.

ВП: Тер.-Сулак. (заносное?); **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (культивируется); **ВЗ:** Ширв. (Апшеронский п-ов), Иорск.-Шек.; Н. Кур.; Караб.; **Т:**

Средиз.; Юго-Зап. (от Турции и Израиля до Пакистана), Ср. (юг) Азия.

4 (15). *Epimedium* L.

Subgen. 1. *Epimedium*

1 (35). *E. pubigerum* (DC.) C. Morren et Decne. 1834, *Ann. Sci. Nat. (Paris)*, sér. 2, 2: 355; Stearn, 2002, *Bot. Mag. Monogr. Epimedium*: 161–162. — *E. alpinum* L. var. *pubigerum* DC. 1821, *Syst. Nat.* 2: 28.

Описан из Турции. *Typus*: «Turkey, circa Constantinopoliem, collegit cl. Olivier» (G).

ЗЗ: Адж.

Юго-Вост. Европа (Болгария); Юго-Зап. Азия (Турция).

Subgen. 2. **Rhizophyllum** (Fisch. et C. A. Mey.) Stearn

2 (36). **E. pinnatum** Fisch. 1821, in DC. Syst. Nat. 2: 29; Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 102, excl. [var.] β.; Михеев и С. А. Банкетов, 2008, Бот. журн. 93, 7: 1131.

Описан из северного Ирана. Lectotypus (Stearn, 2002: 166, «type»): «*Epimedium pinnatum* m. In prov. Persiae Gilan lecta a cl. Hablitz. Hb. Pallasii» (G).

2а. **E. pinnatum** Fisch. subsp. **pinnatum**: Stearn, 2002, Bot. Mag. Monogr. *Epimedium*: 166; Зернов, 2002, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 107, 3: 51.

Указан для Т (Ленкорань × Зуванд, Гажо, Билясар × Вашару-чай, Зардалю) (Гроссгейм, 1950: 79; Рзазаде, 1953: 107).

Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

2б. **E. pinnatum** Fisch. subsp. **colchicum** (Boiss.) N. Busch, 1903, Mat. фл. Кавк. 3, 3: 209 (cum f. *integrifolia* (Medw. et Albov) N. Busch, 1903, l. c.: 209); Stearn, 2002, Bot. Mag. Monogr. *Epimedium*: 169; Зернов, 2006, Фл. Сев.-Зап. Кавк.: 278. — *E. pinnatum* [var.] β. *colchicum* Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 102. — *E. colchicum* (Boiss.) Trautv. 1883, Тр. Петерб. бот. сада, 8, 1: 65; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 79; Читанова, 2004, Фл. Колх.: 23; Михеев и С. А. Банкетов, 2008, Бот. журн. 93, 7: 1138. — *E. circinnatocucullatum* Sosn. 1922–1923, Вестн. Тифл. бот. сада, нов. сер. 1: 75; Гроссг. 1950, цит. соч.: 79. — *E. pinnatum* subsp. *circinatum* (Sosn.) Stearn, 1938, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 51: 466.

Описан из Западного Закавказья. Турпс: «Caucasus Occid., Nordmann» (G-BOIS; isotypus — LE!).

СЗЗ: Пшад.-Джубг.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

Согласно А. С. Зернову (2000), «описанный из окр. Сочи *E. circinnatocucullatum* Sosn. представляет собой лишь уродливую форму *E. pinnatum* Fisch. subsp. *colchicum*».

ORDO 9. RANUNCULALES

Fam. 33. RANUNCULACEAE Juss., nom. cons.

Subfam. 1. THALICTROIDEAE Raf.

Trib. 1. **Isopyreae** Schrödinger

1 (16). **Aquilegia** L.*

1 (37). **A. olympica** Boiss. 1841, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 16: 360; Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 71. — *A. vulgaris* L. var. *caucasica* Ledeb. 1842, Fl. Ross. 1: 56. — *A. wittmanniana* Steven ex Fisch., C. A. Mey. et Avé-Lall. 1846, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 11, suppl.: 15. — *A. caucasica* Bieb. ex Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 32, 287 (Fl. Cauc.); Кем.-Нат. 1966, Раналиевые Кавк.: 75. — *A. vulgaris* var. *olympica* (Boiss.) Baker, 1878, Gard. Chron. ser. 2, 10: 76. — *A. vulgaris* auct. non L.: Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 15.

* И. М. Васильева (Васильева, 1996).