

Subgen. 2. **Rhizophyllum** (Fisch. et C. A. Mey.) Stearn

2 (36). **E. pinnatum** Fisch. 1821, in DC. Syst. Nat. 2: 29; Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 102, excl. [var.] β.; Михеев и С. А. Банкетов, 2008, Бот. журн. 93, 7: 1131.

Описан из северного Ирана. Lectotypus (Stearn, 2002: 166, «type»): «*Epimedium pinnatum* m. In prov. Persiae Gilan lecta a cl. Hablitz. Hb. Pallasii» (G).

2а. **E. pinnatum** Fisch. subsp. **pinnatum**: Stearn, 2002, Bot. Mag. Monogr. *Epimedium*: 166; Зернов, 2002, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 107, 3: 51.

Указан для Т (Ленкорань × Зуванд, Гажо, Билясар × Вашару-чай, Зардалю) (Гроссгейм, 1950: 79; Рзазаде, 1953: 107).

Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

2б. **E. pinnatum** Fisch. subsp. **colchicum** (Boiss.) N. Busch, 1903, Mat. фл. Кавк. 3, 3: 209 (cum f. *integrifolia* (Medw. et Albov) N. Busch, 1903, l. c.: 209); Stearn, 2002, Bot. Mag. Monogr. *Epimedium*: 169; Зернов, 2006, Фл. Сев.-Зап. Кавк.: 278. — *E. pinnatum* [var.] β. *colchicum* Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 102. — *E. colchicum* (Boiss.) Trautv. 1883, Тр. Петерб. бот. сада, 8, 1: 65; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 79; Читанова, 2004, Фл. Колх.: 23; Михеев и С. А. Банкетов, 2008, Бот. журн. 93, 7: 1138. — *E. circinnatocucullatum* Sosn. 1922–1923, Вестн. Тифл. бот. сада, нов. сер. 1: 75; Гроссг. 1950, цит. соч.: 79. — *E. pinnatum* subsp. *circinatum* (Sosn.) Stearn, 1938, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 51: 466.

Описан из Западного Закавказья. Турпс: «Caucasus Occid., Nordmann» (G-BOIS; isotypus — LE!).

СЗЗ: Пшад.-Джубг.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

Согласно А. С. Зернову (2000), «описанный из окр. Сочи *E. circinnatocucullatum* Sosn. представляет собой лишь уродливую форму *E. pinnatum* Fisch. subsp. *colchicum*».

ORDO 9. RANUNCULALES

Fam. 33. RANUNCULACEAE Juss., nom. cons.

Subfam. 1. THALICTROIDEAE Raf.

Trib. 1. **Isopyreae** Schrödinger

1 (16). **Aquilegia** L.*

1 (37). **A. olympica** Boiss. 1841, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 16: 360; Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 71. — *A. vulgaris* L. var. *caucasica* Ledeb. 1842, Fl. Ross. 1: 56. — *A. wittmanniana* Steven ex Fisch., C. A. Mey. et Avé-Lall. 1846, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 11, suppl.: 15. — *A. caucasica* Bieb. ex Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 32, 287 (Fl. Cauc.); Кем.-Нат. 1966, Раналиевые Кавк.: 75. — *A. vulgaris* var. *olympica* (Boiss.) Baker, 1878, Gard. Chron. ser. 2, 10: 76. — *A. vulgaris* auct. non L.: Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 15.

* И. М. Васильева (Васильева, 1996).

Описан из Турции. *Typus*: «Alpes Olympi Armeniae, 1837, № 59, m'Aucher-Elou» (К, photo — G!).

ЗП: З. Ставр.; **ВП**: В. Ставр.; **ЗК**; **ЦК**; **ВК**; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Триал.-Н. Карг., Лори; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Караб.; **ЮЗЗ**: Араг.; **ЮЗ**: Ю. Караб. Юго-Зап. Азия (Турция, сев. Иран).

2 (38). **A. colchica** Kem.-Nath. 1934, Тр. Тифл. бот. инст. 1: 114; Кем.-Нат. 1966, Ранадиевые Кавк.: 77.

Описан из западной Грузии. *Lectotypus* (Васильева, 1996: 16): «Georgia, Prov. Kutais, distr. Schorapani, fauc. Djrutcha, prope pag. Darkwethi, ad rupes calcareas, 28 VIII 1928, Kemularia-Nathadze» (ТБИ!; *isolectotypus* — LE!).

ЗЗ: Рион.-Квир.

Эндемик.

3 (39). **A. gegica** Jabr.-Kolak. 1953, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 17: 120; Кем.-Нат. 1966, Ранадиевые Кавк.: 77.

Описан из Абхазии. *Lectotypus* (Васильева, 1996: 16): «Абхазия, ущ. Геги, на влажных скалах у водопада, 7 VII 1949, А. Колаковский» (СУЧ!; *isolectotypus* — LE!, ТБИ!).

ЗЗ: Абх.

Эндемик.

4 (40). **A. kubanica** I. M. Vassiljeva, 1991, Бот. журн. 76, 12: 124.

Описан с Северного Кавказа. *Typus*: «Предкавказье, Ставропольский край, Карачаево-Черкесская АО, верховья Кубани, окр. аула Уччулан, на осыпи, 1400 м над ур. м., 4 VIII 1968, № 433, Е. Гогина» (МНА!).

ЗК: В. Куб.

Эндемик.

Trib. 2. **Thalictreae** Langlet ex D. Z. Fu

2 (17). **Thalictrum** L., nom. cons.*

Sect. **Thalictrum**

1(41). **T. triternatum** Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 2, 285 (Fl. Cauc.).

Описан с Западного Кавказа. *Typus*: «Cauc. bor. occid., in Abadsechia versus montem Oschten et fontes fl. Bjelaja, in declivitate bor. orient. viae Schitlibensis, alt. 780 hex., in lapidosis reg. subsylvaticae, 15 VIII 1865, fere defloratum detexit, D. Scharojan» (LE?).

ЗП: Аз.-Куб.; **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**: Малк., В. Тер.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир.

Указан для **ЦК**: В. Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 46); **ЗЗ**: Адж. (Кемулария-Натадзе, 1973: 79; Дмитриева, 1990, 1: 54); **ЦЗ**: Карг.-Ю. Ос. (Кемулария-Натадзе, 1973: 79).

* Л. И. Крупкина.