

Р. Н. Davis (1965) и А. Л. Тахтаджяном и Ан. А. Фёдоровым (1972) для Кавказа указывались растения только с линейно-ланцетовидными боковыми и более широкими (более 2 мм шир.) дистальными долями листьев, соответствующие по описанию *N. latisepta* (typus: «[Turkey] Kayserie, 20 VI 1934, 4100 ft, № 1127a, E. K. Balls» — E!; isotypi — K!, BM!). Виденные мною образцы из Грузии («Грузинская ССР, Цители-Цкаройский [Дедоплисцкаройский] р-н, с. Кас-рисцкали, 15 VIII 1985, Ю. Меницкий» — LE) и Нахичевани («Transcaucasia, Nachrespublica, in lapidosis, 15 VI 1933, L. Prilipko» — ВАК) имеют узкие и одинаковые по ширине доли листьев. Для Грузии вид приведен впервые.

11 (26). *Garidella* L.*

1 (114). *G. nigellastrum* L. 1753, Sp. Pl.: 425. — *Nigella garidella* Spenn. 1829, Monogr. *Nigella*: 11. — *N. nigellastrum* (L.) Willk. 1880, in Willk. et Lange, Prodr. Fl. Hisp. 3: 963.

Описан из южной Франции.

ВК: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Дар., Мегр.-Зан., Ю. Караб.

Центр. (Швейцария), Юго-Вост. (Крым) Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. (зап. Копетдаг) Азия.

Subfam. 5. HELLEBOROIDEAE Beilschm.

12 (27). *Helleborus* L.*

1 (115). *H. caucasicus* C. Koch ex A. Braun, 1853, Index Sem. Horto Bot. Berol. App.: 24. — *H. guttatus* A. Braun et F. W. H. Sauer, 1853, in A. Braun, l. c.: 23. — *H. caucasicus* var. *guttatus* (A. Braun et F. W. H. Sauer) Regel, 1860, Gartenflora: 192. — *H. casta-diva* N. Busch, 1903, Mat. фл. Кавк. 3, 3, Addenda: 225, p. p. — *H. polychromus* Kolak. 1939, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 5: 7, p. p., nom. illeg. — *H. caucasicus* var. *guttatus* (A. Braun et F. W. H. Sauer) Woronow ex Grossh. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 15, comb. superfl. — *H. viridis* auct. non L.: Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 30, p. p., quoad pl. cauc. — *H. orientalis* auct. non Lam.: Р. Н. Davis a. Cullen, 1965, Fl. Turk. 1: 96, p. p.; Чер. 1981, Сосуд. раст. СССР: 421.

Описан из Закавказья.

ЗП: З. Ставр.; **ЗК;** **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** В. Сулак. (Ведено); **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.

Указан для **ЦЗ:** Лори (Тахтаджян, 1954: 128, sub nom. *H. guttatus*).

Средиз. (Греция: Фракия); Юго-Зап. Азия (сев. Турция).

2 (116). *H. abchasicus* A. Braun, 1853, Index Sem. Horto Bot. Berol. App.: 24. — *H. caucasicus* C. Koch ex A. Braun var. *abchasicus* (A. Braun) Regel, 1860, Gartenflora: 193. — *H. casta-diva* N. Busch, 1903, Mat. фл. Кавк. 3, 3, Addenda: 225, p. p. — *H. polychromus* Kolak. 1939, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 5: 7, p. p., nom. illeg. — *H. orientalis* auct. non Lam., p. p.: Р. Н. Davis a. Cullen, 1965, Fl. Turk.

* А. Е. Грабовская-Бородина.