

Р. Н. Davis (1965) и А. Л. Тахтаджяном и Ан. А. Фёдоровым (1972) для Кавказа указывались растения только с линейно-ланцетовидными боковыми и более широкими (более 2 мм шир.) дистальными долями листьев, соответствующие по описанию *N. latisepta* (typus: «[Turkey] Kayserie, 20 VI 1934, 4100 ft, № 1127a, E. K. Balls» — E!; isotypi — K!, BM!). Виденные мною образцы из Грузии («Грузинская ССР, Цители-Цкаройский [Дедоплисцкаройский] р-н, с. Кас-рисцкали, 15 VIII 1985, Ю. Меницкий» — LE) и Нахичевани («Transcaucasia, Nachrespublica, in lapidosis, 15 VI 1933, L. Prilipko» — ВАК) имеют узкие и одинаковые по ширине доли листьев. Для Грузии вид приведен впервые.

### 11 (26). *Garidella* L.\*

1 (114). *G. nigellastrum* L. 1753, Sp. Pl.: 425. — *Nigella garidella* Spenn. 1829, Monogr. *Nigella*: 11. — *N. nigellastrum* (L.) Willk. 1880, in Willk. et Lange, Prodr. Fl. Hisp. 3: 963.

Описан из южной Франции.

**ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Дар., Мегр.-Зан., Ю. Караб.

Центр. (Швейцария), Юго-Вост. (Крым) Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. (зап. Копетдаг) Азия.

### Subfam. 5. HELLEBOROIDEAE Beilschm.

### 12 (27). *Helleborus* L.\*

1 (115). *H. caucasicus* C. Koch ex A. Braun, 1853, Index Sem. Horto Bot. Berol. App.: 24. — *H. guttatus* A. Braun et F. W. H. Sauer, 1853, in A. Braun, l. c.: 23. — *H. caucasicus* var. *guttatus* (A. Braun et F. W. H. Sauer) Regel, 1860, Gartenflora: 192. — *H. casta-diva* N. Busch, 1903, Mat. фл. Кавк. 3, 3, Addenda: 225, p. p. — *H. polychromus* Kolak. 1939, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 5: 7, p. p., nom. illeg. — *H. caucasicus* var. *guttatus* (A. Braun et F. W. H. Sauer) Woronow ex Grossh. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 15, comb. superfl. — *H. viridis* auct. non L.: Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 30, p. p., quoad pl. cauc. — *H. orientalis* auct. non Lam.: Р. Н. Davis a. Cullen, 1965, Fl. Turk. 1: 96, p. p.; Чер. 1981, Сосуд. раст. СССР: 421.

Описан из Закавказья.

**ЗП:** З. Ставр.; **ЗК;** **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** В. Сулак. (Ведено); **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.

Указан для **ЦЗ:** Лори (Тахтаджян, 1954: 128, sub nom. *H. guttatus*).

Средиз. (Греция: Фракия); Юго-Зап. Азия (сев. Турция).

2 (116). *H. abchasicus* A. Braun, 1853, Index Sem. Horto Bot. Berol. App.: 24. — *H. caucasicus* C. Koch ex A. Braun var. *abchasicus* (A. Braun) Regel, 1860, Gartenflora: 193. — *H. casta-diva* N. Busch, 1903, Mat. фл. Кавк. 3, 3, Addenda: 225, p. p. — *H. polychromus* Kolak. 1939, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 5: 7, p. p., nom. illeg. — *H. orientalis* auct. non Lam., p. p.: Р. Н. Davis a. Cullen, 1965, Fl. Turk.

\* А. Е. Грабовская-Бородина.

1: 96, p. p.; Чер. 1981, Сосуд. раст. СССР: 421. — *H. caucasicus* auct. non C. Koch ex A. Braun: Колак. 1985, Фл. Абх. изд. 2, 3: 160.

Описан из Абхазии («...patrem Caucasi jugo et mari nigro interjectum, indicat»).

**ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.

Эндемик.

## Subfam. 6. RANUNCULOIDEAE Arn.

### Trib. 1. Anemoneae DC.

#### 13 (28). *Anemone* L., nom. cons.\*

##### Subgen. 1. *Anemone*

##### Sect. 1. *Anemone*

##### Subsect. 1. *Anemone*

1 (117). *A. kuznetzowii* Woronow ex Grossh. 1930, Фл. Кавк. 2: 105. — *A. coronaria* auct. non L.: P. Popow, 1913, Тр. Тифл. бот. сада, 12, 2: 170.

Описан с Кавказа. *Л е с т о т у р у с* (Луферов, 2002а: 82): «Елизаветинская губ., Карягинский уезд, между с. Дешкесаном и Гюзлякской ст., 21 IV 1911, Ю. Воронов» (LE!, cum isoelectotypis).

**ЮЗ:** Ю. Караб.

Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

##### Subsect. 2. *Sylvestres* Starod.

2 (118). *A. sylvestris* L. 1753, Sp. Pl. 1: 540.

Описан из Европы.

**ЗП; ВП:** В. Ставро., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **ВК.**

Европа; Сев. (Зап. и Вост. Сибирь), Ср. (Казахстан), Центр. (Монголия), Вост. (Дальн. Восток: Нижне-Зейский р-н; Сев.-Вост. Китай) Азия.

Наряду с типовой разновидностью, на Кавказе спорадически встречается описанная из Румынии var. *macrantha* Schur, 1866, Enum. Pl. Transsilv.: 3, отличающаяся более крупными (до 5–7 см в диам.) цветками.

##### Subgen. 2. *Omalocarpus* (DC.) Juz.

##### Sect. *Omalocarpus* DC.

3 (119). *A. fasciculata* L. 1753, Sp. Pl.: 542. — *A. narcissiflora* L. var. *fasciculata* (L.) Willd. 1799, Sp. Pl. 2, 2: 1283. — *A. narcissiflora* f. *fasciculata* (L.) A. Nyár. 1953, in Săvul. Fl. Republ. Social. România, 2: 518. — *Anemonastrum fasciculatum* (L.) Holub, 1973, Folia Geobot. Phytotax. (Praha), 8, 2: 165.

Описан с северо-востока Турции. *Л е с т о т у р у с* (Dutton et al., 1995: 422): [Icon] J. P. Tournefort, 1717, Rel. Voy. Levant, 2: 106.

\* А. Н. Луферов (Луферов, 2001, 2002а).