

ВЗ: Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Нах., Занг., Ю. Караб.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

С. В. Юзепчук (1937: 306) указал, что тип находится в Гербарии G, в Гербарии LE имеется котип, который, однако, нам найти не удалось.

Наряду с типичной окраской цветков, изредка встречаются растения с беловато-кремовыми листочками околоцветника («Армения, Севанский р-н, полуостров Севан, южный берег, 2 V 1961, Н. Савич» — LE!).

Для Кавказа указывали также *P. montana* (Hoppe) Rchb. (Pritzel, 1841, sub nom. *Anemone montana* Hoppe), *P. pratensis* Mill., *P. grandis* Wender. (Гроссгейм, 1949, 1950; Галушко, 1978) и *P. vulgaris* Mill. (Bieberstein, 1808, sub nom. *Anemone pulsatilla* L.; Шмальгаузен, 1895), однако достоверных сведений о дикорастущих популяциях этих видов из данного региона нам найти не удалось. Интродуцированные образцы *P. grandis* на Кавказе были собраны пока только в Абхазии («Гагры, III 1939, В. Л. Комаров» — LE!).

Trib. 2. Clematideae DC.

15 (30). Clematis L.*

Sect. 1. Clematis

1 (129). **C. vitalba** L. 1753, Sp. Pl. 1: 544.

Описан из Южной Европы.

ЗП; ЗК; ЦК: В. Тер.; **ВК:** Кубин.; **СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.;

ВЗ: Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, сев. Сирия, сев. Иран); Сев. Африка.

На Кавказе известны две разновидности, встречающиеся во всех указанных районах, — var. *vitalba* с крупнозубчатыми, зубчато надрезанными или перистолопастными тонкими листочками, обычно светло-зелеными или зелеными, и var. *integrata* DC. (1817, Syst. Nat. 1: 139) с более крупными цельнокрайными, крупногородчатыми или с 1–3 зубцами листочками, толстоватыми, почти кожистыми и темно-зелеными.

Sect. 2. Meclatis (Spach) Tamura

2 (130). **C. orientalis** L. 1753, Sp. Pl. 1: 543. — *Meclatis orientalis* (L.) Spach, 1839, Hist. Nat. Vég. 7: 274.

Описан из Турции. Lectotypus (Brandenburg et al., 1987: 118): [Icon] J. J. Dillenius, 1732, Hort. Elth. tab. 119, fig. 145 «*Flammula scandens, folio Apii glauco*» (photo — LINN!).

ЗП: Аз.-Куб. (вероятно, одичавшее из культуры); **ВП; ЦК; ВК; ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Вост. Европа (вост. Причерноморье, Нижне-Донской и Нижне-Волжский р-ны); Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср., Центр. (Монголия, Китай) Азия.

Во «Флоре СССР» (Крашенинников, 1937: 322) ошибочно указывается, что *C. orientalis* описан из Китая.

* А. Н. Луферов, В. П. Серов (Луферов, Серов, 1999).

Sect. 3. Rectae (Tamura) Serov

3 (131). **C. lathyrifolia** Bess. ex Trautv. 1842, Delect. Sem. Horto Bot. Kiev. Univ. a. 1841: 6; Bess. ex Rchb. 1832, Fl. Germ. Excurs. 2: 734, pro syn. *C. erecta* All. (= *C. recta* L.). — *C. pseudoflammula* Schmalh. ex Lipsky, 1894, Зап. Киев. общ. естествоисп. 12: 220. — *C. recta* auct. non L.: Ledeb. 1841, Fl. Ross. 1: 3; Липский, 1899, Тр. Тифл. бот. сада, 4: 203 (Фл. Кавк.). — *C. flammula* auct. non L.: Ledeb. 1841, l. c.: 3, p. p.; Липский, 1899, цит. соч.: 203.

Описан по культивированным в Кременце экземплярам, происходящим, по-видимому, из Украины. Ту р и с: «Cult. Cremeneci. Herb. W. Besser» (LE!).

ЗП; ВП: В. Ставр., Тер.-Сулак.; **ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа (вост. Днепровского р-на и Причерноморья и зап. Нижне-Донского р-на).

Sect. 4. Integrifoliae Serov

4 (132). **C. integrifolia** L. 1753, Sp. Pl. 1: 544. — *Viorna integrifolia* (L.) Spach, 1839, Hist. Nat. Vég. 7: 270.

Описан по материалам из Венгрии и России.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК; ВК:** Асо-Арг., В. Сулак.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев. (юг Зап. и Вост. Сибири), Ср. (Казахстан), Центр. Азия.

Sect. 5. Viticella (Moench) DC.

5 (133). **C. viticella** L. 1753, Sp. Pl. 1: 543. — *Viticella deltoidea* Moench, 1794, Methodus: 296.

Описан из Средиземноморья.

ЗЗ: Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз. (от Испании до Греции); Юго-Зап. Азия (Турция).

Trib. 3. **Ranunculeae** DC.

Subtrib. 1. **Ranunculinae** O. Berg

16 (31). **Ranunculus** L.*

Subgen. 1. **Ranunculus**

Sect. 1. **Ranunculus**

1 (134). **R. suukensis** N. Busch, 1926, Тр. Бот. муз. АН СССР, 19: 80. — *R. grossheimii* Kolak. 1953, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 18: 88.

* А. Г. Еленевский (Еленевский, Дервиз-Соколова, 1989).