

Sect. 3. Rectae (Tamura) Serov

3 (131). **C. lathyrifolia** Bess. ex Trautv. 1842, Delect. Sem. Horto Bot. Kiev. Univ. a. 1841: 6; Bess. ex Rchb. 1832, Fl. Germ. Excurs. 2: 734, pro syn. *C. erecta* All. (= *C. recta* L.). — *C. pseudoflammula* Schmalh. ex Lipsky, 1894, Зап. Киев. общ. естествоисп. 12: 220. — *C. recta* auct. non L.: Ledeb. 1841, Fl. Ross. 1: 3; Липский, 1899, Тр. Тифл. бот. сада, 4: 203 (Фл. Кавк.). — *C. flammula* auct. non L.: Ledeb. 1841, l. c.: 3, p. p.; Липский, 1899, цит. соч.: 203.

Описан по культивированным в Кременце экземплярам, происходящим, по-видимому, из Украины. Ту р и с: «Cult. Cremeneci. Herb. W. Besser» (LE!).

**ЗП; ВП:** В. Ставр., Тер.-Сулак.; **ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа (вост. Днепрового р-на и Причерноморья и зап. Нижне-Донского р-на).

Sect. 4. Integrifoliae Serov

4 (132). **C. integrifolia** L. 1753, Sp. Pl. 1: 544. — *Viorna integrifolia* (L.) Spach, 1839, Hist. Nat. Vég. 7: 270.

Описан по материалам из Венгрии и России.

**ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК; ВК:** Асо-Арг., В. Сулак.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев. (юг Зап. и Вост. Сибири), Ср. (Казахстан), Центр. Азия.

Sect. 5. Viticella (Moench) DC.

5 (133). **C. viticella** L. 1753, Sp. Pl. 1: 543. — *Viticella deltoidea* Moench, 1794, Methodus: 296.

Описан из Средиземноморья.

**ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз. (от Испании до Греции); Юго-Зап. Азия (Турция).

Trib. 3. **Ranunculeae** DC.

Subtrib. 1. **Ranunculinae** O. Berg

16 (31). **Ranunculus** L.\*

Subgen. 1. **Ranunculus**

Sect. 1. **Ranunculus**

1 (134). **R. suukensis** N. Busch, 1926, Тр. Бот. муз. АН СССР, 19: 80. — *R. grossheimii* Kolak. 1953, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 18: 88.

\* А. Г. Еленевский (Еленевский, Дервиз-Соколова, 1989).

Описан с Центрального Кавказа. Ту р u s: «Скалы левого берега Карасу в нижней части ущелья Суук-ауз, 2000 м, 21 VI 1925, Е. и Н. Буш» (LE!).

**ЦК:** Малк.; **ЗЗ:** Абх.

Указан для **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Зернов, 2006: 274).

Эндемик.

2 (135). **R. subtilis** Trautv. 1866, Bull. Acad. Sci. Pétersb. 10: 393.

Описан с Западного Кавказа. Ту р u s: «In monte Nachar, alt. 6–7000 ped.» (LE!).

**ЗК:** Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк.; **ЗЗ:** Инг.-Рион.

Эндемик.

3 (136). **R. auricomus** L. 1753, Sp. Pl. 1: 551.

Описан из Северной Европы.

**ЦК:** Малк., В. Тер. Очень редко на болотах.

Указан для **ЗП:** З. Ставр. (Гроссгейм, 1950: 54; Галушко, 1978: 289); **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 45).

Атл., Сев., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев. Азия (Зап. Сибирь).

#### Sect. 2. **Acris** Schur

4 (137). **R. acris** L. 1753, Sp. Pl. 1: 554; Овч. 1937, Фл. СССР, 7: 461, pro *R. acer* L.; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 67; Кем.-Нат. 1973, Фл. Груз. изд. 2, 2: 118.

Описан из Европы.

Указан для **ЗП;** **ВП** (Овчинников, 1937: 67); **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Месх. (Гроссгейм, 1950: 67).

Европа; Сев. (Сибирь), Вост. (Дальн. Восток) Азия. Заносное в Сев. Америке и других странах.

5 (138). **R. villosus** DC. 1817, Syst. Nat. 1: 283.

Описан из Ирана. Ту р u s: «In Persia, Lambert» (P).

5a. **R. villosus** DC. subsp. **villosus**.

**ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗ:** Занг., Ю. Караб.; **Т.**

Юго-Зап. Азия (Иран).

5b. **R. villosus** DC. subsp. **constantinopolitanus** (DC.) Jelen. 1979, Новости сист. высш. раст. 16: 116. — *R. lanuginosus* L. var. *constantinopolitanus* DC. 1817, Syst. Nat. 1: 281. — *R. constantinopolitanus* (DC.) d'Urv. 1822, Mém. Soc. Linn. Paris, 1: 317.

Описан из Турции. Ту р u s (fide Davis, 1965: 169): «An Aubriet drawing (unpublished) based on a Tournefort specimen from Istanbul, in Bibl. Jussieu» (P).

**ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Гроссгейм, 1950: 65; Галушко, 1978: 287, sub nom. *R. constantinopolitanus* d'Urv.); **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Зернов, 2006: 272).

Юго-Вост. Европа (Балканский п-ов, Крым); Юго-Зап. Азия (Турция).

6 (139). **R. grandiflorus** L. 1753, Sp. Pl.: 555. — *R. anemonifolius* DC. 1817, Syst. Nat. 1: 282. — *R. calvertii* Boiss. et A. Huet, 1856, in Boiss. Diagn. Pl. Or. sér. 2, 5: 8. — *R. kotschyi* auct. non Boiss.: Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 66.

Описан из Турции. Тур у s: «*Ranunculus cappadocicus aconitifolio flore luteo maximo*, Tournefort» (P).

**ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Занг., Мегр.-Зан.

Указан для **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 45, sub nom. *R. anemonifolius* DC. et *R. grandiflorus* L.).

Юго-Зап. Азия (Турция, сев. Иран).

7 (140). **R. elegans** C. Koch, 1841, Linnaea, 15: 248. — *R. georgicus* Kem.-Nath. 1963, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 23: 33. — *R. szowitsianus* auct. non Boiss.: Тахт. 1954, Фл. Арм. 1: 194.

Описан из Грузии. Тур у s: «In Somchetia, 1837, № 720, legit Dr. Koch» (LE!, cum isotуро).

**ЗП:** З. Ставр.; **ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Севан., Дар., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.

Юго-Зап. Азия (Турция, сев. Иран).

Между двумя последними видами существуют многочисленные переходные формы.

8 (141). **R. obesus** Trautv. 1875, Тр. Петерб. бот. сада, 3, 2: 275. — *R. tempiskyanus* Freyn et Sint. 1895, Bull. Herb. Boiss. 3, 1: 35.

Описан из Грузии (окр. Ахалцихе). Тур у s: «Türkische Grenze, 9 VII 1874, Radde» (LE!).

**ЮЗЗ:** Месх. (Ахалцихе, Бахмаро), Араг.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция)

9 (142). **R. cappadocicus** Willd. 1800, Sp. Pl. 2: 1326. — *R. ampelophyllus* Sommier et Levier, 1893, Bull. Soc. Bot. Ital.: 523; Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1: 290. — *R. grandiflorus* auct. non L.: Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 60, sensu Boiss.

Описан из Турции. Тур у s: «*Ranunculus cappadocicus dulcis* Doronicis radice, Tournefort» (P).

**ЗК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос. (Боржоми).

Юго-Зап. Азия (Турция: Лазистан, Пафлагония).

10 (143). **R. repens** L. 1753, Sp. Pl. 1: 554.

Описан из Европы. Тур у s: «In Europaе cultis» (LINN, foto!).

Во всех районах Кавказа.

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка. Широко распространен повсюду.

11 (144). **R. meyerianus** Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Petérsb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 25 (Fl. Cauc.). — *R. polyanthemos* L. subsp. *meyerianus* (Rupr.) Jelen. et Derv.-Sok. 1984, Науч. докл. высш. школы. биол. науки, 10: 75. — *R. polyanthemos* auct. non L.: Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 64. — *R. nemorosus* auct. non DC.: Гроссг. 1950, цит. соч.: 64.

Описан из Крыма по образцам Мейера («Legi in summo monte Tauriae Tschaturdagh»), к сожалению, несохранившимся.

**ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ; Т.**

Юго-Вост. (Балканский п-ов, Крым), Вост. (юг) Европа; Средиз. (Италия, Греция); Юго-Зап. (Турция, сев. Иран), Ср. (Копетдаг) Азия.

12 (145). **R. brutius** Ten. 1811, Fl. Napol.: 61.

Описан из Италии.

**ЗК:** Уруп-Теб. (Н. Ермоловка); **ЗЗ:** Абх., Рион.-Квир.; **ЮЗЗ:** Месх. (Абастумани).

Указан для **ЗЗ:** Адж. (Гроссгейм, 1950: 56).

Южн. Европа; Средиз. (Италия, Греция); Юго-Зап. Азия (Турция).

13 (146). **R. caucasicus** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 27.

Описан с Центрального Кавказа. *Lectotypus* (Еленевский, Дервиз-Соколова, 1989: 114): «Ex Caucaso Cabardinico Circa Narzana» (LE — Herb. Bieb!).

13а. **R. caucasicus** Bieb. subsp. **caucasicus**.

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб; **Т.**

Указан для **ЗП:** З. Ставр. (Танфильев, Кононов, 1987: 45).

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция: окр. Карса; сев. и сев.-зап. Иран).

13b. **R. caucasicus** Bieb. subsp. **subleiocarpus** (Sommier et Levier) P. H. Davis, 1960, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 23:125. — *R. raddeanus* Regel var. *subleiocarpus* Sommier et Levier, 1900, Тр. Петерб. бот. сада, 16: 10. — *R. raddeanus* Regel, 1865, Index Sem. Hort. Bot. Petropol.: 39. — *R. sommieri* Albov, 1893, Bull. Herb. Boiss. 1: 245. — ?*R. osseticus* Ovcz. 1937, Фл. СССР, 7: 743, 443. — *R. transcaucasicus* Kem.-Nath. 1963, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 23: 32.

Описан из Грузии (Сванетия). *Typus*: «In silvis editioribus montis Tetenar, 1800 m, 1 VIII 1890, Sommier et Levier» (FI).

**ЗК; ЦК; ЗЗ.**

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

Отличается от типового подвида более крупными и более рассеченными листьями; кроме того, некоторые экземпляры имеют опушенные орешки и длинные горизонтальные корневища. У subsp. *caucasicus* орешки всегда голые, а корневища практически отсутствуют. Выбор P. H. Davis (1960) эпитета обусловлен, по-видимому, неудачными и плохо сохранившимися автентиками *R. raddeanus* и *R. sommieri*.

14 (147). **R. buhsei** Boiss. 1867, Fl. Or. 1:45. — *R. boissieri* Simonk. 1888, Természetráji Fü. 11: 212. — *R. astrantiifolius* (Rupr.) Boiss. et Bal. 1888, in Boiss. Fl. Or. Suppl.: 12, non Schur, 1853. — *R. trisectilis* Ovcz. 1937, Фл. СССР, 7: 743, 427. — *R. scherosii* Kem.-Nath. 1963, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 23: 32.

Описан из Ирана. *Lectotypus* (Овчинников, 1937: 427, «typus»): «Persia borealis, № 182, Szowits» (LE!; isolectotypus — G).

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.;  
**ВЗ:** Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх.; **Т:**  
Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, сев. Иран).

15 (148). **R. dissectus** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 25.

Описан из Крыма. Тур у s: «E litore merid. declivi Tauriae, Jaila dicto» (LE — Herb. Bieb.!).

15a. **R. dissectus** Bieb. subsp. **aragazii** (Grossh.) Bulany et Derv.-Sok. 1986, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 91, 6: 101. — *R. aragazii* Grossh. 1948, Докл. АН СССР, 8, 2: 83. — *R. napellifolius* auct. non DC.: Овч. 1937, Фл. СССР, 7: 428. — *R. merovens* auct. non Grossh: Тахт. 1954, Фл. Арм. 1: 193.

Описан из Армении (гора Арагац). Тур у s: «Р. Дали-чай, ущелье правого истока, урочище Тютюценд, 2800 м, верхнеальпийский ковер, 20 VII 1932, Е. и Н. Буш» (LE!).

**ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.  
Юго-Зап. Азия (Турция).

15b. **R. dissectus** Bieb. subsp. **szowitsianus** (Boiss.) Jelen. et Derv.-Sok. 1986, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 91, 6: 107. — *R. szowitsianus* Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 42, non sensu Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 66; Тахт. 1954, Фл. Арм. 1: 194. — *R. merovens* Grossh. 1927, Beih. Bot. Centralbl. 44, 2: 212.

Описан из северного Ирана. Тур у s: «In declivitate meridionale in Arekligeduk, 9 VI 1829, Szowits» (LE!).

**ВЗ:** Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Занг., Мегр.-Зан.; **Т:**  
Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

16 (149). **R. arachnoideus** C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 201.

Описан из Дагестана. Тур у s: «In alpibus Tufandagh, inter fragmina, schifti, 31 VII 1830, Meyer» (LE!).

**ЦК:** В. Тер.; **ВК; ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.  
Эндемик.

17 (150). **R. migaricus** Kem.-Nath. et Chinth. 1965, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 24: 21.

Описан из Грузии. Тур у s: «Megrelia, reg. alpina, mons calcareus Migaria, 24 VI 1957, Kemularia-Nathadze, Chinthibidze et Mikheladze» (TBI).

**ЗЗ:** Инг.-Рион.  
Эндемик.

Известен только из классического местонахождения, где собирался еще Н. М. Альбовым.

По своеобразным листьям обнаруживает сходство с предыдущим видом, от которого отличается отсутствием паутинистого опушения.

18 (151). **R. oreophilus** Bieb. 1819, Fl. Taur. Cauc. 3: 383. — *R. acutilobus* Ledeb. 1841, Fl. Ross. 1: 40. — *R. acutidentatus* Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 236 (Fl. Cauc.). — *R. makaschwilii* Kem.-Nath. 1963, Зам.

сист. геогр. раст. (Тбилиси), 23: 31. — *R. sartorianus* auct. non Boiss. et Heldr.: Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 61, p. p.

Описан из Крыма. Т у р u s: «In planitie montis Tschatyrdagh» (LE — Herb. Bieb.!).

**ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ; Т** (редко). Горы всего Кавказа от верхней части лесного до альпийского поясов.

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. (все горные р-ны) Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, сев. Иран).

19 (152). **R. baidarae** Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Petérsb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 286 (Fl. Саус.). — *R. ginkglobus* Sommier et Levier, 1894, Тр. Петерб. бот. сада, 13, 2: 184. — *R. villarsii* Ledeb. subsp. *baidarae* (Rupr.) N. Busch, 1903, Мат. фл. Кавк. 3, 3: 169. — *R. dzhavacheticus* Ovcz. 1937, Фл. СССР, 7: 744, 438.

Описан из Грузии (Мегрелия). Т у р u s: «In locis fertilibus subalpinis ad rivulum Baidara alt. 6000 ped., 15 IX 1829, Ruprecht» (LE!).

**ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ; ЮЗЗ.**

Эндемик.

Тетраплоид, отличающийся от диплоидного *R. oreophilus*, главным образом, бóльшими размерами вегетативных органов и более широкими, часто налегающими друг на друга, долями прикорневых листьев. Признаки видов часто перекрываются и точная идентификация не всегда возможна.

20 (153). **R. crassifolius** (Rupr.) Grossh. 1930, Фл. Кавк. 2:119. — *R. oreophilus* Bieb. var. *crassifolius* Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Petérsb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 286, 20 (Fl. Саус.).

Описан из Карабаха. Т у р u s: «In regione alpina montes Kaepes-Dagh provinciae Karabach, fl. Transcauc., 11 VII 1844, Kolenati» (LE!).

**ЦК; ВК; ЦЗ; ВЗ:** Мург.-Муровд., Караб.

Указан для **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Зернов, 2006: 272).

Юго-Зап. Азия (вост. Турция: гора Б. Арапат).

Тетраплоидный вид с крупными цветками, обитающий на высокогорных сланцевых осыпях.

21 (154). **R. abchasicus** Freyn, 1893, Österr. Bot. Zeitschr. 43: 373. — *R. sartorianus* auct. non Boiss. et Heldr.: Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 61, p. p.; Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1: 289.

Описан из Абхазии. Т у р u s: W?

**ЗК:** Уруп-Теб.; **ЗЗ:** Абх. (Клухорский перевал).

Указан для **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Зернов, 2006: 274).

Эндемик.

22 (155). **R. brachylobus** Boiss. et Hohen. 1849, in Boiss. Diagn. Pl. Or. sér. 1, 8: 6. — *R. svaneticus* Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Petérsb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 21 (Fl. Саус.). — *R. gymnadenus* Sommier et Levier, 1894, Тр. Петерб. бот. сада, 13, 2: 181. — *R. villarsii* Ledeb. subsp. *brachylobus* N. Busch, 1903, Мат. фл. Кавк. 3, 3: 169. — *R. buschii* Ovcz. 1937, Фл. СССР, 7: 744, 443. — *R. tebulossicus* Prima, 1974, Бот. журн. 59, 3: 369.

Описан из Ирана. *Typus*: «In humidis montis Totschal pr. Teheran, 1800 m, Kotschy» (K; isotypi — G, LE!).

22a. **R. brachylobus** Boiss. et Hohen. subsp. **brachylobus**.

**ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ**.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, сев. Иран).

22b. **R. brachylobus** Boiss. et Hohen. subsp. **incisilobatus** P. H. Davis, 1960, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 23: 129.

Описан из Турции. *Typus*: «Prov. Tunceli, Munzurdagh, 2400m, 18 VII 1957, Davis, Hedge» (E; isotypus — TBI!).

**ВЗ**: Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ; ЮЗ**.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция; сев. Ирак; сев. Иран: вост.).

23 (156). **R. lojkae** Sommier et Levier, 1894, Тр. Петерб. бот. сада, 13, 2: 185.

Описан из Грузии (Сванетия). *Typus*: «Radscha in jugi Mamisson alpinis editoribus ubi 1886 det. V. Lojka» (FI).

**ЗЗ**: Инг.-Рион. (Сванетия); **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос. (бассейн р. Б. Лиахва).

Указан для **ЗК**: Бело-Лаб. (Семагина, 1999: 128), Уруп-Теб., В. Куб. (Танфильев, Кононов, 1987: 45; Галушко, 1978: 287).

Эндемик.

24 (157). **R. balkharicus** N. Busch, 1926, Тр. Бот. муз. АН СССР, 19: 79.

Описан из Кабардино-Балкарии. *Lectotypus* (Еленевский и Дервиз-Соколова, 1989: 117): «Caucasus Centralis, Balkharia, alta vallis fluvii Rciwaschki, loc. Urta-tala, in pratis subalpino, 2018 m, 30 VI 1925, E. et N. Busch» (LE!).

**ЦК**: Малк., В. Тер. (Суук-ауз, Сукан, Рцывашки, Чайнашки, Таторс и др.).

Указан для **ЗК**: Бело-Лаб. (Семагина, 1999: 127).

Эндемик.

Очень похож на пиренейский *R. gouani* Willd. как оттопыренным опушением стеблей и формой прикорневых листьев, так и орешками с закрученными носиками. Отличается, главным образом, сильно рассеченными стеблевыми листьями.

25 (158). **R. bulbosus** L. 1753, Sp. Pl. 1: 554.

Описан из Европы.

25a. **R. bulbosus** L. subsp. **aleae** (Willk.) Rouy et Foucaud, 1893, Fl. Fr. 1: 106. — *R. aleae* Willk. 1859, Linnaea, 30: 84.

Описан из Испании. *Synonymi*: «Sierra de Guadarrama, VII 1843, F. Alea; In monte Serrota, VIII 1857, Cutanda et Ysern» (MA).

**ЗК**: Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб.; **СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ; Т**.

Указан для **ЗП** (Галушко, 1978: 285; Танфильев, Кононов, 1987: 45); **ВК**: В. Сулак., Ман.-Самур. (Муртазалиев, 2009, 1: 78).

Средиз. (европ. часть); Юго-Зап. Азия (Турция: Галатия, сев. Иран).

От европейского типового подвида отличается, главным образом, утолщенными корнями.

Sect. 3. **Notophilus** (Fourr.) Tzvel.

26 (159). **R. sardous** Crantz, 1763, Stirp. Austr. Fasc. 2: 84. — *R. pseudobulbosus* Schur, 1859, Verh. Siebenb. Ver. Naturw. 10, 3–4: 84.

Описан из Австрии (окр. Вены).

**ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб.; **СЗЗ; ЗЗ.**

Европа (кроме приатлант. п-ов).

Установлено, что автентики *R. sardous* и *R. pseudobulbosus* обладают гладкими небугорчатыми плодами.

В приатлантической Европе замещается подвидом subsp. *philonotis* (Ehrh.) Jelen. et Derv.-Sok.

27 (160). **R. marginatus** d'Urv. 1822, Mém. Soc. Linn. Paris, 1: 318.

Описан из Турции. *Typus*: P?

27a. **R. marginatus** d'Urv. subsp. **trachycarpus** (Fisch. et C. A. Mey.) Jelen. et Derv.-Sok. 1989, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 94, 1: 117. — *R. trachycarpus* Fisch. et C. A. Mey. 1837, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 3: 46. — *R. alexandri* Kem.-Nath. 1963, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 23: 34.

Описан по материалам из Крыма, Талыша и Турции. *Lectotypus* (Цвелёв, 2001: 133): «Tauria» (LE!).

**СЗЗ; ЗЗ; ВЗ; Т.**

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Галушко, 1978: 286); **БК:** Ман.-Самур. (Галушко, 1978: 286; Муртазалиев, 2009, 1: 81).

Юго-Вост. Европа (Крым); Средиз. (европ. часть); Юго-Зап. Азия.

28 (161). **R. sosnowskyi** Kem.-Nath. 1941, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 10: 25.

Описан из западной Грузии. *Syntypi*: «Megrelia, distr. Poti in arenosis littoralibus, 5 V 1902, Alexeenko; Distr. Achal-Senaki inter urb. Achal-Senaki et pag. Mendji, 12 IV 1939, Kemularia-Nathadze; Guria, distr. Ozurgety, prope pag. Etzeri, 12 V 1927, O. Zedelmeyer» (ТВИ).

**ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.

?Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

Мелкими орешками, снабженными шипиками, напоминает средиземноморский *R. trilobus* Desf., от которого отличается характером расчленения листьев.

29 (162). **R. cornutus** DC. 1817, Syst. Nat. 1: 300. — *R. lomatocarpus* Fisch. et C. A. Mey. 1835, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 1: 36.

Описан из Юго-Западной Азии. *Typus*: «In Oriente, Labillardiere» (FI).

**ВЗ:** Н. Кур.; **Т.**

Южн. Европа; Средиз. (Балканский п-ов); Юго-Зап. Азия.

30 (163). **R. muricatus** L. 1753, Sp. Pl.: 555.

Описан из Южной Европы.

**ЗЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб;

**Т.**

Южн., Юго-Вост. (Крым) Европа; Юго-Зап., Ср. Азия. Заносное в Америке.



Sect. 4. **Thora** DC.

31 (164). **R. helenae** Albov, 1891, Тр. Одесск. отд. Росс. общ. садовод.: 95.

Описан из Абхазии (Бзыбский хр.).

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк.; **ЗЗ:** Абх.

Эндемик.

От европейского *R. thora* L. (*R. tatrae* Borbás) отличается в 2–3 раза более мелкими листьями и, вероятно, более узкими лепестками.

Sect. 5. **Flammula** (Webb) Rouy et Foucaud

Subsect. 1. **Lingua** Lufarov

32 (165). **R. lingua** L. 1753, Sp. Pl. 1: 549.

Описан из Северной Европы.

**ЗП:** Аз.-Куб. (Таманский п-ов); **ВК:** Кубин.; **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Севан.

Указан для **ЗП:** 3. Ставр.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 45), Тер.-Сулак.; **ВК:** Ман.-Самур. (Муртазалиев, 2009, 1: 79).

Европа; Сев. (Сибирь), Юго-Зап. (Турция), Ср. Азия.

Subsect. 2. **Flammulae** Prantl emend. Lufarov

33 (166). **R. flammula** L. 1753, Sp. Pl. 1: 548.

Описан из Европы.

**ЦЗ:** Триал.-Н. Карт., Лори; **ВЗ:** Мург.-Муровд. (окр. Иджевана); **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Севан.

Европа; Сев. (юг Зап. Сибири), Юго-Зап. (сев.-вост. Турция) Азия; Сев.-Зап. Африка.

Subsect. 3. **Strigillosi** Lufarov

34 (167). **R. strigillosus** Boiss. et A. Huet, 1856, in Boiss. Diagn. Pl. Or. sér. 2, 5: 6.

Описан из северной Турции. Syntypі (fide Davis, 1965: 192): «In humidis prope Palanteuken (Palandöken Da. nr. Ersurum) 1830–2130 m, Huet» (K), «In Persia boreali, Buhse».

**ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Занг. (Биченахский перевал).

Юго-Зап. Азия (Турция, сев.-зап. Иран).

Sect. 6. **Glossophyllum** (Fourr.) Tzvel.

35 (168). **R. ophioglossifolius** Vill. 1789, Hist. Pl. Dauphiné, 3: 731.

Описан из южной Франции.

**СЗЗ:** Анап.-Гел. (Геленджик); **ЗЗ:** Абх.; **ВЗ:** Н. Кур. (Геокчайский р-н.); **Т:**

Центр., Южн., Юго-Вост. (Крым) Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия; Сев. Африка.

Sect. 7. **Pterocarpa** Ovcz. ex Tzvel.

36 (169). **R. pedatus** Waldst. et Kit. 1803, Descr. Icon. Pl. Rar. Hung. 2: 112.  
Описан из Венгрии.

36а. **R. pedatus** Waldst. et Kit. subsp. **silvisteppaceus** (Dubovik) Jelen. et Derv.-Sok. 1989, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 94, 1: 120. — *R. silvisteppaceus* Dubovik, 1968, Новости сист. высш. раст. 5: 116.

Описан из средней полосы России.

**ЗП:** Аз.-Куб. (Тамань); **ВП:** В. Ставр. (Винодельное).

Вост. Европа (степь и лесостепь); Сев. Азия (Зап. Сибирь).

Отличается от типового подвида слабо опушенными широкопленчатыми чашелистиками и более широкими долями листьев.

Sect. 8. **Polyrhizos** Tzvel.

37 (170). **R. aucheri** Boiss. 1841, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 16: 351. — *R. elbrusensis* Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 34.

Описан из южного Ирана. Ту р и с: «Isfahan, № 4006, Aucher» (BM!).

**ЮЗ:** Нах. (Каракуш, Азнабюрт, Бузгов); **Т** (Карабах-Юрды).

Юго-Зап. Азия (сев. и центр. Иран).

38 (171). **R. polyrhizos** Stephan ex Willd. 1800, Sp. Pl. 2: 1324.

Описан из Сибири.

**ЮЗ:** Ерев., Севан. (окр. г. Севан), Занг. (Сисианский р-н).

Вост. Европа (юго-вост.); Сев. (юг Зап. Сибири); Юго- Зап., Ср. Азия.

Sect. 9. **Ranunculastrum** DC.

39 (172). **R. illyricus** L. 1753, Sp. Pl. 1: 552. — *R. meridionalis* Grossh. 1948, Бот. журн. 33, 3: 311. — *R. alexeenkoi* Grossh. 1948, цит. соч.: 309. — *R. scythicus* Klokov ex Grossh. 1948, цит. соч.: 309, nom. nud.; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 71.

Описан из Европы.

**ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Инг.-Рион. (редко), Рион.-Квир.; **ЦЗ; ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Караб.; **ЮЗ.**

Европа; Юго- Зап. Азия (Турция, сев. Иран).

40 (173). **R. cicutarius** Schltdl. 1819, Animadv. Bot. Ranunc. Cand. 1: 25. — *R. hircanus* Grossh. 1947, Докл. АН АзербССР, 3, 10: 450.

Описан, вероятно, из Закавказья. Тип, по-видимому, не сохранился (ранее был в В).

**ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Занг. (Кафанский р-н); **Т.**

Юго-Зап. Азия (Иран).

41 (174). **R. oxyspermus** Vieb. ex Willd. 1800, Sp. Pl. 2: 1328.

Описан, по-видимому, с Северного Кавказа («in Sibiria ad fluvium Tereka»).

**ЗП; ВП; ЦК:** В. Тер; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.**

Указан для **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 80).

Юго-Вост. Европа (Крым); Юго- Зап. (Турция, сев. Ирак, Иран), Ср. (южн. Туркменистан) Азия.

Sect. 10. **Hecatonia** (Lour.) DC.

42 (175). **R. scleratus** L. 1753, Sp. Pl. 1: 551. — *R. dolosus* Fisch. et C. A. Mey. 1838, in Hohen. Bull. Soc. Nat. Moscou, 1: 384.

Описан из Европы.

Все районы Кавказа (в горах до 2000 м).

Атл., Сев., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Юго-Вост., Южн. Азия; Сев. Америка; Сев. Африка.

Sect. 11. **Echinella** DC.

43 (176). **R. arvensis** L. 1753, Sp. Pl. 1: 555.

Описан из Южной Европы.

**ВК; СЗЗ** (редко); **ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ; Т.**

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб., З. Ставр. (Косенко, 1970: 112; Галушко, 1978: 286; Танфильев, Кононов, 1987: 45); **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Тер. (Галушко, 1978: 286); **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур. (Муртазалиев, 2009, 1: 77).

Центр., Южн., Юго-Вост. (Крым), Вост. (Зап. Украина) Европа; Юго-Зап. (Афганистан), Ср., Южн. (Сев. Индия) Азия.

Sect. 12. **Parviflori** Jelen. et Derv.-Sok.

44 (177). **R. chius** DC. 1817, Syst. Nat. 1: 299.

Описан из Греции (о. Хиос). Тур u s: «In insula Scio archipelagi Graeci, Olivier» (P).

**ЗЗ; ВЗ:** Н. Кур.; **Т.**

Указан для **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Зернов, 2006: 274).

Южн., Юго-Вост. (юг и Крым) Европа; Средиз. (Италия, Мальта, Греция); Юго-Зап. Азия (от Турции и Израиля до Ирана).

Subgen. 2. **Batrachium** (DC.) Peterm.

45 (178). **R. rionii** Lager, 1848, Flora (Regensb.), 31: 49. — *Batrachium rionii* (Lager) Numan, 1852, Bot. Not. (Lund): 98.

Описан из Швейцарии.

**ЗП; ВП; ЗК; ЦК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ; Т.**

Центр., Вост. Европа; Сев. (Зап. Сибирь), Юго-Зап., Ср., Центр. (Синьцзян) Азия. Заносное в Сев. Америке и Южн. Африке.

46 (179). **R. trichophyllum** Chaix, 1786, in Vill. Hist. Pl. Dauphiné, 1: 335. — *Batrachium divaricatum* (Schränk) Wimm. 1840, Fl. Schles.: 9. — *B. trichophyllum* (Chaix) F. W. Schultz, 1848, Arch. Fl. Fr. Allemag. 1: 107. — *B. triphyllum* (Wallr.) Dumort. 1863, Bull. Soc. Bot. Belg. 2: 214.

Описан из Франции.

**ЗП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.**

Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Южн. (сев.) Азия. Заносное в Сев. Америке, Австралии и Нов. Зеландии.

Из состава кавказских лютиков исключен *R. agerii* Bertol. (= *R. gracilis* E. D. Clarke), сомнительно произрастание *R. dissectus* Bieb. subsp. *huetti* (Boiss.) P. H. Davis.

### 17 (32). **Ficaria** Guett.\*

1 (180). **F. calthifolia** Rchb. 1832, Fl. Germ. Excurs.: 718. — *F. grandiflora* Robert, 1838, Pl. Phan. Toulon: 57. — *Ranunculus ficaria* L. [var.] *β. calthifolius* (Rchb.) Arcang. 1882, Comp. Fl. Ital.: 11. — *Ficaria verna* Huds. subsp. *calthifolia* (Rchb.) Velen. 1891, Fl. Bulg.: 5. — *Ranunculus ficaria* subsp. *ficariiformis* Rouy et Foucaud, 1893, Fl. Fr. 1: 73. — *Ficaria ledebourii* Grossh. et Schischk. 1930, в Гроссг. Фл. Кавк. 2: 108. — *F. varia* Otsch. 1965, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 25: 6. — *F. verna* subsp. *ledebourii* (Grossh. et Schischk.) Soó, 1966, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 12, 1–2: 111. — *F. popovii* Khokhr. 1969, Бюлл. Главн. бот. сада АН СССР, 73: 76. — *F. popovii* subsp. *abchasisca* Khokhr. 1969, цит. соч.: 77. — *F. verna* auct. non Huds. 1762: Овч. 1937, Фл. СССР, 7: 333, р. р. — *Ranunculus ficaria* auct. non L.: Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 24.

Описан из Юго-Восточной Европы («Далмация»).

**ЗП; ВП: Тер.-Сулак.; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт., ВЗ: Ширв.; ЮЗЗ; ЮЗ.**

Центр., Южн., Юго-Вост. (Румыния, Болгария, Причерноморье, Крым), Вост. (юг) Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

2 (181). **F. fascicularis** C. Koch, 1841, Linnaea, 15: 249. — *Ranunculus kochii* Ledeb. 1842, Fl. Ross. 1: 731; P. H. Davis, 1965, Fl. Turk. 1: 194. — *R. edulis* Boiss. et Hohen. 1849, in Boiss. Diagn. Pl. Or. sér. 1, 7: 4.

Описан из Закавказья. Т у р у s: «In parte meridionali prov. Schuragel, nec non in montis f. d. Ilva, 1837, Dr. Koch» (В?; isotypus — LE!).

**ЦЗ: Лори; ЮЗЗ: Джав.-В. Ах., Араг.; ЮЗ; Т.**

Юго-Зап. (Турция, сев. Ирак, Иран), Ср. (Копетдаг) Азия.

3 (182). **F. ficarioides** (Bory et Chaub.) Halácsy, 1901, Consp. Fl. Graec. 1: 26. — *Ranunculus ficarioides* Bory et Chaub. 1838, Nuov. Fl. Pélop.: 34. — *Ficaria peloponnesiaca* Nyman, 1855, Syll. Fl. Europ.: 179. — *F. edulis* auct. non Boiss. et Hohen.: Grossh. 1930, Фл. Кавк. 2: 108.

Описан из Греции.

\* А. Н. Луферов.