

46 (179). **R. trichophyllum** Chaix, 1786, in Vill. Hist. Pl. Dauphiné, 1: 335. — *Batrachium divaricatum* (Schränk) Wimm. 1840, Fl. Schles.: 9. — *B. trichophyllum* (Chaix) F. W. Schultz, 1848, Arch. Fl. Fr. Allemag. 1: 107. — *B. triphyllum* (Wallr.) Dumort. 1863, Bull. Soc. Bot. Belg. 2: 214.

Описан из Франции.

ЗП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.

Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Южн. (сев.) Азия. Заносное в Сев. Америке, Австралии и Нов. Зеландии.

Из состава кавказских лютиков исключен *R. agerii* Bertol. (= *R. gracilis* E. D. Clarke), сомнительно произрастание *R. dissectus* Bieb. subsp. *huetti* (Boiss.) P. H. Davis.

17 (32). **Ficaria** Guett.*

1 (180). **F. calthifolia** Rchb. 1832, Fl. Germ. Excurs.: 718. — *F. grandiflora* Robert, 1838, Pl. Phan. Toulon: 57. — *Ranunculus ficaria* L. [var.] *β. calthifolius* (Rchb.) Arcang. 1882, Comp. Fl. Ital.: 11. — *Ficaria verna* Huds. subsp. *calthifolia* (Rchb.) Velen. 1891, Fl. Bulg.: 5. — *Ranunculus ficaria* subsp. *ficariiformis* Rouy et Foucaud, 1893, Fl. Fr. 1: 73. — *Ficaria ledebourii* Grossh. et Schischk. 1930, в Гроссг. Фл. Кавк. 2: 108. — *F. varia* Otsch. 1965, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 25: 6. — *F. verna* subsp. *ledebourii* (Grossh. et Schischk.) Soó, 1966, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 12, 1–2: 111. — *F. popovii* Khokhr. 1969, Бюлл. Главн. бот. сада АН СССР, 73: 76. — *F. popovii* subsp. *abchasisca* Khokhr. 1969, цит. соч.: 77. — *F. verna* auct. non Huds. 1762: Овч. 1937, Фл. СССР, 7: 333, р. р. — *Ranunculus ficaria* auct. non L.: Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 24.

Описан из Юго-Восточной Европы («Далмация»).

ЗП; ВП: Тер.-Сулак.; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт., ВЗ: Ширв.; ЮЗЗ; ЮЗ.

Центр., Южн., Юго-Вост. (Румыния, Болгария, Причерноморье, Крым), Вост. (юг) Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

2 (181). **F. fascicularis** C. Koch, 1841, Linnaea, 15: 249. — *Ranunculus kochii* Ledeb. 1842, Fl. Ross. 1: 731; P. H. Davis, 1965, Fl. Turk. 1: 194. — *R. edulis* Boiss. et Hohen. 1849, in Boiss. Diagn. Pl. Or. sér. 1, 7: 4.

Описан из Закавказья. Т у р у s: «In parte meridionali prov. Schuragel, nec non in montis f. d. Ilva, 1837, Dr. Koch» (В?; isotypus — LE!).

ЦЗ: Лори; ЮЗЗ: Джав.-В. Ах., Араг.; ЮЗ; Т.

Юго-Зап. (Турция, сев. Ирак, Иран), Ср. (Копетдаг) Азия.

3 (182). **F. ficarioides** (Bory et Chaub.) Halácsy, 1901, Consp. Fl. Graec. 1: 26. — *Ranunculus ficarioides* Bory et Chaub. 1838, Nuov. Fl. Pélop.: 34. — *Ficaria peloponnesiaca* Nyman, 1855, Syll. Fl. Europ.: 179. — *F. edulis* auct. non Boiss. et Hohen.: Grossh. 1930, Фл. Кавк. 2: 108.

Описан из Греции.

* А. Н. Луферов.

БК: Ассо-Арг., Кубин.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.

Юго-Вост. Европа (Балканский п-ов); Средиз. (Греция); Юго-Зап. Азия (Турция, сев. Иран).

4 (183). **F. stepporum** P. A. Smirn. 1958, Тр. Приокско-Террас. заповед. 2: 142. — *F. verna* auct. non Huds.: Овч. 1937, Фл. СССР, 7: 333, р. р. — *Ranunculus ficaria* auct. non L.: Tutin, 1964, Fl. Europ. 1: 234, р. р.

Описан из Восточной Европы.

ЗП: Аз.-Куб. (Краснодарский край: Кущевский р-он).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. (Причерноморье, Крым), Вост. (центр и юг) Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).

18 (33). **Buschia** Ovcz.*

1 (184). **B. lateriflora** (DC.) Ovcz. 1940, Бот. журн. 25, 4–5: 339; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 72. — *Ranunculus lateriflorus* DC. 1817, Syst. Nat. 1: 251; Овч. 1937, Фл. СССР, 7: 474; Елен. и Дерв.-Сок. 1989, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 94, 1: 121; Зернов, 2006, Фл. Сев.-Зап. Кавк.: 274.

Описан, вероятно, из Турции. Турис: «In Oriente, Labillardière» (P?).

СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Нах., Занг., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Краснодар) (Косенко, 1970: 111; Зернов, 2006: 274, sub nom. *Ranunculus lateriflorus* DC.), З. Ставр. (Танфильев, Кононов, 1987: 45; Иванов, 2001: 60, sub nom. *R. lateriflorus*); **ЗК:** Бело-Лаб. (С. В. Бондаренко, личн. сообщ.).

Центр., Южн., Юго-Вост. (Балканский п-ов, Крым), Вост. (Украина: зап., юг; Россия: к югу от Воронежской и Самарской областей) Европа; Сев. (юг Зап. Сибири), Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. (Казахстан) Азия.

Для этого вида характерны сближенные листья, резко суженные в основании, необычное для лютиков ложнодихотомическое ветвление стебля, сидячие или на коротких ножках цветки, 2.4–4(6) мм в диам., собранные по 3–4 в компактные группы (реже одиночные); лепестки-нектарники в числе 3–5, лопатчатые, суженные при основании в ноготок, желтоватые или беловато-пленчатые, обычно короче чашелистиков; тычинок 4–7; орешки 2.8–3.3 мм дл., окаймленные, слабо бугорчатые, с прямым, в верхней части дугообразным стилодием, почти равным половине длины орешка (Овчинников, 1940; Луферов, 2002в).

19 (34). **Ceratocephala** Moench**

1 (185). **C. incurva** Steven, 1848, Bull. Soc. Nat. Moscou, 21: 269 («*incurvus*»); Цвел. 2001, Фл. Вост. Евр. 10: 162. — *C. falcata* (L.) Pers. subsp. *incurva* (Steven) Chrtk et Chrtková, 1976, Preslia, 48, 2: 120. — *C. falcata* auct. non (L.) Pers.: Овч. 1937, Фл. СССР, 7: 324 р. р.; auct. fl. cauc.

* А. Н. Луферов.

** А. Е. Грабовская-Бородина.