

БК: Ассо-Арг., Кубин.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.

Юго-Вост. Европа (Балканский п-ов); Средиз. (Греция); Юго-Зап. Азия (Турция, сев. Иран).

4 (183). **F. stepporum** P. A. Smirn. 1958, Тр. Приокско-Террас. заповед. 2: 142. — *F. verna* auct. non Huds.: Овч. 1937, Фл. СССР, 7: 333, р. р. — *Ranunculus ficaria* auct. non L.: Tutin, 1964, Fl. Europ. 1: 234, р. р.

Описан из Восточной Европы.

ЗП: Аз.-Куб. (Краснодарский край: Кущевский р-он).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. (Причерноморье, Крым), Вост. (центр и юг) Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).

18 (33). **Buschia** Ovcz.*

1 (184). **B. lateriflora** (DC.) Ovcz. 1940, Бот. журн. 25, 4–5: 339; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 72. — *Ranunculus lateriflorus* DC. 1817, Syst. Nat. 1: 251; Овч. 1937, Фл. СССР, 7: 474; Елен. и Дерв.-Сок. 1989, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 94, 1: 121; Зернов, 2006, Фл. Сев.-Зап. Кавк.: 274.

Описан, вероятно, из Турции. Турис: «In Oriente, Labillardière» (P?).

СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Нах., Занг., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Краснодар) (Косенко, 1970: 111; Зернов, 2006: 274, sub nom. *Ranunculus lateriflorus* DC.), З. Ставр. (Танфильев, Кононов, 1987: 45; Иванов, 2001: 60, sub nom. *R. lateriflorus*); **ЗК:** Бело-Лаб. (С. В. Бондаренко, личн. сообщ.).

Центр., Южн., Юго-Вост. (Балканский п-ов, Крым), Вост. (Украина: зап., юг; Россия: к югу от Воронежской и Самарской областей) Европа; Сев. (юг Зап. Сибири), Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. (Казахстан) Азия.

Для этого вида характерны сближенные листья, резко суженные в основании, необычное для лютиков ложнодихотомическое ветвление стебля, сидячие или на коротких ножках цветки, 2.4–4(6) мм в диам., собранные по 3–4 в компактные группы (реже одиночные); лепестки-нектарники в числе 3–5, лопатчатые, суженные при основании в ноготок, желтоватые или беловато-пленчатые, обычно короче чашелистиков; тычинок 4–7; орешки 2.8–3.3 мм дл., окаймленные, слабо бугорчатые, с прямым, в верхней части дугообразным стилодием, почти равным половине длины орешка (Овчинников, 1940; Луферов, 2002в).

19 (34). **Ceratocephala** Moench**

1 (185). **C. incurva** Steven, 1848, Bull. Soc. Nat. Moscou, 21: 269 («*incurvus*»); Цвел. 2001, Фл. Вост. Евр. 10: 162. — *C. falcata* (L.) Pers. subsp. *incurva* (Steven) Chrtk et Chrtková, 1976, Preslia, 48, 2: 120. — *C. falcata* auct. non (L.) Pers.: Овч. 1937, Фл. СССР, 7: 324 р. р.; auct. fl. cauc.

* А. Н. Луферов.

** А. Е. Грабовская-Бородина.

Описан из Крыма и Закавказья («in Tauria campestri, Iberia, Armenia rossica»).

ЗП: Аз.-Куб. (сев.), З. Ставр. (сев.); **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ; ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ; Т.**

Указан для **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 44, sub nom. *C. falcata*); **ЦК:** В. Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 44; Михеев, 2009: 21, sub nom. *C. falcata*).

Юго-Вост. (Крым), Вост. (низовья Волги и Дона) Европа; Юго-Зап. (Иран), Ср. Азия.

Растения этого вида для Кавказа обычно приводили под названием западноевропейского *C. falcata*.

2 (186). **C. testiculata** (Crantz) Roth, 1827, Enum. Pl. Phaen. Germ. 1, 1: 1014 («*testiculatus*»); Bess. 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 70, comb. illeg. (cum auct. bas. Crantz et Vieb.); Цвел. 2001, Фл. Вост. Евр. 10: 161, cum auct. comb. Bess. — *Ranunculus testiculatus* Crantz, 1763, Stirp. Austr. Fasc. 2: 97. — *Ceratocephala orthoceras* DC. 1817, Syst. Nat. 1: 231. — *C. falcata* auct. non (L.) Pers.: Тахт. 1954, Фл. Арм. 1: 209; Зернов, 2006, Фл. Сев.-Зап. Кавк.: 269.

Описан из Австрии.

ЗП; ВП; ЗК: Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Тер.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ; ВЗ:** Ширв.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах.; **Т.**

Указан для **ЦК:** В. Кум. (Михеев, 2009: 21); **?ВК:** Ман.-Самур. (побережье Каспийского моря) (Муртазалиев, 2009, 1: 82).

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз. (вост.); Сев. (юг Зап. Сибири), Юго-Зап., Ср. Азия.

Subtrib. 2. **Myosurinae** Tamura

20 (35). **Myosurus** L.*

1 (187). **M. minimus** L. 1753, Sp. Pl.: 284.

Описан из Европы.

ЗП; ВП: Тер.-Кум.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ВК:** Ман.-Самур. (Махачкала); **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх. (Гагра); **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Н. Кур.; **Т.**

Указан для **ВК:** Ассо-Арг. (Грозный) (Галушко, 1978: 281).

Атл., Сев. (юг), Центр., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, зап. Иран); Сев. Америка; Австралия.

* А. Е. Грабовская-Бородина.