

Описан из Крыма и Закавказья («in Tauria campestri, Iberia, Armenia rossica»).

ЗП: Аз.-Куб. (сев.), З. Ставр. (сев.); **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ; ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ; Т.**

Указан для **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 44, sub nom. *C. falcata*); **ЦК:** В. Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 44; Михеев, 2009: 21, sub nom. *C. falcata*).

Юго-Вост. (Крым), Вост. (низовья Волги и Дона) Европа; Юго-Зап. (Иран), Ср. Азия.

Растения этого вида для Кавказа обычно приводили под названием западноевропейского *C. falcata*.

2 (186). **C. testiculata** (Crantz) Roth, 1827, Enum. Pl. Phaen. Germ. 1, 1: 1014 («*testiculatus*»); Bess. 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 70, comb. illeg. (cum auct. bas. Crantz et Vieb.); Цвел. 2001, Фл. Вост. Евр. 10: 161, cum auct. comb. Bess. — *Ranunculus testiculatus* Crantz, 1763, Stirp. Austr. Fasc. 2: 97. — *Ceratocephala orthoceras* DC. 1817, Syst. Nat. 1: 231. — *C. falcata* auct. non (L.) Pers.: Тахт. 1954, Фл. Арм. 1: 209; Зернов, 2006, Фл. Сев.-Зап. Кавк.: 269.

Описан из Австрии.

ЗП; ВП; ЗК: Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Тер.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ; ВЗ:** Ширв.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах.; **Т.**

Указан для **ЦК:** В. Кум. (Михеев, 2009: 21); **?ВК:** Ман.-Самур. (побережье Каспийского моря) (Муртазалиев, 2009, 1: 82).

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз. (вост.); Сев. (юг Зап. Сибири), Юго-Зап., Ср. Азия.

Subtrib. 2. **Myosurinae** Tamura

20 (35). **Myosurus** L.*

1 (187). **M. minimus** L. 1753, Sp. Pl.: 284.

Описан из Европы.

ЗП; ВП: Тер.-Кум.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ВК:** Ман.-Самур. (Махачкала); **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх. (Гагра); **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Н. Кур.; **Т.**

Указан для **ВК:** Ассо-Арг. (Грозный) (Галушко, 1978: 281).

Атл., Сев. (юг), Центр., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, зап. Иран); Сев. Америка; Австралия.

* А. Е. Грабовская-Бородина.