

Trib. 4. **Adonieae** Rchb.

21 (36). **Adonis** L., nom. cons.*

Subgen. 1. **Adonanthe** (Spach) W. T. Wang

Sect. **Adonanthe**

Subsect. **Vernales** Bobrov ex Tamura

1 (188). **A. vernalis** L. 1753, Sp. Pl. 1: 547. — *Adonanthe vernalis* (L.) Spach, 1839, Hist. Nat. Vég. 7: 228. — *Adonis pratensis* Ledeb. 1841, Fl. Ross. 1: 42. — *Adoniastrum vernale* (L.) Schur, 1877, Verh. Naturf. Ver. Brünn, 15: 27. — *Adonis apennina* L. var. *europaeus* Huth, 1890, Samml. Naturwiss. Vorträge, 3, 8: 66. — *Chrysocyathus vernalis* (L.) Holub, 1998, Preslia, 70, 2: 103.

Описан из Европы.

ЗП; ВП: В. Ставр.; **ЗК:** Адаг.-Пиши., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.

Европа; Сев. (Зап. и Вост. Сибирь), Ср. (Казахстан: сев., вост.) Азия.

2 (189). **A. volgensis** Steven ex DC. 1817, Syst. Nat. 1: 545. — *A. marschalliana* Turcz. ex Bess. 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 22, № 673. — *A. vernalis* L. var. *volgensis* (Steven ex DC.) Regel et Radde, 1861, Bull. Soc. Nat. Moscou, 33: 35 («*wolgensis*»). — *Adonanthe volgensis* (Steven ex DC.) Chrtek et Slavíková, 1978, Preslia, 50, 1: 24. — *Chrysocyathus volgensis* (Steven ex DC.) Holub, 1998, Preslia, 70, 2: 102.

Описан из Восточной Европы (Нижняя Волга).

ВК: Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел. (окр. Новороссийска); **ЮЗ:** Севан.; **Т:** Заносное.

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев. (Зап. Сибирь), Юго-Зап. (сев. Турция, сев. Иран), Ср. (Казахстан, Кыргызстан) Азия.

Возможна гибридизация с *A. vernalis*, однако на Кавказе таких образцов пока не обнаружено.

Subgen. 2. **Adonis**

Sect. **Lophocarpa** W. T. Wang

Subsect. 1. **Aestivales** (W. T. Wang) Lufarov

3 (190). **A. aestivalis** L. 1762, Sp. Pl. ed. 2: 771. — *A. miniata* Jacq. 1776, Fl. Austr. 4: 29, tab. 354. — *A. dentata* Delile var. *provincialis* DC. 1817, Syst. Nat. 1: 224. — *A. aestivalis* var. *parviflora* Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 378. — *A. parviflora* Fisch. ex DC. 1824, Prodr. 1: 24. — *A. ambigua* Gaudin, 1828, Fl. Helvet. 3: 518. — *A. squarrosa* Steven, 1848, Bull. Soc. Nat. Moscou, 21, 3: 272. — *A. aestivalis* var. *squarrosa* (Steven) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 18. — *A. eriocalycina* Boiss. 1867, l. c. 1: 47. — *A. autumnalis* L. var. *eriocalycina* (Boiss.) Huth, 1890, Samml. Naturwiss. Vorträge, 3, 8: 65. — *A. aestivalis* var. *velutina* Lipsky, 1894, Тр. Тифл. бот. сада, 4: 226 (Фл. Кавк.). — *A. aestivalis* subsp. *parviflora* (Fisch. ex DC.) N. Busch, 1903, Mat. фл. Кавк. 3, 3: 201. — *A. bienertii* Butkov, 1941, Бот. мат. (Ташкент), 6: 3. — *A. aestivalis* subsp. *provincialis* (DC.) Steinb. 1971, Webbia, 25, 2: 315.

* А. Н. Луферов (Луферов, 1999).

Описан из Европы.

ЗП; ВП: В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК:** Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.**

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап., Ср., Центр., Южн. Азия.

На Кавказе известны следующие разновидности: var. *aestivalis* (все указанные районы); var. *parviflora* Vieb., характеризующаяся более мелкими цветками (5–10(15) мм в диам.) и орешками (2.5–4 мм дл.), более тонкими (1–2(4) мм в диам.), короткими (5–20 см дл.), простыми, реже слабоветвящимися побегами (все районы, но чаще в **ВП; ВК; ЦЗ; ВЗ; Т.**); var. *provincialis* (DC.) W. T. Wang (incl.: *A. dentata* var. *provincialis*, *A. squarrosa*, *A. aestivalis* var. *velutina*, *A. bienertii*), имеющая густое опушение чашелистиков (при их основании или по всей нижней поверхности), стеблей, черешков, реже листовых пластинок (во всех районах).

Subsect. 2. **Dentatae** (W. T. Wang) Luferov

4 (191). **A. flammea** Jacq. 1776, Fl. Austr. 4: 29, tab. 355. — *A. caudata* Steven, 1848, Bull. Soc. Nat. Moscou, 21, 3: 273. — *A. flammea* var. *caudata* (Steven) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 19.

Описан из Европы.

ЗП; ВП: В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг.; **СЗЗ:** Анап.-Гел., Пшад.-Джубг.; **ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.; **Т.**

Атл., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. Азия.

A. flammea var. *caudata* отличается от типовой разновидности более длинным (2–2.7 мм) стилодием, чернеющим на верхушке (**СЗЗ:** Анап.-Гел. (Новороссийск, Анапа)).

Приводимые для Кавказа образцы *A. annua* L. (Шлангена, 1975) были переопределены нами как *A. flammea* и *A. aestivalis*.

ORDO 10. PAPAVERALES

Fam. 34. PAPAVERACEAE Juss., nom. cons.*

Subfam. 1. CHELIDONIOIDEAE W. R. Ernst

Trib. 1. **Chelidoniae** Dumort.

1 (37). **Chelidonium** L.

1 (192). **C. majus** L. 1753, Sp. Pl.: 505.

Описан из Европы.

ЗП (редко); **ВП:** Тер.-Кум. (редко); **ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек. (редко), Мург.-Муровд., Н. Кур. (редко), Караб.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Мегр.-Зан. (редко), Ю. Караб. (редко); **Т.**

* А. Д. Михеев (Михеев, 1993).