

A. caucasicum subsp. *nasutum* (Fisch.) N. Busch f. *gigas* N. Busch, 1900, l. c.: 118. — *Lectotypus* (Luferov, hoc loco): «Цхра-Цхаро, 8000 футов, 1888, Акинфиев» (LE!). — «Форма мощная, цветки крупные, шлем около 2.5 см выс.».

К выбранному нами в качестве лектотипа образцу «для сравнения приложен 1 цветок от экз. Нордманна из герб. Ледебур и на этикетке рукой Шмальг. написано: “Сходно с оригинальным экземпляром из СПб. Б. С., собр. Нордманн бл. Тифлиса”») (Н. Буш, 1903: 80–81).

A. caucasicum subsp. *nasutum* f. *pyramidato-ramosa* N. Busch, 1900, l. c.: 119. — *Lectotypus* (Luferov, hoc loco): «Kaukasus, Eichwald» (LE!). — «Ничем от *A. nasutum* не отличается, кроме пирамидальной ветвистости».

A. caucasicum subsp. *nasutum* f. *simplex* N. Busch, 1900, l. c.: 119. — *Lectotypus* (Luferov, hoc loco): «Мингрелия, хребет Асхи, альпийские пастбища, 22 VIII 18[94], № 557, Альбов» (LE!). — «С неветвистым стеблем, довольно низкого роста (30–50 см выс.), с соцветием в виде простой кисти».

Trib. 2. **Delphinieae** Schrödinger

7 (22). **Delphinium** L.*

Subgen. **Oligophyllon** Dimitrova

Sect. 1. **Microcentra** N. I. Malyutin

1 (58). **D. foetidum** Lomakin, 1897, Тр. Тифл. бот. сада, 2: 285. — *D. brunonianum* auct. non Royle: Н. Буш, 1903, Мат. фл. Кавк. 3, 3: 60.

Описан из Карабаха. Турус: «Карабах, г[ора] Пиричингил, 10000', 6 VII 1895, А. Л[омакин]» (ТВИ; isotypus — LE!).

ЮЗЗ: Араг.; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Занг., Ю. Караб. Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

2 (59). **D. caucasicum** С. А. Мей. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 200. — *D. speciosum* Bieb. var. *caucasicum* (С. А. Мей.) Huth, 1895, Bot. Jahrb. Syst. 20: 416.

Описан с Центрального Кавказа. *Lectotypus* (Luferov, hoc loco): «In alpinis Kasbek, (8000–9600 ft), 17 IX 1829, № 1727, С. А. Meyer» (LE!); *syntypus*: «Cauc., С. А. Meyer», «In alpinis versus Kasbek, 1400–1600 ft, 17–18 IX [1829]; Kasbek, С. А. Meyer» (LE!).

ЗК: Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.

Эндемик.

Sect. 2. **Pogonanthus** W. T. Wang

Subsect. 2. **Speciosa** N. I. Malyutin

3 (60). **D. speciosum** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 12. — *D. bracteosum* Sommier et Levier var. *macranthum* Sommier et Levier, 1893, Тр. Петерб. бот. сада, 13: 25.

Описан из Центрального Закавказья. Турус: «Kaischaug» (LE!).

* А. Н. Луферов.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.

Эндемик.

4 (61). **D. dasycarpum** Steven ex DC. 1817, Syst. Nat. 1: 547. — *D. speciosum* Bieb. var. *dasycarpum* (Steven ex DC.) Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 36, 287 (Fl. Cauc.). — *D. ciliatum* Steven, in sched. herb. LE.

Описан с Северного Кавказа. Турус: «Beschtau, Steven» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК;** **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.

Указан для **ЗЗ:** Инг.-Рион. (Кемулариа-Натадзе, 1966: 87); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Кемулариа-Натадзе, Гагнидзе, 1969: 17; Гагнидзе, 1974: 55).

Эндемик.

5 (62). **D. ironorum** N. Busch, 1931, Изв. АН СССР, 7: 450. — *D. speciosum* auct. non Bieb.: Невский, 1937, Фл. СССР, 7: 128, р. р.; Гроссг., 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 26.

Описан из Южной Осетии. Турус: «Юго-Осетинская экспедиция АН СССР. Джомох, перевал Бах-фандаг, субальпийский луг, 2750 м, 24 VIII 1930, Е. и Н. Буш» (LE!).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.

Указан для **ЗЗ:** Инг.-Рион. (Кемулариа-Натадзе, 1966: 88).

Эндемик.

6 (63). **D. araraticum** (N. Busch) Grossh. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 30. — *D. tomentellum* N. Busch var. *araraticum* N. Busch, 1903, Мат. фл. Кавк. 3, 3: 71.

Описан из Армении. Lectotypus (Lufarov, hoc loco; Grossheim, «typus», in sched.): «Armenia Rossica, von m. Ararat, inter Kurgan et Achur, 1854, Chodzko» (LE!).

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Занг.

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев. Иран).

7 (64). **D. megalanthum** Nevski, 1937, Фл. СССР, 7: 722, 129.

Описан с Северного Кавказа. Турус: «Около ледника Безенги, 25 VII 1892, Липский» (LE!).

ЦК: Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг.

Указан для **ЗК:** Уруп-Теб. (Кемулариа-Натадзе, Гагнидзе, 1969: 19).

Эндемик.

8 (65). **D. bracteosum** Sommier et Levier, 1893, Тр. Петерб. бот. сада, 13: 25. — *D. flexuosum* Bieb. var. *bracteolatum* Akinf. 1894, Тр. общ. исп. прир. Харьк. унив. 25: 168.

Описан из Северной Осетии. Турус (fide Невский, 1937: 138): «Близ Цея, 1886, Лойко» (FI).

ЦК: Малк., В. Тер.; **ВК:** В. Сулак.; **ЗЗ:** Инг.-Рион.

Эндемик.

9 (66). **D. ruprechtii** Nevski, 1937, Фл. СССР, 7: 723, 138. — *D. bracteosum* Sommier et Levier var. *ruprechtii* (Nevski) Grossh. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 27.

Описан из Дагестана. Т у р u s: «Дагестан, между аулами Чирах и Рыча» (LE!).

БК: Ман.-Самур.

Эндемик.

10 (67). **D. arcuatum** N. Busch, 1903, Мат. фл. Кавк. 3, 3: 71.

Описан из Дагестана. Т у р u s: «Prov. Dagestan, distr. Samur, пропе pagum Kurusch, in pratis, 7600', 1 VIII 1898, Th. Alexeenko» (LE!).

БК: Ман.-Самур., Кубин.

Указан для **БК:** В. Сулак. (Кемулариа-Натадзе, Гагнидзе, 1969: 17).

Эндемик.

11 (68). **D. charadzeae** Kem.-Nath. et Gagnidze, 1965, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 24: 19. — *D. flexuosum* Vieb. f. *dasyanthum* Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 35 (Fl. Cauc.).

Описан из Северной Осетии. Т у р u s: «Сев. Осетия, между селениями Далакау и Даргавс, 31 VII [19]56, А. Харадзе и Р. Гагнидзе» (ТВИ).

ЦК: В. Тер.; **ЦЗ.**

Эндемик.

12 (69). **D. osseticum** N. Busch, 1931, Изв. АН СССР, 7: 449. — *D. speciosum* Vieb. var. *osseticum* (N. Busch) Grossh. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 27.

Описан из Южной Осетии. Т у р u s: «Юго-Осетинская экспедиция АН СССР. Чапарухское ущелье, уроч. Зэбах-Кольдем выше Верхнего Чапаруха, опушка субальпийского березняка, 1800 м, 23 VII 1930, Е. и Н. Буш» (LE!, cum isotypis).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.

Указан для **ЗЗ:** Инг.-Рион. (Кемулариа-Натадзе, 1966: 90).

Эндемик.

13 (70). **D. pyramidatum** Albov, 1891, Тр. Одесск. отд. Росс. общ. садовод.: 5.

Описан из Абхазии. Т у р u s: «Верховья Лашипсе, Альбов» (ТВИ).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Тэб.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Адж.

Эндемик.

14 (71). **D. thamarae** Kem.-Nath. 1965, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 24: 18.

Описан из Грузии. Т у р u s: «Грузинская ССР, между сел. Тори и сел. Бакуриани, 20 VIII 1919, Л. Кемулариа» (ТВИ).

ЦК: Карт.-Ю. Ос.

Эндемик.

15 (72). **D. crispulum** Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 34 (Fl. Cauc.). — *D. linearilobum* (Trautv.) N. Busch var. *crispulum* (Rupr.) N. Busch, 1903, Мат. фл. Кавк. 3, 3: 69.

Описан из Дагестана. Т у р u s: «Caucasus orientalis, Gumbet, pr. Danuch, 26 VII 1861, № 891, Owerin» (LE!).

БК: Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.
Юго-Зап. Азия (Турция).

16 (73). **D. buschianum** Grossh. 1933, Тр. Азерб. отд. Закавказ. фил. АН СССР, сект. бот. 1: 51. — *D. linearilobum* (Trautv.) N. Busch var. *hirticaule* Grossh. 1930, Фл. Кавк. 2: 99.

Описан из Армении. Тур у s (fide Невский, 1937: 144): «Окр. оз. Севан» (ВАК); syntypis: «Армения, Даралагез, горы Теке-Дондуран, 30 VII 1931, I. Karjagin et V. Safiev; Армения, Даралагез, окр. сел. Кодух-ванк, 15 VIII 1931, I. Karjagin et V. Safiev» (LE!).

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Занг.
Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев.-вост. Иран).

17 (74). **D. gelmetzicum** Dimitrova, 1966, Новости сист. высш. раст. 3: 100.

Описан из Дагестана. Тур у s: «Южный Дагестан, Рутульский район, с. Гельмец, ок. 3 км к востоку, на склоне горы, субальпийский луг, 17 VIII 1965, № 191, В. Димитрова» (LE!).

БК: Ман.-Самур.
Эндемик.

18 (75). **D. mariae** N. Busch, 1903, Мат. фл. Кавк. 3, 3: 69.

Описан из Дагестана. Lectotypus (Lufarov, hoc loco): «Prov. Dagestan, distr. Dargi, ad viam Tsulkan et Gapschima, in pratis, 5900', 19 VII 1898, № 4687, Th. Alexeenko» (LE!).

БК: В. Сулак., Ман.-Самур.
Эндемик.

19 (76). **D. linearilobum** (Trautv.) N. Busch, 1903, Мат. фл. Кавк. 3, 3: 68, p. p. — *D. speciosum* Vieb. var. *linearilobum* Trautv. 1876, Тр. Петерб. бот. сада, 4: 102. — *D. crispulum* auct. non Rupr.: Невский, 1937, Фл. СССР, 7: 143, p. p.

Описан из Грузии (Месхетия). Тур у s: «In Transcaucasiae rossicae districta Achalzich, ad lacum Chosarin, 6000', № 1281, G. Radde» (LE!).

БК: В. Сулак.; **ЦЗ:** Лори; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Мегр.-Зан.
Юго-Зап. Азия (Турция).

20 (77). **D. tomentellum** N. Busch, 1903, Мат. фл. Кавк. 3, 3: 70. — *D. crispulum* auct. non Rupr.: Невский, 1937, Фл. СССР, 7: 143, p. p.

Описан из Азербайджана. Тур у s: «Gub. Baku, distr. Kuba, in declivitate orientali m. Bazar, in detritu schistose mobile angustiarum Jatuch-dere, 9700', 27 VII 1899, № 2620, Alexeenko» (LE!).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; **БК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек.
Эндемик.

21 (78). **D. darginicum** Dimitrova, 1966, Новости сист. высш. раст. 3: 104.

Описан из Дагестана. Тур у s: «Дагестан, Предгорный Дагестан, Акушинский район, с. Акуша, ок. 4 км к ЮЗ, на плато облесенной по склонам горы, 12 VIII 1965, № 129, В. Димитрова» (LE!, cum isotypis).

БК: В. Сулак., Ман.-Самур.

Эндемик.

22 (79). **D. flexuosum** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 12. — *D. elatum* L. [var.] s. *subciliatum* Ledeb. 1842, Fl. Ross. 1: 64. — *D. dasycarpum* Steven ex DC. var. *leiosepalum* N. Busch, 1919, Опред. *Ranales*: 27.

Описан из Грузии. *Л е с т о т у р у с* (Lufarov, hoc loco): «Ex Caucaso iberico, Adam Schlegelmilch» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; БК; ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар.

Юго-Зап. Азия (Турция).

23 (80). **D. dzavakhischwili** Kem.-Nath. 1965, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 24: 17.

Описан из Грузии. *Т у р у с*: «Бакуриани, Имеретинские горы, 1 VIII 1952, А. Джавахишвили» (ТВИ).

ЗЗ: Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.

Эндемик.

24 (81). **D. fedorovii** Dimitrova, 1966, Новости сист. высш. раст. 3: 96.

Описан из Дагестана. *Т у р у с*: «Ю. З. Дагестан, Цунтинский район, с. Бежта, 3 км на запад по склону водораздельного отрога Гл. Кавказского хребта, между притоками Аварского Койсу: Хван Ор и Симбирис-Хеви, в густом лиственном лесу, 6 VIII 1965, № 80, В. Димитрова» (LE!).

БК: В. Сулак.

Эндемик.

25 (82). **D. prokhanovii** Dimitrova, 1966, Новости сист. высш. раст. 3: 94.

Описан из Дагестана. *Т у р у с*: «Кавказ, Северный Дагестан, Гумбетовский р-н, около 2 км к югу от сел. Данух, на окраине соснового леса, среди кустарников, в высокоотравье, 24 VIII 1965, цв. и пл., № 226, В. Н. Димитрова» (LE!).

БК: Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.

Эндемик.

26 (83). **D. lomakinii** Kem.-Nath. 1965, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 24: 16.

Описан из Карабаха. *Т у р у с*: «В лесу выше сел. Биченах, 1895, А. Ломакин» (ТВИ; *isotypus* — LE!).

ЮЗ: Нах.

Эндемик.

27 (84). **D. leonidae** Kem.-Nath. 1965, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 24: 17.

Описан из Карачаево-Черкесии. *Т у р у с*: «РСФСР, Ставропольский край, Карачаево-Черкесская АО, ущелье реки Хурзук, 8 VIII 1949, Л. Кемулариа-Натадзе и Л. Хинтибидзе» (ТВИ).

ЗК: Уруп-Теб.

Эндемик.

28 (85). **D. elisabethae** N. Busch, 1937, Тр. Бот. инст. АН СССР, 1, 3: 355; Невский, 1937, Фл. СССР, 7: 141, in adnot., pro syn. *D. flexuosum* Bieb. var. *dasyanthum* Rupr. — *D. dasycarpum* Steven ex DC. var. *elisabethae* (N. Busch) Grossh. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 26.

Описан из Южной Осетии. Т у р и с: «Юго-Осетинская экспедиция АН СССР. Сбийское ущелье, балка р. Кугом-дон, близ села Среднее Сба, 19 VIII 1933, Е. и Н. Буш» (LE!).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.

Эндемик.

Sect. 3. **Oligophyllon**

Subsect. **Squamata** Pawl.

29 (86). **D. schmalhausenii** Albov, 1890, Тр. Одесск. отд. Росс. общ. садовод.: 441. — *D. hybridum* Stephan ex Willd. subsp. *schmalhausenii* (Albov) N. Busch, 1903, Мат. фл. Кавк. 3, 3: 53. — *Diedropetala schmalhausenii* (Albov) Galuschko, 1976, Новости сист. высш. раст. 13: 251.

Описан из Абхазии. Т у р и с: «Черноморская губ., верховья Мзымты, субальп. луга, VI, Альбов» (ТВИ?).

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставро.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл.; Абх., Рион.-Квир., Адж.

Вост. Европа (Украина); Юго-Зап. Азия (Турция).

30 (87). **D. freynii** Conrath, 1895, Bull. Herb. Boiss. 3: 36. — *D. somcheticum* Conrath et Freyn, 1895, Bull. Herb. Boiss. 3: 37; P. H. Davis, 1965, Fl. Turk. 1: 112, pro syn. *D. schmalhausenii* Albov. — *Diedropetala freynii* (Conrath) Galuschko, 1976, Новости сист. высш. раст. 13: 251. — *D. dasystachyum* auct. non Boiss. et Bal.: Н. Буш, 1903, Мат. фл. Кавк. 3, 3: 58.

Описан из Грузии. Т у р и с: «Somchetia, m. Lok» (G?).

ВК: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ.**

Указан для **ВП:** Тер.-Кум.; **ЗЗ; ВЗ** (Литвинская, Муртазалиев, 2009: 249).

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев.-зап. Иран).

31 (88). **D. albiflorum** DC. 1817, Syst. Nat. 1: 353; P. H. Davis, 1965, Fl. Turk. 1: 113. — *D. hybridum* Stephan ex Willd. var. *floribus ochroleucis* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 13. — *D. ochroleucum* Steven ex DC. 1817, Syst. Nat. 1: 353; Невский, 1937, Фл. СССР, 7: 181. — *D. hybridum* var. *albiflorum* (DC.) C. Koch, 1841, Linnaea, 15: 247. — *D. hybridum* var. *ochroleucum* (Steven ex DC.) N. Busch, 1903, Мат. фл. Кавк. 3, 3: 54.

Описан из Армении. Т у р и с: «In Armenia, Tournefort» (P?).

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Рион.-Квир.; **ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар.

Юго-Вост. Европа (Болгария, сев. Греция); Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев.-зап. Иран).

32 (89). **D. macropogon** Prokh. 1961, Бот. мат. (Ленинград), 21: 420. — *Diedropetala macropogon* (Prokh.) Galuschko, 1976, Новости сист. высш. раст. 13: 251.

Описан из Дагестана. Т у р у s: «Окрестности Махачкалы, горы Кукурт-тау, около 2 км к востоку от кутана Мукку, лес, 18 VII 1959, Я. Проханов» (LE!).

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.

Эндемик.

33 (90). **D. szowitsianum** Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 89. — *D. hybridum* Stephan ex Willd. var. *szowitsianum* (Boiss.) Trautv. 1873, Тр. Петерб. бот. сада, 2, 2: 493. — *D. dasystachium* N. Busch subsp. *szowitsianum* (Boiss.) N. Busch, 1903, Мат. фл. Кавк. 3, 3: 58.

Описан из Нахичевани. Т у р у s: «Armenia Rossica, in virgilem secus Nakhitschevan-Tschai frequenti, 28 VII 1829, № 439, Szovitz» (G; isotypus — LE!).

ЮЗ: Нах., Занг.; **Т:**

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев.-зап. Иран).

34 (91). **D. puniceum** Pall. 1776, Reise Russ. Reich. 3: 736. — *D. hybridum* Stephan ex Willd. var. *puniceum* (Pall.) Claus, 1838, in K. I. Goebel, Reise Steppen Russl. 2: 248. — *D. hybridum* subsp. *puniceum* (Pall.) N. Busch, 1903, Мат. фл. Кавк. 3, 3: 55, р. р. — *Diedropetala punicea* (Pall.) Galuschko, 1976, Новости сист. высш. раст. 13: 251.

Описан из низовий Волги. Т у р у s: «[Астраханская обл., Хараболинский р-н] окр. Чапчачи» (В?; isotypus — LE!).

ЗП; ВП:

Вост. Европа (юг), Ср. Азия (Зап. Казахстан).

35 (92). **D. cyphoplectrum** Boiss. 1846, Diagn. Pl. Or. sér. 1, 6: 7. — *D. hybridum* Stephan ex Willd. var. *floribus saturate violaceis* Hohen. 1838, Enum. Pl. Talysch: 148. — *D. hybridum* var. *laxiusculum* Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 89. — *D. hybridum* var. *hirtula* Trautv. 1878, Тр. Петерб. бот. сада, 1, 1: 21. — *D. laxiusculum* (Boiss.) Rouy, 1893, Fl. Fr. 1: 134, in adnot. — *D. hybridum* subsp. *laxiusculum* (Boiss.) N. Busch, 1903, Мат. фл. Кавк. 3, 3: 56.

Описан из Ирана. Т у р у s: «In m. Kuh-Malo pr. Dalechi, III 1842» (G; isotypi — LE!).

З: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, Ирак, Иран).

36 (93). **D. atrovioleaceum** Lufarov, 2012, Новости сист. высш. раст. 43: 57. — *D. laxiusculum* (Boiss.) Rouy subsp. *atrovioleaceum* Dimitrova, in sched. herb. LE.

Описан из Армении. Т у р у s: «Prov. Megry, int. p. Bugakiar et Liskvas, 3 VII 1929, A. Schelkovnikov et E. Kara-Murza» (LE!, cum isotypis).

ЮЗ: Мегр.-Зан.

Эндемик.

От близкого вида *D. nachiczevanicum* Tzvel. хорошо отличается более длинными и узкими листовыми сегментами, 18–45 мм дл., 1–3(4) мм шир. (а не 10–20 (реже до 25) мм дл. и 1.5–9 мм шир.), темно-красно-фиолетовыми голыми чашелистиками (а не фиолетово-синими, с

короткими рассеянными полуприжатыми волосками). От родственных видов: *D. cyphoplectrum*, *D. quercetorum* Boiss. et Hausskn., *D. talyschense* Tzvel. — наш вид отличается голыми цветоножками.

37 (94). **D. nachiczevanicum** Tzvel. 1959, Бот мат. (Ленинград), 19: 3; Munz, 1967, Journ. Arn. Arbor. 48, 3: 290, pro syn. *D. pallidiflorum* Freyn.

Описан из Нахичевани. Т у р и с: «Азербайджанская ССР, Нахичеванская АССР, Ордубадский р-н, осыпь по склону отрога Зангезурского хребта в 2 км к востоку от г. Ордубад, нижний горный пояс, 9 VI 1956, № 418, Т. В. Егорова, Н. Н. Цвелёв, С. К. Черепанов» (LE!).

ЮЗ: Ерев., Нах., Мегр.-Зан.

Юго-зап. Азия (Иран).

38 (95). **D. talyschense** Tzvel. 1959, Бот мат. (Ленинград), 19: 6; Кем.-Нат. 1966, Ранадиевые Кавк.: 110, pro syn. *D. cyphoplectrum* Boiss.

Описан из Талыша. Т у р и с: «Ленкоранский округ, близ сел. Гелядира, южный травянистый склон, 13 VII 1931, № 555, Е. Матвеева» (LE!).

ВЗ: Н. Кур.; **ЮЗ:** Нах.; **Т:**

Юго-Зап. Азия (Иран).

39 (96). **D. quercetorum** Boiss. et Hausskn. 1888, in Boiss. Fl. Or. Suppl.: 20. — *D. hybridum* Stephan ex Willd. subsp. *laxiusculum* (Boiss.) N. Busch var. *pallidiflorum* N. Busch, 1903, Мат. фл. Кавк. 3, 3: 56. — *D. laxiusculum* (Boiss.) N. Busch var. *pallidiflorum* N. Busch, 1919, Определ. *Ranales*: 21.

Описан из Ирана. Т у р и с: «Pl. Pers. Austr., in m. Kuh-Malo pr. Dalechi, 1842, № 153, Th. Kotschy» (G; isotypus — LE!).

ЮЗ: Нах., Мегр.-Зан.; **Т:**

Юго-зап. Азия (Турция, Ирак, Иран).

40 (97). **D. pallasii** Nevski, 1937, Фл. СССР, 7: 727, 177. — *D. tauricum* Pall. 1796, Neueste Nord. Beitr. 3: 432, nom. nud. — *D. fissum* auct. non Waldst. et Kit.: Н. Буш, 1903, Мат. фл. Кавк. 3, 3: 49, pro syn. *D. hybridum* Stephan ex Willd.; Pawł. 1964, Fl. Europ. 1: 215, p. p.

Описан из Крыма. Т у р и с: «Tauria. Herb. Pallas» (LE!).

ЗЗ: Абх.

Юго-Вост. Европа (Крым).

8 (23). **Consolida** (DC.) Gray*

Sect. 1. **Consolida**

1 (98). **C. regalis** Gray, 1821, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 711. — *Delphinium consolida* L. 1753, Sp. Pl. 1: 530; Невский, 1937, Фл. СССР, 7: 102. — *D. segetum* Lam. 1778, Fl. Fr. 3: 325. — *D. monophyllum* Gilib. 1781, Fl. Lithuan. 2: 287, nom. inval. — *Consolida arvensis* Opiz, 1852, Seznam: 32.

Описан из Европы.

* А. Н. Луферов (Луферов, 2005).