

В. И. Трифонова (1973), изучившая эти признаки на популяционном уровне, вполне обоснованно сделала вывод о невозможности выделения внутривидовых таксонов у *C. orientalis*.

Sect. 3. **Brevipedunculatae** (Huth ex N. Busch) Kem.-Nath.

7 (104). **C. rugulosa** (Boiss.) Schrödinger, 1913, Ann. Naturh. Mus. (Wien), 27: 43. — *Delphinium rugulosum* Boiss. 1841, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 16: 361; Невский, 1937, Фл. СССР, 7: 112.

Описан из Ирана (оз. Урмия). *Lectotypus* (Munz, 1967: 189, «holotypus»): «Лас. Ourmiah, № 4028, Aucher» (P; isotypi — BM, K).

**ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. (от Турции и Ирака до Пакистана), Ср. Азия.

С. А. Невский (1937: 113) указал, что тип хранится в Гербарии G, а в Гербарии LE имеется изотип («котип»), который, однако, нам обнаружить не удалось.

8 (105). **C. persica** (Boiss.) Schrödinger, 1909, Abh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 4, 5: 17, 62. — *Delphinium persicum* Boiss. 1841, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 16: 362; Невский, 1937, Фл. СССР, 7: 111. — *D. camptocarpum* auct. non Fisch. et C. A. Mey.: C. Koch, 1841, Linnaea, 15: 247.

Описан из Ирана (окр. Хамадана). *Lectotypus* (Munz, 1967: 187, «typus»): «Persia circa Amadan, № 78, Aucher» (P; isotypus — K).

**ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия (от Турции и Ирака до Пакистана).

Указание для юго-востока Азербайджана: «Ленкоран. уезд» (Липский, 1899: 211) не подтверждено гербарными сборами и литературными данными по Кавказу (Гроссгейм, 1950; Карягин, 1953).

9 (24). **Aconitella** Spach (*Aconitopsis* Kem.-Nath.)\*

1 (106). **A. hohenackeri** (Boiss.) Soják, 1969, Folia Geobot. Phytotax. (Praha), 4, 4: 448. — *Delphinium aconiti* Hohen. 1838, Enum. Pl. Talysch: 147. — *D. anthoroideum* Boiss. 1841, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 16: 369, p. p. — *D. hohenackeri* Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 85; Невский, 1937, Фл. СССР, 7: 101. — *Consolida hohenackeri* (Boiss.) Grossh. 1930, Фл. Кавк. 2: 101. — *Aconitopsis hohenackeri* (Boiss.) Kem.-Nath. 1940, Тр. Тбил. бот. инст. 7: 127.

Описан из Турции. *Lectotypus* (Chowdhuri, Davis, 1958: 415): «In pascuis aridis montis Ceek prope Vaibout, 12 VII 1862, Bourgeau» (G; isolectotypi — E, K).

**ЗЗ:** Рион.-Квир., Адж.; **ЮЗ:** Мегр.-Зан.; **Т.**

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, сев.-зап. Иран).

С. А. Невский (1937: 113) указал, что «котип» этого вида хранится в Гербарии LE, который, однако, нам обнаружить не удалось. Один из виденных нами образцов, вероятно, можно рассматривать как топотип («In pascuis aridis montis prope Vaibout, 12 VII 1862, E. Bourgeau» — LE!).

\* А. Н. Луферов.