

Описан из Европы.

ЗП; ВП: В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК:** Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.**

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап., Ср., Центр., Южн. Азия.

На Кавказе известны следующие разновидности: var. *aestivalis* (все указанные районы); var. *parviflora* Vieb., характеризующаяся более мелкими цветками (5–10(15) мм в диам.) и орешками (2.5–4 мм дл.), более тонкими (1–2(4) мм в диам.), короткими (5–20 см дл.), простыми, реже слабоветвящимися побегами (все районы, но чаще в **ВП; ВК; ЦЗ; ВЗ; Т.**); var. *provincialis* (DC.) W. T. Wang (incl.: *A. dentata* var. *provincialis*, *A. squarrosa*, *A. aestivalis* var. *velutina*, *A. bienertii*), имеющая густое опушение чашелистиков (при их основании или по всей нижней поверхности), стеблей, черешков, реже листовых пластинок (во всех районах).

Subsect. 2. **Dentatae** (W. T. Wang) Luferov

4 (191). **A. flammea** Jacq. 1776, Fl. Austr. 4: 29, tab. 355. — *A. caudata* Steven, 1848, Bull. Soc. Nat. Moscou, 21, 3: 273. — *A. flammea* var. *caudata* (Steven) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 19.

Описан из Европы.

ЗП; ВП: В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг.; **СЗЗ:** Анап.-Гел., Пшад.-Джубг.; **ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.; **Т.**

Атл., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. Азия.

A. flammea var. *caudata* отличается от типовой разновидности более длинным (2–2.7 мм) стилодием, чернеющим на верхушке (**СЗЗ:** Анап.-Гел. (Новороссийск, Анапа)).

Приводимые для Кавказа образцы *A. annua* L. (Шлангена, 1975) были переопределены нами как *A. flammea* и *A. aestivalis*.

ORDO 10. PAPAVERALES

Fam. 34. **PAPAVERACEAE** Juss., nom. cons.*

Subfam. 1. **CHELIDONIOIDEAE** W. R. Ernst

Trib. 1. **Chelidoniae** Dumort.

1 (37). **Chelidonium** L.

1 (192). **C. majus** L. 1753, Sp. Pl.: 505.

Описан из Европы.

ЗП (редко); **ВП:** Тер.-Кум. (редко); **ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карг.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек. (редко), Мург.-Муровд., Н. Кур. (редко), Караб.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Мегр.-Зан. (редко), Ю. Караб. (редко); **Т.**

* А. Д. Михеев (Михеев, 1993).

Атл., Сев., Центр., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка (заносное в приатлантич. р-нах).

Trib. 2. **Glaucieae** Dumort.

2 (38). **Glaucium** Mill.

1 (193). **G. grandiflorum** Boiss. et A. Huet, 1856, in Boiss. Diagn. Pl. Or. sér. 2, 5: 15.

Описан из Турции. Тур у s: «Hab. circa Erzeroum, cl. Huet du Pavillon et cl. Calvert» (G).

ЦЗ: Карг.-Ю. Ос. (редко); **ВЗ:** Мург.-Муровд. (редко); **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Занг., Ю. Караб.

Средиз. (Греция); Юго-Зап. Азия (от Турции и Синайского п-ова до Ирана); Сев. Африка (Египет).

2 (194). **G. corniculatum** (L.) Rudolph, 1781, Fl. Jen. Pl.: 13. — *Chelidonium corniculatum* L. 1753, Sp. Pl.: 506. — *Glaucium rubrum* Sibth. et Sm. 1809, Fl. Graec. Prodr. 1: 357.

Описан по материалам из Венгрии, Чехии и Франции.

ЗП; ВП: Тер.-Кум. (редко); **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ:** Инг.-Рион. (редко), Рион.-Квир. (редко); **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; Триал.-Н. Карг.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (редко); **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ; Т.**

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, сев. Ирак, зап. и сев. Иран), Ср. (Копетдаг) Азия; Сев. Африка. Заносное в Макаронезии.

У нас встречается только красноцветковая форма, описанная как *G. rubrum*.

3 (195). **G. flavum** Crantz, 1763, Stirp. Austr. Fasc. 2: 133. — *Chelidonium glaucium* L. 1753, Sp. Pl.: 506.

Описан из Европы и Северной Америки.

ЗП: Аз.-Куб. (Тамань); **СЗЗ; ЗЗ.**

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. (Крым) Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция).

4 (196). **G. oxylum** Boiss. et Buhse, 1860, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, 12: 12. — *G. vittelinum* Boiss. et Buhse, 1860, l. c.: 11. — *G. leiocarpum* Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 122.

Описан из Ирана. Тур у s: «Bei Radkann, VIII 1848 (florens et defloratum), Buhse» (LE!)

Указан для прилегающих к Турции районов Кавказа (Cullen, 1965: 217; 1980: 786, sub nom. *G. leiocarpum*).

Юго-Вост. Европа (Балканский п-ов); Средиз. (Греция, Крит); Юго-Зап. (от Турции и Израиля до Пакистана), Ср. (горный Туркменистан, Тянь-Шань, Памиро-Алай) Азия.

5 (197). **G. elegans** Fisch. et C. A. Mey. 1835, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 1: 29.

Описан из северного Ирана. Тур у s: «Hab. in Persia boreali» (LE!).