

Атл., Сев., Центр., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка (заносное в приатлантич. р-нах).

Trib. 2. **Glaucieae** Dumort.

2 (38). **Glaucium** Mill.

1 (193). **G. grandiflorum** Boiss. et A. Huet, 1856, in Boiss. Diagn. Pl. Or. sér. 2, 5: 15.

Описан из Турции. Тур у s: «Hab. circa Erzeroum, cl. Huet du Pavillon et cl. Calvert» (G).

ЦЗ: Карг.-Ю. Ос. (редко); **ВЗ:** Мург.-Муровд. (редко); **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Занг., Ю. Караб.

Средиз. (Греция); Юго-Зап. Азия (от Турции и Синайского п-ова до Ирана); Сев. Африка (Египет).

2 (194). **G. corniculatum** (L.) Rudolph, 1781, Fl. Jen. Pl.: 13. — *Chelidonium corniculatum* L. 1753, Sp. Pl.: 506. — *Glaucium rubrum* Sibth. et Sm. 1809, Fl. Graec. Prodr. 1: 357.

Описан по материалам из Венгрии, Чехии и Франции.

ЗП; ВП: Тер.-Кум. (редко); **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ:** Инг.-Рион. (редко), Рион.-Квир. (редко); **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; Триал.-Н. Карг.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (редко); **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ; Т.**

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, сев. Ирак, зап. и сев. Иран), Ср. (Копетдаг) Азия; Сев. Африка. Заносное в Макаронезии.

У нас встречается только красноцветковая форма, описанная как *G. rubrum*.

3 (195). **G. flavum** Crantz, 1763, Stirp. Austr. Fasc. 2: 133. — *Chelidonium glaucium* L. 1753, Sp. Pl.: 506.

Описан из Европы и Северной Америки.

ЗП: Аз.-Куб. (Тамань); **СЗЗ; ЗЗ.**

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. (Крым) Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция).

4 (196). **G. oxylobum** Boiss. et Buhse, 1860, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, 12: 12. — *G. vittelinum* Boiss. et Buhse, 1860, l. c.: 11. — *G. leiocarpum* Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 122.

Описан из Ирана. Тур у s: «Bei Radkann, VIII 1848 (florens et defloratum), Buhse» (LE!)

Указан для прилегающих к Турции районов Кавказа (Cullen, 1965: 217; 1980: 786, sub nom. *G. leiocarpum*).

Юго-Вост. Европа (Балканский п-ов); Средиз. (Греция, Крит); Юго-Зап. (от Турции и Израиля до Пакистана), Ср. (горный Туркменистан, Тянь-Шань, Памиро-Алай) Азия.

5 (197). **G. elegans** Fisch. et C. A. Mey. 1835, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 1: 29.

Описан из северного Ирана. Тур у s: «Hab. in Persia boreali» (LE!).

БК: Ман.-Самур. (юг: р. Ахты-чай и притоки), Кубин.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. (от Ирана до зап. Пакистан), Ср. (горный Туркменистан, Тянь-Шань, Памиро-Алай), Центр. (Синьцзян) Азия.

Subfam. 2. PAPAVEROIDEAE Eaton

Trib. **Papavereae** Dumort.

3 (39). **Papaver** L.

Sect. 1. **Pseudopilosa** Popov ex K.-F. Günther

1 (198). **P. lisaе** N. Busch, 1926, Тр. Бот. муз. АН СССР, 19: 82. — *P. oreophilum* Rupr. var. *monanthum* (Trautv.) N. Busch f. *obtusifolium* N. Busch, 1905, Мат. фл. Кавк. 3, 4: 45 («*monantha*», «*obtusifolia*»). — *P. monanthum* Trautv. var. *obtusifolium* (N. Busch) Fedde, 1909, in Engl. Pflanzenr. 40, 4, 104: 363.

Описан с Центрального Кавказа. *Л е с т о т у р у с* (Попов, 1937: 603, «тип»): «Балкария, Рцывашки, на субальпийском лугу, уроч. Урта-тала, 2018 м, 28 VI 1925, Е. и Н. Буш» (LE!).

ЦК: Малк., В. Тер.

Эндемик.

Встречается только между Скалистым и Передовым хребтами от левобережья р. Черек Безенгийский до верховий р. Цей по зарастающим моренам, на осыпях, иногда в трещинах скал, на высоте 2000–2900 м над ур. м.

2 (199). **P. lateritium** C. Koch aggr.

2а. **P. lateritium** C. Koch, 1855, Index Sem. Horto Bot. Berol. App.: 14.

Описан по растениям, выращенным из семян, собранных в Турции («In valle fluminis Tschoruck Armeniam a montibus ponticis separante a. 1843 collectum et nunc in horto botanico cultum. 1853, Koch»).

ЮЗЗ: Джав.-В. Ах.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

2б. **P. oreophilum** Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 51 (Fl. Cauc.).

Описан из Северной Осетии. *Т у р у с*: «Caucasus, distr. Alagir et Radscha, m. Mamisson prope Kalaki, 1400–1500, 7 IX 1861, Ruprecht» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб. (перевал Кизгич), Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Эндемик.

2с. **P. talyshense** Grossh. 1919, Вестн. Тифл. бот. сада, 46–47: 68.

Описан из Талыша. *Т у р у с*: «Г[ора] Кыз-Юрды, 2400 м, близ поста № 1, на травянистых склонах, 24 VII 1917, пл., Гроссгейм» (ТВИ).

Т.

Эндемик.