

Описан с Центрального Кавказа. Т у р u s: «Ciscaucaia, prov. Staupoliensis, vinetum haud procul ab opp. Pjatigorsk (m. «Lyssaja») 10 V 1968 (fructus 15 VI 1968), leg. A. D. Mikheev» (MW!).

**ЗП:** З. Ставр. (Темнолесская); **ЦК:** В. Кум. (Пятигорье). Сорное.

Юго-Вост. Европа (Крым).

Вероятно, встречается и в других районах Северного Кавказа.

31 (228). **P. paczowskii** Mikheev, 1985, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 90, 3: 91. — *P. dubium* L. var. *albiflorum* auct. non Bess.: Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 98.

Описан с Северного Кавказа. Т у р u s: «Caucasus septentrionalis, prov. Staupoliensis, vinetum haud procul. ab opp. Pjatigorsk, 15 V 1980 (fructus 10 VI 1980), leg. A. D. Mikheev» (MW!).

**ВП:** В. Ставр.; **ЦК:** В. Кум. Сорное.

Эндемик.

Образует заросли вместе с другими видами подсекции *Dubia*.

32 (229). **P. maschukense** Mikheev, 1999, Бот. журн. 84, 8: 105.

Описан с Северного Кавказа. Т у р u s: «Caucasus septentrionalis, prov. Staupoliensis, opp. Pjatigorsk, ad pedem borealem montis Maschuk, planta ruderalis, 15 VII 1997, A. Mikheev» (LE!).

**ЦК:** В. Кум.

Эндемик.

Виды подсекции *Dubia* распространены в основном на Северном Кавказе. В Закавказье же изредка встречаются ее представители, как проникающие с севера, так и местные, еще почти не изученные в систематическом отношении. Лишь *P. lacrum* может быть более или менее надежно идентифицирован.

#### Виды неясного родства

33 (230). **P. roseolum** M. V. Agab. et Fragman, 2007, Фл. растит. и раст. рес. Арм. 16: 27–29.

#### 4 (40). **Roemeria** Medik.

1 (231). **R. refracta** DC. 1821, Syst. Nat. 2: 93. — *R. rhoeadiflora* Boiss. 1846, Diagn. Pl. Or. sér. 1, 6: 7.

Описан из Дагестана. Т у р u s: «In Caucasus, circa Derbent, Steven» (G).

**ВП:** В. Ставр. (юг — редко); **ЦК:** В. Кум. (Пятигорье — редко); **БК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ;** **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Юго-Зап. (от сев.-вост. Турции и Ливана до зап. Пакистана), Ср. (юг), Центр. (Синьцзян) Азия.

2 (232). **R. hybrida** (L.) DC. 1821, Syst. Nat. 2: 92. — *Chelidonium hybridum* L. 1753, Sp. Pl.: 506.

Описан из Южной Европы.

**ВК:** Ман.-Самур.; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Н. Кур., Ширв.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 86).

Атл. (редко), Центр. (редко), Южн., Юго-Вост. (Крым), Вост. (Прикаспийская низм.) Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (от Турции и Синайского п-ова до Пакистана).

3 (233). **R. dodecandra** (Forssk.) Stapf, 1886, Denkschr. Akad. Wiss. Math.-Naturw. Kl. (Wien), 51: 295. — *Chelidonium dodecandrum* Forssk. 1775, Fl. Aegypt.-Arab.: 100. — *Roemeria hybrida* (L.) DC. subsp. *dodecandra* (Forssk.) Maire, 1932, in Jahand. et Maire, Cat. Pl. Maroc. 2: 257. — *R. orientalis* Boiss. 1841, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 16: 374.

Описан из Ирана. Т у р u s: «In desertis Kahirinis, Forsskhå» (G).

**ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **Т:**

Средиз. (сев. Африки); Юго-Зап. (от Сирии, Синайского п-ова и Саудовской Аравии до Пакистана), Ср. (Туркменистан), Центр. (Синьцзян) Азия.

#### 5 (41). **Argemone** L.

1 (234). **A. mexicana** L. 1753, Sp. Pl.: 508.

Описан из Центральной Америки.

Указан для **ЗЗ:** Адж. (Чаква — заносное) (Гроссгейм, 1950: 91; Шхиян, 1978: 224).

Центр., Южн. Европа (заносное, натурализовавшееся); Юго-Вост., Южн. Азия (заносное, натурализовавшееся); Сев. (юго-зап.), Центр. Америка.

А. А. Дмитриева (1990, 1) для Аджарии этот вид не приводит.

### Fam. 35. **HYPERICACEAE** Willk. et Lange\*

#### 1 (42). **Hypericum** L.

1 (235). **H. pendulum** L. 1753, Sp. Pl.: 124. — *H. caucasicum* C. Koch ex Ledeb. 1841, Fl. Ross. 1: 94. — *H. procumbens* auct. non L.: Hook. f. 1875, Fl. Brit. Ind. 1: 120.

Описан из Франции.

**ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЦЗ:** Карт.-Ю.Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Севан. (Гроссгейм, 1950: 86).

Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (от Турции и Ливана до Пакистана).

2 (236). **H. imberbe** Sibth. et Sm. 1806, Fl. Graec. Prodr. 1: 107. — *H. grandiflorum* Benth. 1826, Cat. Pl. Pyrenees: 91.

Описан с Кипра.

**ВЗ:** Караб.; **ЮЗ:** Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.

\* М. А. Михайлова.