

в 1985 г. над растениями, собранными Кецохвели и культивировавшимися в Тбилисском ботаническом саду, он стерилен.

Л. М. Кемулариа-Натадзе (1961) отметила декоративные качества «крупных розовато-красновато-фиолетовых цветков» *P. × majkoe* и нашла сходство последнего как с широко распространенным азиатским видом *P. hybrida* Pall., так и крымским гибридом *P. tenuifolia × P. triterinata* Pall., описанным В. П. Малеевым (1937).

Одни авторы (Hong, Zhou, 2003) идентифицировали *P. majkoe* как *P. intermedia* С. А. Меу. (= *P. hybrida*), так как не обнаружили различий в признаках этих видов. Другие (Успенская, 1981; Halda, Waddick, 2004) признали *P. × majkoe* гибридом.

Согласно указанию Кемулариа-Натадзе (1973: 20), в Тбилисском ботаническом саду культивировался так называемый гибрид В. Матвеева «*P. tenuifolia × P. caucasica*». В Гербарии ТВИ сохранился гербарный образец: «*P. × majko* N. Ketzk. “Гибрид Матвеева”. Отдел живой флоры института Ботаники АН ГССР, 6 VI 1960, leg. L. Mironenko, determ. L. Kemularia-Nathadze». Публикации В. Матвеева мы не обнаружили. По всей вероятности, Матвеев, скрестив *P. caucasica* и *P. tenuifolia*, получил гибрид, идентичный *P. × majkoe*, подтвердив гибридное происхождение последнего. Действительно, типовые образцы *P. × majkoe* тождественны образцу «Гибрид Матвеева».

Subclassis Caryophyllidae

Superordo Caryophyllanae

ORDO 12. CARYOPHYLLALES

Fam. 38. PHYTOLACCACEAE R. Br., nom. cons.*

1 (46). *Phytolacca* L.

Subgen. *Phytolacca*

1 (276). ***P. americana*** L. 1753, Sp. Pl. 1: 441; Кузен. 1936, Фл. СССР, 6: 373, табл. 17, рис. 5, а; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 176; Рзазаде, 1952, Фл. Азерб. 3: 269. — *P. decandra* L. 1763, Sp. Pl. ed. 2: 631, non Descourt. 1827; Vieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 363; Voiss. 1879, Fl. Or. 4, 2: 895; Albov, 1895, Mat. фл. Колх.: 207; Липский, 1899, Тр. Тифл. бот. сада, 4: 430 (Фл. Кавк.).

Описан из США (Виргиния) и Мексики.

Натурализовался в **ЗП; ЗК; ЦК; СЗЗ; ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион. (Рача-Лечхуми), Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ; ВЗ**: Алаз.-Агрич.; **Т**.

Указан для **ЮЗ**: Ерев. (Туманянский р-н, близ сел. Шнок) (Цатурян, 1971: 108).

Сев. Америка. Натурализовался в Центр., Юго-Вост. (Крым) Европе; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Израиль, сев. Ирак), Южн. Азии.

* Н. Н. Имханицкая.