

Fam. 39. **AIZOACEAE** Martinov, nom. cons.*

1 (47). **Aizoanthemum** Dinter ex Friedrich

1 (277). **A. hispanicum** (L.) Н. Е. К. Hartmann, 2001, Ill. Handb. Succ. Pl. *Aizoaceae* A–E: 29. — *Aizoon hispanicum* L. 1753, Sp. Pl.: 488; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 177; Кузен. 1936, Фл. СССР, 6: 376; Карягин, 1952, Фл. Азерб. 3: 270; Hedge a. Lamond, 1975, in Rech. f. Fl. Iran. 113: 5; Askerov, 2011, Azərb. fl. konsp.: 13. — *Aizoon sessiliflorum* Moench, 1794, Methodus: 698, nom. illeg. — *A. hispanicum* var. *genuinum* Maire, 1962, Fl. Afr. Nord, 8: 279, nom. illeg. — *A. hispanicum* var. *minus* Maire, 1962, l. c.: 280, nom. inval.

Описан из Испании. Lectotypus (Peruzzi et al., 2004: 541): [Icon] J. J. Dillenius, 1732, Hort. Eltham. 1: 143, tab. 117, fig. 143 («Ficoidea Hispanica annua, folio longiore Vaill.»).

ВЗ: Ширв., Н. Кур.

Атл. Европа (юг); Средиз. (Португалия, Испания, юго-зап. Италия, о. Крит); Юго-Зап. (Кипр, от Сирии и стран Аравийского п-ова до Ирана), Ср. (зап. и южн. Туркменистан) Азия; Сев. Африка.

Указание Н. Е. К. Hartmann (2001: 29) о произрастании этого вида в Армении ошибочно.

Fam. 40. **Portulacaceae** Juss., nom. cons.**

Trib. 1. **Portulacaceae** Dumort.

2 (48). **Portulaca** L.

1 (278). **P. oleracea** L. 1753, Sp. Pl.: 445.

Описан из Европы.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП;** **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум.; **БК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Ширв., Караб.; **ЮЗ:** Ерев.; **Т.**

Указан для всех равнинных и предгорных районов Сев. Кавказа (Косенко, 1970: 83; Галушко, 1978: 232); Ставропольского края (Танфильев, Кононов, 1987: 37); Дагестана (Муртазалиев, 2009, 1: 94); **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Зернов, 2006: 245).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср. Азия.

2 (279). **P. grandiflora** Hook. 1829, Bot. Mag. 56: tab. 2885.

Описан из Южной Америки.

Указан как культивируемое и одичавшее для **ЗП:** Аз.-Куб. (Косенко, 1970: 84; Зернов, 2006: 245).

Южн. Америка. В культуре в странах Европы, Азии, Сев. Америки.

* И. В. Татанов.

** В. В. Шванова.

Trib. 2. **Talineae** Fenzl

1 (49). **Montia** L.

1 (280). **M. minor** C. C. Gmel. 1805, Fl. Bad. 1: 301. — *M. fontana* L. var. *minor* (C. C. Gmel.) Schübl. et G. Martens, 1834, Fl. Württemberg: 88. — *M. fontana* var. *chondrosperma* Fenzl, 1843, in Ledeb. Fl. Ross. 2: 152. — *M. fontana* subsp. *minor* (C. C. Gmel.) Čelak. 1875, Prodr. Fl. Böhmen, 3: 485. — *M. fontana* subsp. *chondrosperma* (Fenzl) Walters, 1953, Watsonia, 3, 1: 4.

Описан из Германии.

ЗЗ: Абх., Адж.

Атл., Сев., Центр. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция), Ср. Азия.

Fam. 41. **CACTACEAE** Juss., nom. cons.*

Subfam. **OPUNTIOIDEAE** Burnett

1 (50). **Opuntia** Mill.

1 (281). **O. engelmannii** Salm-Dyck ex Engelm. 1850, Boston Journ. Nat. Hist. 6, 2: 207. — *O. discata* Griffiths, 1908, Rep. Missouri Bot. Gard. 19: 266, tab. 27. — *O. engelmannii* var. *discata* (Griffiths) C. Z. Nelson, 1919, Trans. Illinois State Acad. Sci. 12: 124.

Описан из Мексики (Чихуахуа) и США (Техас).

ЗЗ: Туап.-Адл. (Дагомыс, Субтропический ботанический сад «Белые ночи»; дендрарий и парки Сочи), Абх. (Сухум). Культивируется.

Указан для **ВЗ:** Ширв.; **ЮЗ:** Ерев. (Замятин, 1958: 870; Бабаева, 1970: 12; Аксёнова и др., 1999: 50).

Сев. Америка (юго-зап. США, сев. Мексика).

Возможно, именно этот вид одичал в окрестностях Нового Афона в Абхазии.

2 (282). **O. humifusa** (Raf.) Raf. 1830, Med. Fl. 2: 247. — *Cactus humifusus* Raf. 1820, Ann. Nat.: 15. — *Cactus opuntia* L. 1753, Sp. Pl.: 468. — *Opuntia opuntia* (L.) N. Karst. 1882, Deutsche Fl.: 888, nom. illeg.; Замятин, 1958, Дерев. куст. СССР, 4: 868.

Описан из Северной Америки.

ЗП: Аз.-Куб. (Краснодар); **СЗЗ:** Пшад.-Джубг.; **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Дагомыс, Сочи), Абх. (Сухум); **ЦК:** В. Кум. (Пятигорск); **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос. (Тбилиси). Культивируется.

Указан в качестве одичавшего для **СЗЗ:** Пшад.-Джубг.; **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Зернов, 2002: 108, 2006: 245).

Указан в качестве культивируемого для **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Адж. (Батуми); **ВЗ:** Ширв. (Замятин, 1958: 868; Бабаева, 1970: 12; Пилипенко, 1978: 254; Аксёнова и др., 1999: 50).

Сев. Америка (США).

* В. В. Бялт.