

Fam. 43. **CARYOPHYLLACEAE** Juss., nom. cons.

Subfam. 1. **ILLECEBROIDEAE** Arn.
(*PARONYCHIOIDEAE* A. St.-Hil. ex Fenzl)

Trib. 1. **Sperguleae** Dumort.

1 (54). **Spergula** L.*

Sect. 1. **Spergula**

1 (291). **S. arvensis** L. 1753, Sp. Pl.: 440. — *S. sativa* Boenn. 1824, Prodr. Fl. Monast. Westphal.: 135. — *S. vulgaris* Boenn. 1824, l. c.: 135.

Описан из Европы. *Лектотипус* (Turrill, 1956: 24): Herb. Linn. 604.1 (LINN).

ЗК: Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **БК:** Ассо-Арг.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Караб.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Галушко, 1978: 247); **ВП:** Тер.-Кум. (Гуссейнов, 1990: 236); **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** Малк. (Галушко, 1978: 247); **БК:** Ман.-Самур. (Гуссейнов, 1990: 236); **ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Лори. (Гроссгейм, 1945: 222).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное).

2 (55). **Spergularia** (Pers.) J. Presl et C. Presl, nom. cons.*

Sect. 1. **Diandrae** Tzvel.

1 (292). **S. diandra** (Guss.) Heldr. et Sart. 1855, in Heldr. Herb. Graec. Norm.: №№ 492, 1124. — *Arenaria diandra* Guss. 1827, Fl. Sicul. Prodr. 1: 515. — *Lepigonum microspermum* Kindb. 1863, Monogr. Gen. Lepigon.: 26. — *Spergularia microsperma* (Kindb.) Asch. 1867, in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 1: 305. — *S. adenophora* Vved. et Botsch. 1941, Бот. мат. (Ташкент), 3: 4. — *S. campestris* auct. non (L.) Asch.: Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 223, p. p.

Описан с Сицилии. *Лектотипус* (Snogerup, Snogerup, 1997: 236): «[Italy, Sicily] in argillosis inundates maritimis, Gussone» (NAP).

ВЗ: Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Севан., Нах.

Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран), Ср. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное).

Sect. 2. **Spergularia**

2 (293). **S. salina** J. Presl et C. Presl, 1819, Fl. Čech.: 95. — ?*Arenaria rubra* L. β. *marina* L. 1753, Sp. Pl.: 423. — *Holosteum sperguloides* Lehm. 1828, Nov. Stirp. Pugil. 1: 21. — *Arenaria halophila* Bunge, 1830, in Ledeb. Fl. Alt. 2: 162. — ?*Spergularia marina* (L.) Griseb. 1843, Spicil. Fl. Rumel. 1: 213. — *S. rubra* (L.) J. Presl et C. Presl var. *pinquis* Fenzl, 1843, in Ledeb. Fl. Ross. 2, 4: 167. — *S. sperguloides* (Lehm.) Heynh. 1846, Nomencl. Bot. 2: 690. — *S. bungeana* Tzvel. 2000, Новости сист. высш. раст. 32: 29. — *S. pinquis* (Fenzl) Tzvel. 2000, цит. соч.: 29.

* Г. А. Лазьков.

Описан из Чехии.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Кум.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **Т:**

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ВП:** Тер.-Сулак. (Гроссгейм, 1945: 223).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран), Ср. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное).

3 (294). **S. rubra** (L.) J. Presl et C. Presl, 1819, Fl. Čech.: 95. — *Arenaria rubra* a. *campestris* L. 1753, Sp. Pl.: 423. — *S. campestris* (L.) Asch. 1859, Fl. Prov. Brandenb. 2: 94.

Описан из Европы. Lectotypus (Roszbach, 1940: 109): Herb. Linn. 585.20 (LINN).

ВК: Ман.-Самур. («Derbent, Lagowski»); **ЗЗ:** Инг.-Рион. («Груз. ССР, ст. Зугдиди, эксп. Массажетова»).

Указан для **ЗП:** З. Ставр. (Танфильев, Кононов, 1987: 40); **ВП:** В. Ставр. (Галушко, 1978: 247), Тер.-Кум. (Гроссгейм, 1945: 223), Тер.-Сулак. (Галушко, 1978: 247); **ЦЗ;** **ЗК:** Уруп-Теб. (Гроссгейм, 1945: 223), **ЗК:** В. Куб. (Гроссгейм, 1945: 223); **ВК:** В. Сулак. (Галушко, 1978: 247); **ЦК:** В. Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 40), В. Тер. (Гвинианидзе, 1978: 112); **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **Т** (Гроссгейм, 1945: 223).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран) Азия; Сев. Америка (заносное); Австралия (заносное).

В Гербарии LE имеются только 2 достоверных образца. По-видимому, многие указания ошибочны.

Sect. 3. **Leiosperma** (Kindb.) Tzvel.

4 (295). **S. media** (L.) C. Presl, 1826, Fl. Sicul. 1: 161. — *Arenaria media* L. 1762, Sp. Pl. ed. 2: 606. — *A. marginata* DC. 1805, in DC. et Lam. Fl. Fr. ed. 3, 4, 2: 793, nom. illeg. — *Spergularia marginata* (DC.) Kitt. 1844, Taschenb. Fl. Deutschl. ed. 2: 1003.

Описан из Германии и Франции. Lectotypus (Roszbach, 1940: 121): Herb. Linn. 585.23 (LINN).

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк.; **ВК;** **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Ерев.; **Т:**

Указан для **ЗП:** З. Ставр. (Гроссгейм, 1945: 222), В. Ставр. (Галушко, 1978: 247); **ЦК:** В. Кум., В. Тер. (Галушко, 1978: 247); **ЗЗ:** Адж. (Гвинианидзе, 1978: 111).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран), Ср. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное).

Н. Н. Цвелёв (2004) указал для Кавказа *S. bosconei* (Scheele) Asch. et Graebn. Этот вид собирался только на территории Турции.

Trib. 2. Telephieae DC.

3 (56). **Telephium** L.*

1 (296). **T. orientale** Boiss. 1849, Diagn. Pl. Or. sér. 1, 10: 11. — *T. imperati* L. subsp. *orientale* (Boiss.) Nyman, 1879, Consp. Fl. Europ. 2: 254.

Описан с «Востока». *Lectotypus* (Lazkov, hoc loco): «In aridis arenosis lapidosis prope Tatuni, Unio itiner, 1836, R. F. Hohenacker» (G; isolectotypi (2) — LE!).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос., **ЮЗ;** **Т.**

Средиз.; Юго-Зап. (от Турции и Ливана до Пакистана), Ср. (Туркменистан), Южн. (вост. Пакистан) Азия.

2 (297). **T. oligospermum** Steud. ex Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 754.

Описан из Ирака. *Lectotypus* (Rechinger, 1980: 35): «In m. Gara Kurdist. locis lapidosis, 25 VII 1841, № 320, Th. Kotschy» (G-BOIS; isolectotypi (2) — LE!).

ЮЗ: Араг.; **ЮЗ:** Ерев.

Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Ирак, Иран).

Trib. 3. **Polycarphaeae** DC.

4 (57). **Polycarpon** Loeffl. ex L.*

1 (298). **P. tetraphyllum** (L.) L. 1759, Syst. Nat. ed. 10, 2: 881. — *Mollugo tetraphylla* L. 1753, Sp. Pl.: 89.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Burt, Lewis, 1952: 339): Herb. Clifford: 28, «*Mollugo 2*» (BM).

ЗЗ: Абх., Инг.-Рион., Адж.; **Т.**

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран); Сев. Африка.

Trib. 4. Paronychieae Dumort.

5 (58). **Pteranthus** Forssk.*

1 (299). **P. dichotomus** Forssk. 1775, Fl. Aegypt.-Arab.: [pag.] LXII. — *Camphorosma pteranthus* L. 1767, Mantissa Pl. 1: 41.

Описан из Египта.

ВЗ: Ширв., Н. Кур.

Указан для **ВК:** Кубин. (Гроссгейм, 1945: 226).

Средиз.; Юго-Зап. (от Сирии до Пакистана), Южн. (вост. Пакистан) Азия; Сев. Африка.

* Г. А. Лазьков.

6 (59). *Paronychia* Mill.*

Subgen. 1. *Paronychia*

1 (300). *P. argentea* Lam. 1779, Fl. Fr. 3: 230. — *Illecebrum paronychia* L. 1753, Sp. Pl.: 206.

Описан по гербарным материалам из Испании и Франции. Lectotypus (Chaudhri, 1968: 211): Herb. Linn. 290.14, «Hort. Cliff. 41» (LINN).

Указан для **ЮЗ**: Нах. (Долматова, 1989: 108).

Атл., Южн. Европа.

Subgen. 2. *Anoplonychia* (Fenzl) Chaudhri

Sect. 1. *Anoplonychia* Fenzl

2 (301). *P. azerbaijanica* Chaudhri, 1968, Meded. Bot. Mus. Utrecht, 285: 253, pl. 13, fig. 11–15.

Описан с Кавказа. Typus: «USSR, Azerbaijan, Nagorno-Karabakh, distr. Gardut, c. 750 m, 19 V 1948, A. A. Grossheim et al.» (TGM).

ЮЗ: Ю. Караб.

Указан для **ЮЗ**: Мегр.-Зан. (Долматова, 1989: 109).

Эндемик.

3 (302). *P. cephalotes* (Bieb.) Bess. 1830, Cat. Hort. Cremeneci: 4. — *Illecebrum cephalotes* Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 169, p. p., excl. pl. ex Tiflis. — *I. capitatum* auct. non L.: Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 174, p. p., excl. pl. ex Tiflis.

Описан по гербарным материалам из Крыма и Кавказа. Lectotypus (Chaudhri, 1968: 255): «Ex Tauria [Bieberstein]» (LE!).

СЗЗ: Анап.-Гел.

Юго-Вост., Вост. Европа.

P. cephalotes указан для Кавказа рядом авторов (Шишкин, 1936; Гроссгейм, 1945). Образец этого вида: «Новороссийск, 6 V 1892 [В. И. Липский]» хранится в Гербарии LE, однако А. П. Долматова (1989) не привела его для Кавказа.

Sect. 2. *Heterosepalae* Chaudhri

4 (303). *P. kurdica* Boiss. 1843, Diagn. Pl. Or. sér. 1, 3: 10.

Описан из Ирака. Lectotypus (Chaudhri, 1968: 267) «Iraq, ad rupes calc. sacuminis m. Gara Kurdistan, 27 VII 1841, № 334, Th. Kotschy» (G; isolectotypi — HAL, JE, S).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ**: Араг.; **ЮЗ**: Ерев., Севан., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т**.

Указан для **ЮЗЗ**: Месх. (Долматова, 1989: 109).

Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Ливан, Ирак, Иран).

5 (304). *P. splendens* Steven, 1856, Bull. Soc. Nat. Moscou, 29, 3: 184.

* Г. А. Лазьков.

Описан из Нахичевани. *Lectotypus* (Chaudhri, 1968: 272): «In siccis lapidosus colluim secus Nakchichevan, 12 VI 1829, № 396, Szovits» (LE!).

ЮЗ: Ерев., Дар., Нах., Ю. Караб.

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

7 (60). *Herniaria* L.*

Sect. 1. *Herniaria*

1 (305). *H. glabra* L. 1753, Sp. Pl.: 218. — *H. suavis* Klokov, 1947, Бот. журн. АН УРСР, 4, 1–2: 70.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Pugsley, 1930: 214): Herb. Linn. 312.1 (LINN).

ЗП: З. Ставр.; **ЦК:** В. Тер.; **ВК:** В. Сулак.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карг.; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ;** **Т:**

Указан для **ЗК:** Уруп-Теб. (Воробьева, Онипченко, 2001: 36); **ЗЗ:** Адж. (Дмитриева, 1960: 319); **ЦЗ:** Лори. (Шишкин, Аветисян, 1956: 105); **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Гвинианидзе, 1978: 213), Иорск.-Шек. (Гроссгейм, 1945: 226).

Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Африка.

2 (306). *H. caucasica* Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 241 (Fl. Cauc.). — *H. zervudachii* Hand.-Mazz. 1909, Ann. Naturh. Mus. (Wien), 23: 149.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (Chaudhri, 1968: 329): «Caucasus orient., Chewsuria, in m. Borbalo, alt. 1510 hex., 13 IX 1860, Ruprecht» (LE!).

ЦК: В. Тер.; **ВК:** Асо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ВК:** Кубин. (Гроссгейм, 1945: 226); **ЮЗЗ:** Месх. (Гвинианидзе, 1978: 214); **ЮЗ:** Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т** (Гроссгейм, 1945: 226).

Юго-Зап. (Турция, Иран, Афганистан), Ср., Центр. Азия.

3 (307). *H. cinerea* DC. 1815, in DC. et Lam. Fl. Fr. ed. 3, Suppl.: 375. — *H. hirsuta* auct. non L.: Мурав. 1936, Фл. СССР, 6: 571, р. р., quoad syn. et icon.; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 226, р. р., quoad syn.; Карягин, 1952, Фл. Азерб. 3: 316, р. р., quoad syn.; Шишк. и В. Е. Авет. 1956, Фл. Арм. 2: 105, р. р., quoad syn.

Описан из Франции. *Lectotypus* (Hartvig, 1997: 231): «[France, near Montpellier] inter Grès et Castelnaud, 1814, M. Pouzin» (G).

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карг.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Атл., Южн. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср., Южн. (вост. Пакистан) Азия; Сев. Африка.

4 (308). *H. hirsuta* L. 1753, Sp. Pl.: 218; Мурав. 1936, Фл. СССР, 6: 571, р. р., excl. syn. et icon.; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 226, р. р., excl. syn.; Карягин,

* Г. А. Лазьков.

1952, Фл. Азерб. 3: 316, р. р., excl. syn.; Шишк. и В. Е. Авет. 1956, Фл. Арм. 2: 105, р. р., excl. syn.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Hartvig, 1997: 231): Herb. Linn. 312.2 (LINN).

ВЗ: Алаз.-Агрич., Ширв.; **ЮЗ:** Нах.; **Т:**

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб.; **ЗК:** Уруп-Теб.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Мегр.-Зан., Ю. Караб. (Гроссгейм, 1945: 226).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран), Ср. Азия; Сев. Африка.

5 (309). **H. incana** Lam. 1789, Encycl. Méth. Bot. 3: 124 — *H. besseri* Fisch. ex Hornem. 1819, Suppl. Hort. Bot. Hafn.: 127.

Описан из южной Франции. *Lectotypus* (Chaudhri, 1968: 370): «S. France, Bourg-d'Oisans, M. Liottard» (P-LA).

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ: Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЗЗ:** Абх. (Колаковский, 1980: 162); **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Н. Кур. (Гроссгейм, 1945: 226).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран), Ср. (Туркменистан) Азия.

Sect. 2. **Paronychiella** F. N. Williams

6 (310). **H. polygama** J. Gay, 1846–1847, in Duch. Rev. Bot. Recueil Mens. 2: 371. — *H. euxina* Клоков, 1947, Бот. журн. АН УРСР, 4, 1–2: 74.

Описан по гербарным материалам с Украины, из Западной Сибири и Китая. *Lectotypus* (Chaudhri, 1968: 380): «Kioviae in Russia minori, Unio itiner, 1839, R. F. Hohenacker» (L; isolectotypi (2) — LE!).

ЗП: 3. Ставр.

Указан для **ВП:** В. Ставр. (Галушко, 1978: 249).

Юго-Вост., Вост. Европа; Ср., Центр. Азия.

Subfam. 2. MINUARTIOIDEAE Beilschm.

(ALSINOIDEAE Beilschm.)

Trib. 1. **Alsineae** Lam. et DC.

8 (61). **Arenaria** L.*

Subgen. 1. **Arenaria**

Sect. 1. **Arenaria**

1 (311). **A. serpyllifolia** L. 1753, Sp. Pl.: 423. — *A. viscida* Lois. 1809, Journ. Bot. (Desvaux), 2: 324. — *A. uralensis* Spreng. 1825, Syst. Veg. 2: 396.

* Г. А. Лазьков.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 1993: 21): Herb. Clifford: 173, «*Arenaria 2*» (BM).

ЗП; ВП: В. Ставро.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ; ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 246).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. (заносное), Южн. (вост. Пакистан) Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное).

2 (312). **A. leptoclados** (Rchb.) Guss. 1845, Fl. Sicul. Syn. 2: 824. — *A. serpyllifolia* L. *β. leptoclados* Rchb. 1841, Icon. Fl. Germ. Helv. 5–6: 32.

Описан из Европы, без указания точного местонахождения. *Lectotypus* (Phitos, 1997: 166): [Icon] H. G. L. Reichenbach, 1841, Icon. Fl. Germ. Helv. 5–6: tab. 216, fig. 4941 *β.*».

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Кум.; **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** Асо-Арг., В. Сулак.; **СЗЗ:** Пшад.-Джубг.; **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Занг., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ВП:** Тер.-Сулак.; **ЦК:** В. Тер.; **СЗЗ:** Пшад.-Джубг. (Гроссгейм, 1945: 215); **ЗЗ:** Адж. (Дмитриева, 1960: 318); **ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т** (Гроссгейм, 1945: 215).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран), Ср. Азия; Сев. Африка.

Вид слабо отличается от предыдущего.

Sect. 2. **Rotundifolia** McNeill

3 (313). **A. rotundifolia** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 343.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (McNeill, 1963: 263): «*Ex albus Caucasica, Kaischaur, 1802 [Bieberstein]*» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Севан., Нах., Мегр.-Зан.; **Т.**

Указан для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 247).

Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран), Ср. Азия.

Subgen. 2. **Eremogone** (Fenzl) Fenzl

Sect. 1. **Capillares** McNeill

4 (314). **A. lychnidea** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 347.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (McNeill, 1963: 291): «*Ex albus Caucasica, comm. Adams*» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК; ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.

Указан для всех горных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 246).
Юго-Зап. Азия (Турция).

Sect. 2. **Eremogone**

5 (315). **A. brachypetala** (Grossh.) T. N. Popova, 1972, Новости сист. высш. раст. 9: 160. — *A. graminea* C. A. Mey. var. *brachypetala* Grossh. 1928, Beih. Bot. Centralbl. 44, 2: 209.

Описан из Ирана. *Lectotypus* (Попова, 1972: 160): «*Persia borealis*, prov. Tabris (Atropatania), prope Tabris, 1350–1500 m, 25 VI [19]24, A. Grossheim» (LE!).

ЮЗ: Ерев.

Юго-Зап. (Иран) Азия.

Гвоздичные в работе А. А. Гроссгейма (Grossheim, 1928) обработаны Б. К. Шишкиным, но описание разновидности *A. graminea* C. A. Mey. var. *brachypetala*, по-видимому, принадлежит Гроссгейму.

6 (316). **A. cucubaloides** Sm. 1789, Pl. Icon. Ined. 1: 17, tab. 17.

Описан с Кавказа («Sponte nascitur in Armeniâ. Herb. Tourn.»)

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан.

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

7 (317). **A. graminea** C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 220.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (McNeill, 1963: 292): «In campis et collibus siccis lapidosis prope pagum Swant, 20 VI 1830, Meyer» (LE!, cum isolectotypis 2).

Т.

Указан для **ВК:** Ман.-Самур. (Гуссейнов, 1990: 236).

Юго-Зап. Азия (Иран).

По-видимому, указан для **ВК** ошибочно.

8 (318). **A. gypsophiloides** L. 1767, Mantissa Pl.: 71. — *A. caricifolia* Boiss. 1860, in Tchich. Asie Min. Bot. 1: 235.

Описан с «Востока» («Habitat in Oriente»).

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ;** **Т.**

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

9 (319). **A. longifolia** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 345. — *A. graminifolia* auct. non Schrad.: Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 217. — *A. stenophylla* auct. non Ledeb.: Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1: 246.

Описан по гербарным материалам из Восточной Европы. *Lectotypus* (McNeill, 1963): «Ex dit. Wolgicis, Saratow, Sarepta» (LE!).

ЗП: 3. Ставро.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Гроссгейм, 1945: 217); **ВП:** В. Ставро. **ЦК:** В. Кум. (Галушко, 1978: 246); **ВК:** В. Сулак. (Гуссейнов, 1990: 236).

Вост. Европа; Сев., Ср., Центр. Азия.

По-видимому, указан для **ВК** ошибочно.

10 (320). **A. steveniana** Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 692. — *A. graminea* C. A. Mey. β. *parviflora* Fenzl, 1842, in Ledeb. Fl. Ross. 1: 362. — *A. blepharophylla* Boiss. var. *parviflora* (Fenzl) McNeill, 1963, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 24, 3: 293.

Описан с Кавказа («Hab. in Armeniâ Rossicâ prope Erivan (Stev.!) et ad lacum Göktchai (Bunge!)»).

ЦК: В. Кум.; **БК:** Ман.-Самур.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

Из **ЦК:** В. Кум.; **БК:** Ман.-Самур. имеются только старые сборы, возможно, с ошибочными этикетками.

Sect. 3. **Glomeriflorae** F. N. Williams

11 (321). **A. dianthoides** Sm. 1789, Pl. Icon. Ined. 1: 16, tab. 16.

Описан с Кавказа («Sponte nascitur in Armeniâ. Herb. Tourn.»).

ЮЗЗ: Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ;** **Т.**

Указан для **ВП:** Тер.-Сулак. (Гуссейнов, 1990: 236).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

По-видимому, указан для **ВП** ошибочно.

Sect. 4. **Rigidae** McNeill

12 (322). **A. holostea** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 345.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (McNeill, 1963: 297): «Ex Caucaso iberico» (LE — Herb. Bieb!).

ЦК: В. Тер.; **БК:** В. Сулак., Ман.-Самур.

Указан для **ЗК:** В. Куб.; **ЦК:** Малк. (Галушко, 1978: 246).

Эндемик.

13 (323). **A. macrantha** Schischk. 1936, Фл. СССР, 6: 886, 552. — *A. holostea* Bieb. subsp. *macrantha* (Schischk.) McNeill, 1963, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 24, 3: 297. — *A. szovitsii* auct. non Boiss.: Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 221; Ахундов, 1952, Фл. Азерб. 3: 207; Шишк. и В. Е. Авет. 1956, Фл. Арм. 2: 74.

Описан с Кавказа. *Typus*: «Эриванская губ., Сурмалинский у., близ с. Такялту, каменистые склоны, 10 VI 1913, № 12254, Ю. Воронов» (LE!).

ЮЗ: Ерев., Нах.

Юго-Зап. Азия (Турция).

9 (62). **Dichodon** (Bartl.) Rchb.*

Sect. 1. **Perennia** Ikonn.

1 (324). **D. cerastoides** (L.) Rchb. 1842, Icon. Fl. Germ. Helv. 5: 34 — *Stellaria cerastoides* L. 1753, Sp. Pl.: 422. — *Cerastium cerastoides* (L.) Britton, 1894, Mem. Torrey Bot. Club, 5: 150.

* И. В. Соколова.

Описан по материалам из Фенноскандии (Лапландия) и культивированным экземплярам из сада Монпелье.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Севан., Нах., Занг.

Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср., Центр. Азия; Сев. Америка.

Ошибочно указан для **ЗП:** Аз.-Куб.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1978: 237).

Sect. 2. *Dichodon*

2 (325). **D. viscidum** (Bieb.) Holub, 1974, Folia Geobot. Phytotax. (Praha), 9, 3: 273. — *Stellaria viscida* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 342. — *Cerastium anomalum* Waldst. et Kit. 1799, in Willd. Sp. Pl. 2: 812, non Schrank, 1795. — *C. dubium* (Bastard) Guépin, 1830, Fl. Maine Loire: 267.

Описан по материалам из Крыма и Кавказа. Ту р у s: «Ex Tauro et Caucaso rutheno, 1804 [Bieberstein]» (LE!).

ЗП: Аз.-Куб., З. Ставр.; **ВП:** Тер.-Сулак.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев.; **Т:**

Указан для **ВП:** Тер.-Кум. (Галушко, 1978: 237), **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах. (Харадзе, 1978: 33); **ЮЗ:** Севан. (Шишкин, Аветисян, 1956: 29).

Центр., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия.

3 (326). **D. schischkinii** (Grossh.) Ikonn. 1973, Новости сист. высш. раст. 10: 142. — *Cerastium schischkinii* Grossh. 1950, Бот. мат. (Ленинград), 13: 9.

Описан из Нахичевани. Ту р у s: «Азербайджан, Нахичеванская АССР, Шах-бузский р-н, Биченахский перевал, ок. 2500 м над ур. м., на пастбищах, 16 VI 1947, А. Гроссгейм, И. Ильинская, М. Кирпичников» (LE!).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос. (гора Цхра-Цкаро); **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Нах.

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

10 (63). *Moehringia* L.*

1 (327). **M. trinervia** (L.) Clairv. 1811, Man. Herb. Suisse: 150. — *Arenaria trinervia* L. 1753, Sp. Pl.: 423.

Описан из Европы. Lectotypus (Rechinger, 1988: 59): Herb. Linn. 585.7 (LINN).

ЗП: З. Ставр.; **ЗК;** **ЦК;** **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.; **ЮЗ:** Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр.; **ВК:** В. Сулак.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Севан. (Гроссгейм, 1945: 219).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср., Центр. Азия.

* Г. А. Лазьков.

11 (64). *Bufonia* L.*

1 (328). **B. oliveriana** Ser. 1824, in DC. Prodr. 1: 388. — *B. parviflora* Griseb. 1834, Spic. Fl. Rumel. 1: 197. — *B. virgata* Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 665. — *B. tenuifolia* auct non L.: Гвин. 1978, Фл. Груз. изд. 2, 4: 69.

Описан из Ирана («Circa Teheran Persiae (v. s. ex herb. Olivier)»).

ЗП: Аз.-Куб.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв.; **ЮЗ:** Ерев., Дар.

Указан для **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт. (Гроссгейм, 1945: 201); **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах. (Гвинашвили, 1978: 69); **ЮЗ:** Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб; **Т** (Гроссгейм, 1945: 201).

Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Ирак, Иран, Афганистан), Ср. (Туркменистан) Азия.

2 (329). **B. takhtajanii** Nersesian, 2002, Фл. растит. и раст. рес. Арм. 14: 4. — *B. sintenisii* auct. non Freyn: Нерсесян, 1999, Фл. растит. и раст. рес. Арм. 12: 56.

Описан из Армении. Турус: «Армения, Араратский р-н, окр. с. Веди, внутреннее ущелье хребта Ерах, гипсоносные, щебнистые склоны, 18 VI 1998, А. Нерсесян» (ERE, cum isotypis; isotypi — В, LE!).

ЮЗ: Ерев.

Эндемик.

12 (65). *Lepyrodiclis* Fenzl*

1 (330). **L. holosteoides** (C. A. Mey.) Fisch. et C. A. Mey. 1841, Enum. Pl. Nov. 1: 93. — *Gouffea holosteoides* C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 217.

Описан с Кавказа. Lectotypus (McNeill, 1963: 402): «In locis humidis prope pag. Swant, 23 VI 1830, C. A. Meyer» (LE!).

ЮЗЗ: Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Севан., Нах.; **Т.**

Указан для **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Ерев., Мегр.-Зан. (Гроссгейм, 1945: 201).

Вост. Европа (заносное); Сев. (заносное), Юго-Зап. (от Турции и Ирака до Афганистана), Ср., Центр., Вост. (заносное) Азия.

2 (331). **L. stellarioides** Schrenk, 1841, in Fisch. et C. A. Mey. Enum. Pl. Nov. 1: 93.

Описан из Казахстана. Lectotypus (McNeill, 1963: 402): «In collibus aridis Koguldur, 29 V 1840 [Schrenk]» (LE!).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.

Юго-Зап. (Ирак, Иран, Афганистан), Ср. Азия.

* Г. А. Лазьков.

13 (66). **Cerastium** L.*

Subgen. 1. **Cerastium**

Sect. 1. **Caespitosa** (Pax et K. Hoffm.) I. V. Sokolova

1 (332). **C. holosteoides** Fries, 1817, Nov. Fl. Suec. 4: 52. — *C. caespitosum* Gilib. 1782, Fl. Lithuan. 2: 159, nom. inval. — *C. fontanum* Baumg. subsp. *triviale* (Spenn.) Jalas, 1963, Arch. Soc. Zool. Bot. Fenn. Vanamo, 18, 1: 63. — *C. holosteoides* subsp. *triviale* (Link) Möschl, 1964, Mém. Soc. Brot. 17: 11.

Описан с юга Швеции.

ЗП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ.

Указан для **Т** (Халилов, 1952: 290).

Европа; Азия; Сев. Африка; Америка (заносное); Австралия (заносное).

Sect. 2. **Cerastium**

2 (333). **C. arvense** L. 1753, Sp. Pl.: 438.

Описан по материалам из Скандинавии и Южной Европы.

ЗП: З. Ставр.; **ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.

Европа; Сев., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка (заносное).

3 (334). **C. ponticum** Albov, 1894, Bull. Herb. Boiss. 2: 449.

Описан из Абхазии. *Le cotype* (Соколова, 1996: 38): «Mons Khóon pres Tschipchira (crete Bzybienne), pâturages alpins, 2 X 1893, № 497, N. Alboff» (G!).

3а. **C. ponticum** Albov var. **ponticum**.

ЗЗ: Туап.-Адл. (Красная Поляна, р. Мзымта), Абх.

Эндемик.

3б. **C. ponticum** Albov var. **glabratum** Sachok. et Charadze, 1978, Фл. Груз. изд. 2, 4: 50; iid. 1939, в Колак. Фл. Абх. 2: 90, descr. ross.

Описан из Абхазии. *Typus*: «Abchazia. M. Arabica, 26 VIII 1967, Z. Gvinia-nidze, D. Mtzchvetadze» (ТВИ!).

ЗЗ: Абх.

Эндемик.

4 (335). **C. szowitsii** Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 717; Шишк. 1936, Фл. СССР, 6: 465, р. р.; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 196, р. р. — *C. araraticum* auct. non Rupr.: Гроссг. 1930, Фл. Кавк. 2: 383, р. р.; Cullen, 1967, Fl. Turk. 2: 79, р. р.

Описан из Азербайджана (гора Кирс). *Typus*: «Armenia Rossica, mons Kias, Szowits» (G!).

4а. **C. szowitsii** Boiss. var. **szowitsii**.

ВЗ: Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

* И. В. Соколова (Соколова, 1996).

4b. **C. szowitsii** Boiss. var. **album** (Buschm.) I. V. Sokolova ex Czer. 1993, Vasc. Pl. Russ. Adjac. States: 162. — *C. gnaphalodes* Fenzl subsp. *album* Buschm. 1939, Feddes Repert. 46: 34.

Описан из Турции. Т у р u s: «Armenia turcica, Szandschak Gumuschkhane in lapidos mont. Aktasch. It[er] orient[ale], 1894, № 6229, Sintenis» (WU; isotypus — LE!).

ВЗ: Караб.; **ЮЗ:** Севан., Занг.
Юго-Зап. Азия (вост. Турция).

5 (336). **C. araraticum** Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 234 (Fl. Cauc.). — *C. szowitsii* auct. non Boiss.: Шишк. 1936, Фл. СССР, 6: 465, р. р.; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 196, р. р.

Описан из Турции (гора Арарат). Л е с т о т у р u s (Соколова, 1996: 39): «In m. Ararat, 1700 hex., leg. Moritz» (LE!).

5a. **C. araraticum** Rupr. var. **araraticum**. — *C. szowitsii* Boiss. var. *glabratum* (Trautv.) Grossh. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 196.

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан.

Указан для **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карг. (Харадзе, 1978: 53).

Юго-Зап. Азия (вост. Турция).

По-видимому, указан для **ЦЗ** ошибочно.

5b. **C. araraticum** Rupr. var. **lanuginosum** Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 234 (Fl. Cauc.). — *C. szowitsii* Boiss. var. *lanuginosum* (Rupr.) Grossh. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 196.

Описан из Турции (гора Арарат). Л е с т о т у р u s (Соколова, 1996: 39): «In m. Ararat, 17 V 1844, leg. D. Bayer» (LE!).

ЮЗ: Севан., Дар. (Ехегнадзорский р-н, р. Ехегис).

Юго-Зап. Азия (вост. Турция).

6 (337). **C. capillatum** I. V. Sokolova, 1990, Бот. журн. 75, 10: 1450.

Описан из Центрального Закавказья. Т у р u s: «Herbarium provinciae Lori. Безобдальский хр., гора Тодор, сев. склон, 7000–8000 ф., 12 VII 1920, А. Шелковников» (LE; isotypus — TGM).

ЦЗ: Лори; **ЮЗ:** Ю. Караб.

Юго-Зап. Азия (вост. Турция).

7 (338). **C. gnaphalodes** Fenzl, 1842, Pugil. Pl. Nov. Syr. Tauri Occ. 1: 11.

Описан из Турции. Л е с т о т у р u s (Buschmann, 1938: 130): «Taurus, № 53, Kotschy» (W).

ЮЗЗ: Месх.

Юго-Зап. Азия.

8 (339). **C. dagestanicum** Schischk. 1936, Фл. СССР, 6: 883, 465. — *C. szowitsii* auct. non Boiss.: Гроссг. 1930, Фл. Кавк. 2: 382.

Описан из Дагестана. Т у р u s: «Dagestania, Achty, 1880, leg. Becker» (LE!).

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.

Эндемик.

9 (340). **C. argenteum** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 361. — *C. banaticum* auct. non (Rochel) Heuff.: Cullen, 1967, Fl. Turk. 2: 78, p. p., in textu.

Описан из окр. Тбилиси. *Lectotypus* (Соколова, 1996: 40): «Ex argo Tiflensis, a. 1803 [Bieberstein]» (LE!).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.

Указан для **ВК:** Ман.-Самур. (Гусейнов, 1990: 236).

Эндемик.

Мы согласны с мнением Р. А. Муртазалиева (2009: 96) о сомнительности указания этого вида для Дагестана.

Ошибочно указан для **Т** и прилегающих районов Ирана (Möschl, 1966: 165, 1988: 97).

10 (341). **C. sosnowskyi** Schischk. 1936, Фл. СССР, 6: 464. — *C. argenteum* Bieb. subsp. *glabratum* Sosn. 1923, Вестн. Тифл. бот. сада, нов. сер. 1: 73. — *C. banaticum* auct. non (Rochel) Heuff.: Cullen, 1967, Fl. Turk. 2: 78, p. p.

Описан из Юго-Западного Закавказья. *Lectotypus* (Соколова, 1996: 40): «Distr. Achalzich, ad rupes prope p. Zniss, 1 VIII 1920, D. Sosnowsky» (ТБИ!).

ЗЗ: Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Боржомское ущелье, перевал Цхра-Ццаро).

Указан для **ЗЗ:** Адж.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах. (Харадзе, 1978: 52).

Юго-Зап. Азия (Турция).

В Гербарии LE хранится гербарный лист *C. sosnowskyi* с этикеткой: «Бзыбь, № 864, Захарова, Панютин». Других сборов этого вида из Абхазии нет.

11 (342). **C. annae** I. V. Sokolova, 1990, Бот. журн. 75, 10: 1449.

Описан из Западного Закавказья. *Турис:* «Мегрельский [Эгрисский] хребет, западный склон горы Джвари, известняковые осыпи, 2700 м над ур. м., 9 VIII 1947, А. Колаковский» (LE!).

ЗЗ: Инг.-Рион.

Эндемик.

12 (343). **C. polymorphum** Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 237 (Fl. Cauc.). — *C. alpinum* auct. non L.: Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 361.

Описан из центральной части Большого Кавказа. *Lectotypus* (Соколова, 1996: 40): «Kaischaur, Steven» (LE — Herb. Bieb!).

12a. **C. polymorphum** Rupr. var. **polymorphum**. — *C. polymorphum* α. *decumbens* Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 238 (Fl. Cauc.).

ЗК; ЦК: Малк., В. Тер.; **ВК:** Аcco-Арг.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.
Эндемик.

12b. **C. polymorphum** Rupr. var. **mollifolium** Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 238 (Fl. Cauc.). — *C. polymorphum* γ. *alpestre* Rupr. 1869, l. c.: 239. — *C. polymorphum* δ. *myrtifolium* Rupr. 1869, l. c.: 239. —

C. polymorphum ε. *meyeri* Rupr. 1869, l. с.: 239. — *C. polymorphum* η. *viscidulum* Rupr. 1869, l. с.: 239.

Описан с Большого Кавказа. *Lectotypus* (Соколова, 1996: 40): «In herbidis ad rivulum Malka, 12 VII, № 24, Meyer» (LE!).

ЗК; ЦК: Малк., В. Тер.; **ВК; ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич. (Лагодехский и Закатальский р-ны).

Эндемик.

Sect. 3. **Fugacia** (Fenzl ex Pax et K. Hoffm.) I. V. Sokolova

13 (344). **C. glomeratum** Thuill. 1799, Fl. Envir. Paris, ed. 2: 226.

Описан из Франции.

ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб., **ВП:** В. Ставр. (Галушко, 1978: 241); **ЦЗ:** Лори, **ВЗ:** Ширв. (Халилов, 1952: 288); **ЮЗ:** Занг. (Шишкин, Аветисян, 1956: 35).

Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. Азия; Америка (заносное).

14 (345). **C. brachypetalum** Desp. ex Pers. 1805, Syn. Pl. 1: 520.

Описан из Франции (г. Ле-Ман).

14а. **C. brachypetalum** Desp. ex Pers. subsp. **brachypetalum**. — *C. tauricum* Spreng. 1818, Novi Provent. Hal. Berol.: 10. — *C. brachypetalum* subsp. *roeseri* (Boiss. et Heldr.) Nyman, 1878, Consp. Fl. Europ. 1: 109.

ЗП: Аз.-Куб.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Караб.; **ЮЗ:** Занг., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ВП:** В. Ставр., **ЗК:** В. Куб. (Галушко, 1978: 241); **ВЗ:** Мург.-Муровд. (Шишкин, Аветисян, 1956: 35).

Европа; Средиз.

14б. **C. brachypetalum** Desp. ex Pers. subsp. **strigosum** (Fries) Lonsing, 1939, Feddes Repert. 46: 157. — *C. strigosum* Fries, 1818, Fl. Halland. 1: 78. — *C. brachypetalum* subsp. *brachypetalum*: Sell a. Whitehead, 1964, Feddes Repert. 69, 1: 18.

Описан с юго-запада Швеции.

ЦК: В. Кум.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.

Сев. (юг), Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.

15 (346). **C. luridum** Guss. 1842, Fl. Sicul. Syn. 1: 510.

Описан с Сицилии.

Т:

Южн. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия.

16 (347). **C. pumilum** Curtis, 1777, Fl. Londin. 2, 16: tab. 30. — *C. glutinosum* auct. non Fries: Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 193, р. р. — *C. pumilum* subsp. *pumilum*: P. D. Sell a. Whitehead, 1964, Feddes Repert. 69, 1: 22.

Описан из Великобритании (окр. Лондона).

ЗП: Аз.-Куб.; **ЦК:** В. Кум.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. (заносное), Вост. (заносное) Азия; Сев. Америка (заносное).

17 (348). **C. glutinosum** Fries, 1817, Nov. Fl. Suec. 4: 51. — *C. pumilum* Curtis subsp. *pallens* (F. W. Schultz) Schinz et Thell. 1907, Bull. Herb. Boiss. sér. 2, 7: 402. — *C. pumilum* auct. non Curtis: Гроссг. 1930, Фл. Кавк. 2: 326, p. p.

Описан с юга Швеции.

ЗП: Аз.-Куб., З. Ставр.

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур. (Галушко, 1978: 239); **ВП:** Тер.-Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 98); **ЦЗ:** Лори, **ЮЗ:** Занг. (Шишкин, Аветисян, 1956: 35).

Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия.

18 (349). **C. semidecandrum** L. 1753, Sp. Pl.: 438. — *C. rotundatum* Schur, 1877, Verh. Naturf. Ver. Brünn, 15, 2: 146. — *C. balearicum* F. Herm. 1913, Verh. Bot. Ver. Brandenb. 54: 247. — *C. dentatum* Möschl, 1933, Österr. Bot. Zeitschr. 82: 230.

Описан из Северной Европы.

ЗП; ВП; ЦК; ВК; СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ; ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЗЗ:** Инг.-Рион. (Харадзе, 1978: 58).

Европа; Средиз.; Юго-Зап., Юго-Вост. (заносное) Азия; Сев. Америка (заносное); Австралия (заносное).

19 (350). **C. syvaschicum** Клеоров, 1939, Журн. Инст. бот. АН УРСР, 21–22 (29–30): 245.

Описан из Украины (Причерноморье). *Lectotypus* (Клоков, 1947: 64): «О-в Бирючий, Чича» (KW!).

ЗП: Аз.-Куб.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.

Юго-Вост. (Крым), Вост. (юг Украины) Европа.

Растения из причерноморских и приазовских областей Кавказа и Украины близки к средиземноморскому *C. diffusum* Pers. У последнего вида, согласно диагнозу, цветоножки в 2–4 раза превышают чашечку, тогда как у причерноморских растений — не более чем в 2 раза. Поэтому мы рассматриваем их в качестве самостоятельного вида.

Subgen. 2. **Schizodon** Fenzl

Sect. 1. **Schizodon** (Fenzl) Schischk.

20 (351). **C. purpurascens** Adams, 1805, in Weber u. Mohr, Beitr. Naturk. 1: 60.

Описан с Кавказа (Осетия).

20a. **C. purpurascens** Adams subsp. **purpurascens**.

ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ: Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ; ЮЗ:**

Юго-Зап. Азия.

20b. **C. purpurascens** Adams subsp. **parviflorum** (Trautv.) I. V. Sokolova ex Czer. 1993, Vasc. Pl. Russ. Adjac. States: 162. — *C. purpurascens* var. *parviflorum* Trautv.

1873, Тр. Петерб. бот. сада, 2, 2: 514. — *C. purpurascens* f. *ensifolium* Möschl, 1966, Sitzungsber. Akad. Wiss. (Wien), abt. 1, 175, 7–8: 198.

Описан из Армении (Цахкадзор, бывш. Дарачичар). *Lectotypus* (Соколова, 1996: 43): «Daratschitschach, 30 V 1871, G. Radde» (LE!; *isolectotypi* — TBI!, TGM!).

ВЗ: Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ.**

Юго-Зап. Азия (Турция, ?Иран).

В **ЦЗ**, **ЮЗЗ** и **ЮЗ** встречаются экземпляры *C. purpurascens* с признаками, промежуточными между двумя подвидами.

21 (352). **C. elbrusense** Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 729. — *C. pseudokasbek* Vysok. 1950, Тр. Бот. инст. АН АрмССР, 7: 61. — *C. purpurascens* Adams var. *elbrusense* (Boiss.) Möschl, 1966, Sitzungsber. Akad. Wiss. (Wien), abt. 1, 175, 7–8: 198. — *C. kasbek* auct. non Parrot: Cullen, 1967, Fl. Turk. 2: 77.

Описан из Ирана (горы Эльбурс). *Lectotypus* (Möschl, 1988: 100, «typus»): «498. In alpinis Hasartschal in partibus occidentalibus m. Elbrus [errore, Elburs], 1843, Th. Kotschy» (G!; *isolectotypus* — LE!).

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ:** Севан., Нах., Занг.

Указан для **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах. (Харадзе, 1978: 44).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

22 (353). **C. ruderale** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 357.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (Соколова, 1996: 44): «Ex argo Kisljariensi, 1798 [M. Bieberstein]» (LE!).

ВП: Тер.-Сулак. (Кизляр); **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** В. Сулак.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ;** **ЮЗ.**

Указан для **ЗП;** **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум. (Галушко, 1978: 241); **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт. (Харадзе, 1978: 55).

Эндемик.

По крайней мере часть приведенных указаний относится к неверно определенным экземплярам *C. nemorale* Bieb.

23 (354). **C. dichotomum** L. 1753, Sp. Pl.: 438.

Описан из Испании.

ЦК: В. Тер. (Эльхотово); **ЮЗЗ:** Араг.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Ширв.; **ЮЗ;** **Т.**

Атл., Сев. (юг Скандинавии — заносное), Центр., Южн., Вост. (заносное) Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия.

24 (355). **C. inflatum** Gren. 1841, Mém. Compt. Rend. Soc. Enum. Doubs, 1: 6, 45; Link, 1829, in Desf. Cat. Pl. Horti Paris: 463, nom. nud. — *C. dichotomum* L. subsp. *inflatum* (Link) Cullen, 1967, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 27, 2: 211, nom. inval.

Описан из Ирана («Persia»).

ЮЗ.

Средиз. (вост.); Юго-Зап., Ср. Азия.

25 (356). **C. longifolium** Willd. 1789, Sp. Pl. 2: 814.

Описан из Армении (возможно, нынешней территории Турции; «in Armenia»).

ЮЗ: Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Юго-Зап. Азия.

26 (357). **C. saccardoanum** Diratz. 1912, in Bég. et Diratz. Contrib. Fl. Armenia: 42, tab. 1, 3–5.

Описан из Турции. *T y p u s*: «Arm. cilic.: Elbistan, 10 VI 1907, № 63, Asdurian» (FI?).

ЮЗ: Нах. (Азнабюрт).

Юго-Зап. Азия (Турция).

27 (358). **C. fragillimum** Boiss. 1842, Diagn. Pl. Or. sér. 1, 1: 54.

Описан из Турции («Hab. ad umbram Juniperorum in regione alpina, Cadmus, Mesogis, Tmolus; legi Jun. 1842»). *L e c t o t y p u s* (Sokolova, hoc loco): «Umbrosis Cadmi supra Colossam, VI 1842» (G!).

ЮЗ: Нах. (Норашенский р-н, с. Ахура).

Юго-Зап. Азия.

Sect. 2. **Strephodon** Ser.

28 (359). **C. undulatifolium** Sommier et Levier, 1893, Тр. Петерб. бот. сада, 13, 1: 41.

Описан по материалам с Кавказа (Сванетия и гора Эльбрус). *L e c t o t y p u s* (Соколова, 1996: 44): «In latere bor. occ. montis Elbrus (vulgo Minghitau), in monte supra flumen Kukurtli, 3000 m, 9 IX 1890, S. Sommier, E. Levier» (LE!).

ЦК: Малк., В. Тер.; **ЗЗ:** Инг.-Рион.

Эндемик.

В Гербарии МВ хранится гербарный лист *C. undulatifolium* с этикеткой: «Армянская ССР, Даралагез, левый склон долины Арпачая, VII 1929, А. и И. Шукины». Других сборов вида за пределами Большого Кавказа нет, поэтому достоверность этикетки сомнительна.

29 (360). **C. multiflorum** C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 222. — *C. salatavicum* Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 229 (Fl. Cauc.).

Описан с Главного Кавказского хребта. *L e c t o t y p u s* (Соколова, 1996: 45): «In regione alpina (alt. 5000–6000 ped.) versus torrentem Terek prope pagos Kobi et Sion, 14–15 IX 1829, Meyer» (LE!).

ЗК: В. Куб.; **ЦК:** Малк. (Приэльбрусье), В. Тер.; **ВК;** **ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.

Эндемик.

Ошибочно указан для **Т** (Möschl, 1966: 192, 1988: 95).

30 (361). **C. kasbek** Parrot, 1815, Reise Cauc. 2: 88.

Описан с Кавказа (гора Казбек). *L e c t o t y p u s* (Соколова, 1996: 45): «...In monte Kasbecki..., Parrot» (LE!).

ЦК: В. Тер.; **ВК;** ?**ВЗ:** Алаз.-Агрич.

Указан для **ЦК**: Малк. (Эльбрус) (Галушко, 1978: 239); **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос. (Харадзе, 1978: 35).

Эндемик.

31 (362). **C. davuricum** Fisch. ex Spreng. 1815, Pl. Min. Cogn. Pugil. 2: 65. — *Dichodon davuricum* (Fisch. ex Spreng.) Á. Löve et D. Löve, 1975, Bot. Not. (Lund), 128, 4: 507 («*dahuricum*»).

Описан из Забайкалья.

ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ: Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ; Т**: Сев. (вост.), Вост. Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр. Азия.

32 (363). **C. hemschicum** Schischk. 1936, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 2: 134. — *C. davuricum* auct. non Fisch. ex Spreng.: Cullen, 1967, Fl. Turk. 2: 76, р. р.

Описан из Турции (Лазистан). Т у р и с: «Lazistania turcica, fauces flum. Furtuna-dere, prope pag. Gzat, in rupestribus, alt. circa 1300 m, 1 IX 1917, В. Schischkin» (LE!).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ**: Месх. (окр. Абастумани); **ВЗ**: Алаз.-Агрич.

Указан для **ЗК; ВК**: Ассо-Арг. (Галушко, 1978: 238).

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

33 (364). **C. oreades** Schischk. 1936, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 2: 133. — *C. svanicum* Charadze, 1938, Тр. Тбил. бот. инст. 2: 186.

Описан с Главного Кавказского хребта. Т у р и с: «Терская обл., Владикавказский окр., Мамиссонский перевал, по склонам, 16 VII 1916, № 2098, Н. Введенский» (LE!).

ЦК: В. Тер. (Мамиссонский перевал); **ВК**: В. Сулак.; **ЗЗ; ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.

Указан для **ЗК**: Уруп-Теб., В. Куб. (Галушко, 1978: 238); **ВК**: Ман.-Самур. (Муртазалиев, 2009, 1: 99); **ВЗ** (Халилов, 1952: 285).

Эндемик.

34 (365). **C. microspermum** С. А. Мей. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 222.

Описан из Тальша. Л е с т о т у р и с (Соколова, 1996: 45): «In locis graminosis altior. montium Talusch, VI 1830 [С. А. Meyer]» (LE!).

Т.

Юго-Зап. Азия (Иран).

35 (366). **C. holosteum** Fisch. ex Hornem. 1813, Hort. Bot. Hafn.: 434.

Описан по экземпляру, присланному из Ботанического сада в Горенках («*missum... ex horto gorinkano*»).

35а. **C. holosteum** Fisch. ex Hornem. var. **holosteum**.

ЗП: З. Ставр.; **ВП**: Тер.-Сулак.; **ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ**: Инг.-Рион.; **ВЗ**: Мург.-Муровд.; **ЮЗ**.

Указан для **ЦЗ**: Лори (Шишкин, Аветисян, 1956: 29).

Эндемик.

35b. **C. holosteuum** Fisch. ex Hornem. var. **meyerianum** (Rupr.) I. V. Sokolova ex Czer. 1993, Vasc. Pl. Russ. Adjac. States: 161. — *C. meyerianum* Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 221 (Fl. Cauc.).

Описан с Кавказа (окр. Владикавказ). *Typus*: «In sylvis pr. Wladikawkask, 10 IX 1829 [Meyer]» (LE!).

ЗК: Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**.

Указан для **ВК**: В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 99).

Эндемик.

По-видимому, указан для **ВК** ошибочно.

36 (367). **C. nemorale** Vieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 317.

Описан с Кавказа (окр. Ставрополя). *Lectotypus* (Соколова, 1996: 46): «Ex nemoribus circa Stauropolin et Severnaja, 1813» (LE — Herb. Vieb!).

ЗП; **ВП**: В. Ставр.; **ЗК**; **ЦК**; **ВК**; **ЗЗ**: Инг.-Рион.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос. (Тбилиси); **ЮЗ**: Ерев.; **Т** (Лерик).

Указан для **ЦЗ**: Лори (Шишкин, Аветисян, 1956: 30); **ВЗ** (Халилов, 1952: 285). Вост. Европа; ?Юго-Зап., Ср. (Кыргызстан — Лазьков и др., 2011: 227) Азия.

37 (368). **C. perfoliatum** L. 1753, Sp. Pl.: 437.

Описан из Греции (возможно, местонахождение указано ошибочно: «in Graecia»).

ЗП; **ВП**: Тер.-Сулак.; **ВК**; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ВЗ**; **ЮЗ**.

Указан для **ЮЗЗ**: Араг. (Шишкин, Аветисян, 1956: 30).

Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. Азия.

14 (67). **Stellaria** L.*

Sect. 1. *Alsine* (L.) Tzvel.

1 (369). **S. media** (L.) Vill. 1789, Hist. Pl. Dauphiné, 3: 615. — *Alsine media* L. 1753, Sp. Pl.: 272.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Turrill, 1956: 24): Herb. Linn. 388.1 (LINN).

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП**: В. Ставр.; **ЗК**: Бело-Лаб., В. Куб.; **ЦК**; **ВК**; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Адж.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Алаз.-Агрнич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ**: Месх.; **ЮЗ**: Ерев., Нах., Занг., Ю. Караб.; **Т**.

Указан для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 235); **ЗЗ**: Инг.-Рион. (Гагнидзе, Кемулариа-Натадзе, 1985: 61).

Европа; Средиз.; Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное); Австралия (заносное).

2 (370). **S. neglecta** Weihe, 1825, in Bluff et Fingerh. Comp. Fl. Germ. 1: 560.

Описан из Германии.

ЗП: Аз.-Куб.; **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**; **ВК**; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах.; **ЮЗ**: Ерев., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т**.

* Г. А. Лазьков.

Указан для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 235); **ЗЗ**: Инг.-Рион. (Гагнидзе, Кемулариа-Натадзе, 1985: 61).

Европа; Средиз.; Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное).

3 (371). **S. pallida** (Dumort.) Piré, 1863, Bull. Soc. Bot. Belg. 2: 40. — *Alsine pallida* Dumort. 1827, Fl. Belg.: 109.

Описан из Бельгии.

ВП: Тер.-Кум.; **ВК**: Ман.-Самур.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗ**: Ерев., Мегр.-Зан.

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Южн. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное).

Sect. 2. **Hylebia** W. D. J. Koch

4 (372). **S. nemorum** L. 1753, Sp. Pl.: 421.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 1994: 159): Herb. Burser XVI (1): 69 (UPS-BURSER).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**: Малк.; **ВК**: Ман.-Самур.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Адж.

Указан для **ЗП**: Аз.-Куб. (Галушко, 1978: 235), **ЗЗ**: Инг.-Рион. (Гагнидзе, Кемулариа-Натадзе, 1985: 61), Рион.-Квир. (Гвиниашвили, 1978: 19); **ЮЗЗ**: Месх. (Гроссгейм, 1945: 181).

Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

Sect. 3. **Larbreia** (A. St.-Hil.) Bluff et Fingerh.

5 (373). **S. alsine** Grimm, 1767, Nova Acta Acad. Leop.-Carol. 3 (App.): 313.

Описан из Германии.

ЗЗ: Адж.

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Центр., Вост., Южн. (вост. Пакистан) Азия; Сев. Америка.

6 (374). **S. anagalloides** C. A. Mey. ex Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 222 (Fl. Cauc.).

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (Lazkov, hoc loco): «In locis humidis versus mont. Ragun, in Caucaso occidentali, 14 VII 1829 [C. A. Meyer]» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**; **ВК**: Ассо-Арг., В. Сулак.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.

Указан для **ЦЗ**: Лори.; **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах. (Гроссгейм, 1945: 183).

Эндемик.

7 (375). **S. crassifolia** Ehrh. 1784, Hannover Mag. 8: 116.

Описан из Германии.

ЮЗ: Севан.

Атл., Сев., Центр., Вост. Европа; Сев., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

8 (376). **S. graminea** L. 1753, Sp. Pl.: 422.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 1994: 159): Herb. Burser XI: 111 (UPS- BURSER).

ЗП; ВП: В. Ставр., Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЗК; ЦК; ВК:** Ассо-Арг.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Адж.

Указан для **ВП:** В. Ставр. (Гроссгейм, 1945: 183), **ВЗ:** Иорск.-Шек.; **ЮЗЗ:** Месх. (Гвиниашвили, 1978: 22).

Европа; Средиз.; Сев., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка (заносное).

9 (377). **S. persica** Boiss. 1853, Diagn. Pl. Or. sér. 2, 1: 85.

Описан из Ирана. *Lectotypus* (Coode, 1967: 71): «[Iran] Monta Ellwind Persiae, № 610, Aucher-Eloy» (G).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Тоб., В. Куб.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Севан., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Указан для **ЦК:** В. Кум. (Галушко, 1978: 237); **ВК:** Ассо-Арг. (Очиаури, 1981: 58); **ЗЗ:** Инг.-Рион. (Гагнидзе, Кемулария-Натадзе, 1985: 61); **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт., Лори.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Ерев., Дар. (Гроссгейм, 1945: 183).

Юго-Зап. Азия (Иран, Турция).

Sect. 4. **Stellaria**

10 (378). **S. holostea** L. 1753, Sp. Pl.: 422.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 1993: 91): Herb. Linn. 584.4 (LINN).

ЗП: З. Ставр.; **ЗК; ЦК:** В. Тер.; **ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Месх.; **Т.**

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Гроссгейм, 1945: 182); **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум. (Галушко, 1978: 237); **СЗЗ:** Пшад.-Джубг.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд. (Гроссгейм, 1945: 182).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка (заносное).

15 (68). **Holosteum** L.*

1 (379). **H. glutinosum** (Bieb.) Fisch. et C. A. Mey. 1839, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 6: 52. — *Arenaria glutinosa* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 344. — *Holosteum polygamum* C. Koch. 1841, Linnaea, 15: 708. — *H. umbellatum* L. var. *glutinosum* (Bieb.) J. Gay, 1845, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 3, 4: 33.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (Лазьков, Зернов в Зернов, Соколов, 2004: 109): «Ех sabulosis deserti Cumani, a. 1798 [Bieberstein]» (LE!).

ЗП: З. Ставр.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., **ЮЗ:** Ерев., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

* Г. А. Лазьков.

Указан для **ВП**: В. Ставр., Тер.-Кум. (Галушко, 1978: 242); **ЗЗ**: Рион.-Квир.; **ВЗ**: Н. Кур. (Гроссгейм, 1945: 199); **ЮЗЗ**: Месх., Джав.-В. Ах. (Гвиниашвили, 1978: 63), Араг. (Гроссгейм, 1945: 199).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. Азия.

2 (380). **H. marginatum** С. А. Мей. 1838, Bull. Soc. Nat. Moscou, 11: 402.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (Лазьков, Зернов в Зернов, Соколов, 2004: 109): «Dürre Stellen um Helenendorf [Hohenacker]» (LE!).

ЦК: В. Кум.; **ВК**; **ЗЗ**: Рион.-Квир.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ЮЗЗ**: Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ**: Ерев., Севан., Дар., Нах., Ю. Караб.; **Т**:

Юго-Зап. (Турция, Иран) Азия.

3 (381). **H. umbellatum** L. 1753, Sp. Pl.: 88

Описан по гербарным материалам из Европы (Германия, Франция). *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 1993: 54): Herb. Bergius, «4 umbellatum» [specim. basal.] (SBT).

ЗП; **ВП**; **ЗК**; **ЦК**; **ВК**; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗ**: Ерев., Нах.

Указан для **ЗЗ**: Рион.-Квир.; **ВЗ**: Иорск.-Шек., Караб. (Гроссгейм, 1945: 198).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (от Турции и Ирака до Пакистана), Ср., Центр., Южн. (вост. Пакистан) Азия.

16 (69). **Myosoton** Moench*

1 (382). **M. aquaticum** (L.) Moench, 1794, Methodus: 225. — *Cerastium aquaticum* L. 1753, Sp. Pl.: 439. — *Malachium aquaticum* (L.) Fries, 1817, Fl. Halland.: 78.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 1994: 156): Herb. Linn. 603.23 (LINN).

ЗП; **ВП**: В. Ставр.; **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК**: В. Кум.; **ВК**; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Лори.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич.; **Т**:

Указан для **ВП**: Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЗК**: Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1978: 237), В. Куб. (Гроссгейм, 1945: 184); **ЦК**: Малк. (Галушко, 1978: 237); **ЦЗ**: Триал.-Н. Карт.; **ЮЗ**: Занг., Мегр.-Зан. (Гроссгейм, 1945: 184).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран, Пакистан), Ср., Вост., Южн. (вост. Пакистан) Азия; Сев. Америка (заносное).

17 (70). **Minuartia** L.*

Sect. 1. **Acutiflorae** (Fenzl) Hayek

1 (383). **M. biebersteinii** (Rupr.) Schischk. 1929, Журн. Никитск. бот. сада, 10, 2: 38. — *Alsine biebersteinii* Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 215 (Fl. Cauc.).

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (McNeill, 1963: 345): «Caucasus, Ossetia, districtus Alagir, pr. Sadon, 620 hex., 21 V 1861, Ruprecht» (LE!).

* Г. А. Лазьков.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.

Указан для **ЗЗ:** Абх. (Колаковский, 1980: 164), Адж. (Дмитриева, 1960: 317).

Эндемик.

2 (384). **M. lineata** (Boiss.) Bornm. 1910, Beih. Bot. Centralbl. 27, 2: 318. — *Alsine juniperina* Fenzl *ε. lineata* Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 677. — *Arenaria lineata* C. A. Mey. ex Fenzl, 1842, in Ledeb. Fl. Ross. 1: 351, nom. nud., in syn. — *Minuartia armena* Schischk. 1956, Фл. Арм. 2: 57, 62, nom. inval., descr. ross. — *M. daralagezica* Schischk. 1956, цит. соч.: 57, 62, nom. inval., descr. ross. — *M. armena* Schischk. ex Ikonn. 1996, Бот. журн. 81, 6: 102. — *M. daralagezica* Schischk. ex Ikonn. 1996, Бот. журн. 81, 6: 102.

Описан по гербарным материалам с Кавказа, из Турции, Ирана и Средней Азии. *Lectotypus* (McNeill, 1963: 346): «*Alsine lineata* mihi, montes Talüsch, Meyer» (LE!).

ЗЗ: Адж.; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ВК:** Ассо-Арг. (Очиаури, 1981: 56); **ЮЗ:** Занг., Мегр.-Зан. (Гроссгейм, 1945: 210).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

По-видимому, указан для **ВК** ошибочно.

3 (385). **M. subuniflora** (Albov) Woronow, 1914, в Фомин и Воронов, Опред. раст. Кавк. и Крыма, 2, 2: 178. — *Alsine subuniflora* Albov, 1895, Мат. фл. Колх.: 35.

Описан из Абхазии («*Nab. in Abchasia: in lapidosis jugi calcarei Aossakwashera prope m. Kutush, alt. 2500–2600 m (N. A. 1894, № 49)*»).

ЗЗ: Абх.

Эндемик

Sect. 2. **Lanceolatae** (Fenzl) Graebn.

4 (386). **M. acuminata** Turrill, 1929, Kew Bull.: 225. — *M. dianthifolia* auct. non (Boiss.) Hand.-Mazz.: Шишк. 1936, Фл. СССР, 6: 499; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 209; Карягин, 1952, Фл. Азерб. 3: 301; Шишк. и В. Е. Авет. 1956, Фл. Арм. 2: 62.

Описан из Ирана («*N. Persia: Mishou Dagh, 19th July 1928, Gilliat-Smith 2374*»).

ЮЗ: Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

Sect. 3. **Minuartia**

5 (387). **M. akinfiewii** (Schmalh.) Woronow, 1914, в Фомин и Воронов, Опред. раст. Кавк. и Крыма, 2, 2: 176. — *Alsine akinfiewii* Schmalh. 1892, Ber. Deutsch. Bot. Ges. 10: 287.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (McNeill, 1963: 356): «Боржом, 5000 футов, 28 VI 1888 [И. Акинфиев]» (LE!).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ВЗ:** Караб. (Гроссгейм, 1945: 206); **ЮЗ:** Ерев. (Нерсесян, 1999: 56) Эндемик.

6 (388). **M. glomerata** (Bieb.) Degen, 1910, in Fritsch, Mitt. Naturw. Ver. Steierm. 46: 319. — *Arenaria glomerata* Vieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 350.

Описан из Крыма. *Lectotypus* (McNeill, 1963: 384): «Ex Tauria, a. 1795» (LE!).

СЗЗ: Анап.-Гел.

Юго-Вост. Европа.

7 (389). **M. intermedia** (Boiss.) Hand.-Mazz. 1912, Ann. Naturh. Mus. (Wien), 26: 148. — *Alsine intermedia* Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 685.

Описан из Турции. *Lectotypus* (McNeill, 1963: 361): «Turkey, Cilicia, ad pylas Cilicicas (Defile des Portes Ciliciennes), 23 VI 1855, № 598, Balansa» (G; *isolecotypus* — BM, JE, K).

ЮЗ: Занг., Мегр.-Зан.

Указан для **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗ:** Ю. Караб. (Гроссгейм, 1945: 206).

Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Ирак, Иран).

Не исключено, что *M. intermedia* является гибридом между *M. wiesneri* (Stapf) Schischk. и *M. meyeri* (Boiss.) Bornm.

8 (390). **M. meyeri** (Boiss.) Bornm. 1919, Beih. Bot. Centralbl. 27, 2: 318. — *Alsine meyeri* Boiss. 1849, Diagn. Pl. Or. sér. 1, 8: 96.

Описан с Кавказа и из Сирии. *Lectotypus* (Rechinger, 1988: 44): «Talish, Swant, R. F. Hohenacker» (G-BOIS).

ЮЗ: Ерев., Севан., Нах., Мегр.-Зан.; **Т:**

Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран), Ср. Азия.

9 (391). **M. setacea** (Thuill.) Hayek, 1908, Fl. Steiermark, 1: 271. — *Arenaria setacea* Thuill. 1799, Fl. Env. Paris, ed. 2: 220. — *Minuartia anatolica* (Boiss.) Woronow, 1914, in Woronow et Schelk. Sched. Herb. Fl. Cauc. 4: 92. — *M. buschiana* Schischk. 1936, Фл. СССР, 6: 884, 493. — *M. micrantha* Schischk. 1936, цит. соч.: 884, 494. — *M. woronowii* Schischk. 1936, цит. соч.: 884, 495. — *M. abchasica* Schischk. 1936, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 3: 170.

Описан из Франции.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК;** **ВК:** Ассо-Арг.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион.;

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Нах.

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд., Караб (Гроссгейм, 1945: 207, 208).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

Вид изменчив по величине чашечки, длине лепестков, опушению, скульптуре семян, поэтому нами не были признаны таксоны, указанные в синонимике.

10 (392). **M. sclerantha** (Fisch. et C. A. Mey.) Thell. 1912, Mém. Soc. Nat. Sci. Math. Cherbourg, 38: 231. — *Alsine sclerantha* Fisch. et C. A. Mey. 1838, in Hohen. Bull. Soc. Nat. Moscou, 11: 400.

Описан с Кавказа. Lectotypus (McNeill, 1963: 365) «Prope Helenendorf, Hohenacker» (LE!).

БК: Ман.-Самур.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Юго-Зап. Азия (Турция, Ирак, Иран).

11 (393). **M. wiesneri** (Stapf) Schischk. 1936, Фл. СССР, 6: 490. — *Alsine wiesneri* Stapf, 1886, Denkschr. Akad. Wiss. Math.-Naturw. Kl. (Wien), 51: 20.

Описан из Ирана. Lectotypus (McNeill, 1963: 359): «Rudbar, 1882, Pichler» (WU).

БК: Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЮЗ:** Ерев. (Тахтаджян, Фёдоров, 1972).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

Sect. 4. **Plurinerviae** McNeill

12 (394). **M. oreina** (Mattf.) Schischk. 1929, Изв. Томск. унив. 80: 433. — *M. hirsuta* Hand.-Mazz. subsp. *oreina* Mattf. 1922, Feddes Repert. (Beih.), 15: 114, 118. — *M. recurva* (All.) Schinz et Thell. subsp. *oreina* (Mattf.) McNeill, 1963, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 24, 3: 338.

Описан из Турции и Ирана. Lectotypus (McNeill, 1963: 318): «Turkey, Kurdistan, Taurus Armenus, in monte Meleto (Meretug) Dagh districtus Bitlis, in lapidosis circa cacumen, substrato calcareo, ca 2900–3100 m, 11 VIII 1910, № 2758, Handel-Mazzetti» (WU).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **БК;** **ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ;** **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ;** **Т:**

Указан для всех горных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 243); **ЗЗ:** Абх. (Гроссгейм, 1945: 208).

Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, Ирак, Иран).

Не вполне ясны отличия этого вида от *M. recurva*. Весь комплекс *M. recurva* требует специального исследования.

Sect. 5. **Sabulina** (Rchb.) Graebn.

13 (395). **M. hybrida** (Vill.) Schischk. 1936, Фл. СССР, 6: 488. — *Arenaria hybrida* Vill. 1779, Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 48. — *A. tenuifolia* L. 1753, Sp. Pl.: 424. — *Minuartia tenuifolia* (L.) Hiern, 1889, Journ. Bot. (London), 37: 321, non Nees ex Mart. 1814. — *M. turcomanica* Schischk. 1936, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 3: 168; Шишк. 1936, цит. соч.: 487. — *M. viscosa* auct. non Schinz et Thell.: Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 204; Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1: 243.

Описан по гербарным материалам из Европы.

ЗП: Аз.-Куб.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **БК:** Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мегр.-Зан.; **Т:**

Указан для **ЗП**: З. Ставр. (Гроссгейм, 1945: 208); **ЗЗ**: Адж. (Дмитриева, 1960: 316); **ВЗ**: Иорск.-Шек. (Гроссгейм, 1945: 204).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (от Ирана и Ирака до Пакистана), Ср., Южн. (вост. Пакистан) Азия.

14 (396). **M. regeliana** (Trautv.) Mattf. 1921, Bot. Jahrb. Syst. 57, 2: 29. — *Alsine tenuifolia* Crantz var. *regeliana* Trautv. 1860, Bull. Soc. Nat. Moscou, 33: 156.

Описан из Казахстана. *Л е с т о т у р у с* (Лазьков, 2006: 53): «Tersakan..., 30 VI 1840 [A. Schrenk]» (LE!).

Указан для **ВЗ** (Шишкин, 1936: 489; Цвелёв, 2004: 200).

Ср. Азия.

Никакого материала из Закавказья я не видел. По-видимому, следует согласиться с мнением А. А. Гроссгейма (1945: 316) об отсутствии данного вида на Кавказе.

Sect. 6. **Spectabiles** (Fenzl) Hayek

Subsect. 1. **Laricifoliae** (Mattf.) McNeill

15 (397). **M. aizoides** (Boiss.) Bornm. 1914, Beih. Bot. Centralbl. 31, 2: 193. — *Alsine aizoides* Boiss. 1842, Diagn. Pl. Or. sér. 1, 1: 47.

Описан из Турции. *Л е с т о т у р у с* (McNeill, 1963: 329): «In Alpibus Armeniae, № 589, Aucher-Eloy» (G; isolectotypus — K).

ВП: В. Ставр., Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЗК**: В. Куб.; **ЦК**: Малк., В. Тер.; **ВК**; **ЗЗ**: Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ**: Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич.; Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ**: Араг.; **ЮЗ**: Ерев., Севан., Нах.

Указан для **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЗЗ**: Рион.-Квир., **ЦЗ**: Триал.-Н. Карг.; **ЮЗЗ**: Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ**: Занг., Ю. Караб. (Гроссгейм, 1945: 210).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

16 (398). **M. circassica** (Albov) Woronow, 1914, в Фомин и Воронов, Опред. раст. Кавк. и Крыма, 2, 2: 181. — *Alsine circassica* Albov, 1894, Bull. Herb. Boiss. 2: 449. — *A. caucasica* Adams ex Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 203 (Fl. Cauc.), non Boiss. 1853. — *Minuartia caucasica* (Adams ex Rupr.) Mattf. 1919, in Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 5, 1: 941.

Описан с Кавказа («Circassie: Mont Ochten, 8000 p. (N. Alboff 1893. Exs. № 298)»).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**; **ВК**; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич.; Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах.; **ЮЗ**: Ерев., Севан., Занг., Ю. Караб.

Указан для всех горных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 244); **ЦЗ**: Триал.-Н. Карг., Лори.; **ЮЗЗ**: Месх. (Гроссгейм, 1945: 210).

Юго-Зап. Азия (Турция).

Subsect. 2. **Spectabiles**

17 (399). **M. rhodocalyx** (Albov) Woronow, 1914, в Фомин и Воронов, Опред. раст. Кавк. и Крыма, 2, 2: 180. — *Alsine rhodocalyx* Albov, 1894, Bull. Herb. Boiss. 2: 255.

Описан с Западного Кавказа. Lectotypus (McNeill, 1963: 325): «Transcaucasia. Plantes du district Tschernomorsky (Province de la Mer Noire). Mt. Fichte paturages alpine, 14 IX 1893, № 479, N. Alboff» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб.; **ЗЗ:** Абх.

Эндемик.

18 (400). **M. pseudoimbricata** Lazkov, 2010, Бот. журн. 95, 10: 1481. — *Alsine imbricata* Bieb. f. *glandulosa* Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math), sér. 7, 15, 2: 207 (Fl. Cauc.).

Описан с Кавказа («versus m. Elbrus in rup. alp.»). Lectotypus (Лазьков, 2010: 1481): «In rupibus mont. ad fl. Malka, 13 VII» (LE!).

ЦК: Малк.

Указан для **ЦК:** В. Тер. (Харадзе, 1938: 201).

Эндемик.

От *M. rhodocalyx* отличается зеленоватой чашечкой и тремя столбиками.

19 (401). **M. imbricata** (Bieb.) Woronow, 1914, в Фомин и Воронов, Опред. раст. Кавк. и Крыма, 2, 2: 180. — *Arenaria imbricata* Bieb. 1808, Fl. Taur-cauc. 1: 344. — *Minuartia colchica* Charadze, 1938, Тр. Тбил. бот. инст. 2: 206.

Описан с Кавказа. Lectotypus (McNeill, 1963: 328): «Ex alpinis Caucasie, Kobi, 1802» (LE!).

ЗК: Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Нах., Мегр.-Зан.

Указан для **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЗЗ:** Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах. (Гроссгейм, 1945: 211, 212).

Юго-Зап. Азия (Турция).

20 (402). **M. inamoena** (C. A. Mey.) Woronow, 1914, в Фомин и Воронов, Опред. раст. Кавк. и Крыма, 2, 2: 180. — *Arenaria inamoena* C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 218.

Описан с Кавказа. Lectotypus (McNeill, 1963: 326): «In summis alpinis Elborus (alt. 9500 p.), 10 VII 1829 [C. A. Meyer]» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.

Указан для **ВК:** Ассо-Арг.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Гроссгейм, 1945: 212).

Эндемик.

M. inamoena в типичной форме хорошо отличается от *M. imbricata*, однако встречаются промежуточные растения, имеющие форму и длину лепестков почти как у *M. inamoena*, но часто более жесткое опушение чашечки (*M. imbricata* f. *hirsuta* Rupr. — *M. inamoena* var. *hirsuta* (Rupr.) Charadze).

21 (403). **M. brotherana** (Trautv.) Woronow, 1914, в Фомин и Воронов, Опред. раст. Кавк. и Крыма, 2, 2: 179. — *Stellaria brotherana* Trautv. 1882, Increm. Fl. Phaen. Ross. 1: 129. — *Arenaria brotherana* Trautv. 1883, Тр. Петерб. бот. сада, 8: 151. — *Minuartia ruprechtiana* Charadze, 1938, Тр. Тбил. бот. инст. 2: 208. — *M. trautvetteriana* Sosn. et Charadze, 1938, Тр. Тбил. бот. инст. 2: 210.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (Лазьков, 2010: 1482): «Ossetia, in alpe Kad-lasen, pr. fl. Didi Liachva, 20 VII 1881, A. H. et V. F. Brotherus» (LE!).

ЦК: Малк., В. Тер.; **ЗЗ:** Инг.-Рион.

Указан для **ВК:** В. Сулак. (Гуссейнов, 1990: 236).

Эндемик.

Вероятно, указан для **ВК** ошибочно.

По-видимому, *M. brotherana* — сильно дернистая высокогорная форма *M. imbricata*.

22 (404). **M. charadzeae** Lazkov, 2010, Бот. журн. 95, 10: 1481. — *Alsine imbricata* Bieb. f. *obtusifolia* Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 207 (Fl. Сауc.). — *Minuartia ruprechtiana* Charadze, 1938, Тр. Тбил. бот. инст. 2: 208, р. p., quoad descr., excl. syn. *Stellaria brotherana* et *Alsine brotherana*. — *Stellaria brotherana* auct. non Trautv.: Харадзе, 1938, Тр. Тбил. бот. инст. 2: 208. — *Minuartia brotheriana* auct. non (Trautv.) Woronow: Харадзе, 1938, цит. соч.: 208; она же, 1978, Фл. Груз. изд. 2, 4: 81.

Описан с Кавказа («in rupib. subalp. Kobi»). *Lectotypus* (Лазьков, 2010: 1481): «In rupib. m. ... Kchele pr. Kobi, Hohenacker» (LE!).

ЗК: Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Тер.; **ВК;** **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.; Ширв.

Эндемик.

Номенклатурные и таксономические вопросы, связанные с этим видом, рассмотрены в отдельной работе (Лазьков, 2010).

Sect. 7. **Tryphane** (Fenzl) Hayek

23 (405). **M. verna** (L.) Hiern. 1899, Journ. Bot. (London), 37: 320. — *Arenaria verna* L. 1767, Mantissa Pl. 1: 72.

Описан из Южной Европы. *Lectotypus* (Halliday, 1964: 12): Herb. Linn. 585.30 (LINN).

ЦК: Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел., Пшад.-Джубг.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос; **ЮЗЗ:** Месх.

Указан для всех горных районах Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 244); **ЗК:** Бело-Лаб. (Гроссгейм, 1945: 210), Уруп-Теб. (Воробьева, Онопченко, 2001: 36), В. Куб.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг. (Очиаури, 1981: 56), Кубин. (Гроссгейм, 1945: 210); **ЗЗ:** Абх. (Колаковский, 1980: 167), Адж. (Дмитриева, 1960: 317), Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах. (Гроссгейм, 1945: 210),

Европа; Средиз.; Сев., Ср., Центр., Вост. Азия.

18 (71). **Queria** L.*

1 (406). **Q. hispanica** L. 1753, Sp. Pl.: 90. — *Scleranthus hamatus* Hausskn. et Bornm. 1891, Mitt. Geogr. Ges. Thür. Jena, 9: 17. — *Minuartia hamata* (Hausskn. et Bornm.) Mattf. 1921, Bot. Jahrb. Syst. 57, 2: 29.

* Г. А. Лазьков.

Описан из Испании.

ВП: Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ;** **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг. (Галушко, 1978: 242); **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах. (Гвиниашвили, 1978: 74); **ЮЗ:** Севан., Дар. (Гроссгейм, 1945: 202).

Атл., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Ирак, Иран), Ср. Азия.

19 (72). *Sagina* L.*

Sect. 1. *Sagina*

1 (407). *S. apetala* Ard. 1764, Animadv. Bot. Spec. Alt. 2: 22; Гвин. 1978, Фл. Груз. изд. 2, 4: 67. — *S. ciliata* Fries, 1816, in Lilj. Utkast Sv. Fl. ed. 3: 713. — *S. oxyssepala* Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 663; Штейнб. 1936, Фл. СССР, 6: 475; Гвин. 1978, цит. соч.: 68.

Описан по культивированным растениям неизвестного происхождения. *Le ct o t y p u s* (Crow, 1978: 73); Herb. Linn. 177.2 (LINN).

ЗЗ: Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ВЗ:** Ширв.; **Т:**

Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Иран, Турция).

Как *S. apetala* разными авторами определялись растения как с отогнутыми при плодах, более притупленными, эллиптическими, так и прижатыми к коробочке, яйцевидно-ланцетными, заостренными чашелистиками. Судя по протологу (Arduino, 1764), именно последние должны относиться к *S. apetala*. Противоположного мнения придерживался Р. Е. Boissier (1867), поэтому он и описал вид *S. oxyssepala*.

2 (408). *S. procumbens* L. 1753, Sp. Pl.: 128.

Описан из Европы. *Le ct o t y p u s* (Jonsell, Jarvis, 1993: 83); [Icon] J. F. Séguier, 1754, Pl. Veronensis, 1: 421, tab. 5, fig. 5.

ЗП: З. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Тер.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗ:** Севан., Нах.

Указан для **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг. (Очиаури, 1981: 57); **ЗЗ:** Абх. (Колаковский, 1980: 170), Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрин.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев. (Гроссгейм, 1945: 200).

Европа; Средиз.; Вост. Азия; Сев. Америка.

Для точного установления видовой принадлежности необходимы дополнительные сборы вида из районов **ЦК:** В. Тер. («Терская область, окрестности Владикавказа, левый берег Терка у лесной Караулки, на выгоне, 5 VI 1916, Н. Введенский»); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. («Местность Эрмани по дороге к Дигору 2 VIII 1938, Е. В. Шмидт; [там же] на берегу Эрмани-дон, против села Хсэнаг кау, 4 VII 1938, И. Абрамов»). Изученные нами образцы из указанных районов обладают железисто опушенными цветоножками и чашелистиками, что приближает их к испанскому *S. nevadensis* Boiss.

3 (409). *S. saginoides* (L.) H. Karst. 1882, Deutsche Fl.: 539. — *Spergula saginoides* L. 1753, Sp. Pl.: 441.

* Г. А. Лазыков.

Описан из Европы и Сибири. *Lectotypus* (Crow, 1978: 34): Herb. Linn. 604.6 (LINN).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **БК;** **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Указан для всех высокогорных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 242);

ЮЗ: Севан. (Гроссгейм, 1945: 200).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Ирак, Иран), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

Sect. 2. **Spargella** (Rchb.) W. D. J. Koch

4 (410). **S. nodosa** (L.) Fenzl, 1833, Vers. Darstell. Alsin.: tab. ad p. 18. — *Spergula nodosa* L. 1753, Sp. Pl.: 440.

Описан по гербарным материалам из Европы. *Lectotypus* (Crow, 1978: 25): Herb. Linn. 604.4 (LINN).

ЦК: В. Тер.; **БК:** В. Сулак.

Европа; Сев. Азия; Сев. Америка (заносное).

Нахождение на Кавказе этого вида вызывает сомнение, так как имеются только старые, никем не повторенные сборы Лаговского, этикетки которого, к сожалению, не всегда достоверны.

Trib. 2. **Scleranthae** Link ex DC.

20 (73). **Scleranthus** L.*

1 (411). **S. annuus** L. 1753, Sp. Pl.: 406.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 1993: 86): Herb. Linn. 578.1 (LINN).

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставро., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК;** **БК;** **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ;** **ВЗ;** **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЗП:** З. Ставро.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 247); **ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ЮЗ:** Севан. (Гроссгейм, 1945: 220).

Европа; Средиз.; Юго-Зап., Вост. (заносное) Азия; Сев. Африка.

2 (412). **S. polycarpus** L. 1756, Cent. Pl. 2: 17.

Описан по гербарным материалам из Франции и Италии. *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 1994: 158): Herb. Linn. 578.3 (LINN).

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП;** **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум.; **БК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ;** **ЮЗ:** Нах., Занг., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЦК:** Малк.; **БК:** Кубин.; **ЗЗ:** Рион.-Квир. (Гроссгейм, 1945: 220), Адж. (Дмитриева, 1960: 318); **ЮЗ:** Севан. (Гроссгейм, 1945: 220).

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **БК:** Ассо-Арг. (Галушко, 1978: 247).

Европа; Средиз.

* Г. А. Лазьков.

3 (413). **S. uncinatus** Schur, 1850, Verh. Mitt. Siebenb. Ver. Naturw. 1, 7: 107.

Описан из Европы.

ЗК: Бело-Лаб.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос., Лори.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Дар., Нах., Мегр.-Зан.; **Т:**

Указан для **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг. (Очиаури, 1981: 57); для всех горных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 247); **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Гроссгейм, 1945: 220), Абх. (Колаковский, 1980: 172); **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Занг. (Гроссгейм, 1945: 220).

Центр., Юго-Вост. Европа.

4 (414). **S. perennis** L. 1753, Sp. Pl.: 406.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 1994: 158): Herb. Linn. 578.2 (LINN).

ЗЗ: Рион.-Квир., Адж.; **ЮЗЗ:** Месх.

Указан для **ЮЗЗ:** Араг. (Гроссгейм, 1945: 220); **ЗЗ:** Абх. (Гвинианидзе, 1978: 210). Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция).

Subfam. 3. CARYOPHYLLOIDEAE Arn.

Trib. 1. **Caryophylleae** Lam. et DC.

21 (74). **Acanthophyllum** C. A. Mey.*

Sect. 1. **Acanthophyllum**

1 (415). **A. mucronatum** C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 210.

Описан из Талыша. *Lectotypus* (Schiman-Czeika, 1988: 280): «In locis lapidosis aridis prope pagum Swant, 22 VI 1830 [C. A. Meyer]» (LE!).

ЮЗ: Ерев., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. (Туркменистан) Азия.

Sect. 2. **Oligosperma** Schiman-Czeika

2 (416). **A. squarrosus** Boiss. 1853, Diagn. Pl. Or. sér. 2, 1: 81.

Описан из Ирана и Пакистана. *Lectotypus* (Schiman-Czeika, 1988: 302): «In collibus aridis pr. u. Schiras, 30 V 1812 [?1842], № 440, Th. Kotschy» (G; *isolecotypi* — LE (2)!, P, WU).

ЮЗ: Нах.

Юго-Зап. Азия (Иран, Афганистан).

22 (75). **Allochrusa** Bunge*

1 (417). **A. bungei** Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 561.

* Г. А. Лазыков.

Описан из Ирана. *Lectotypus* (Schiman-Czeika, 1988: 250): «Inter Marand et Djulfa, A. Bunge» (G; *isolectotypus* — LE!).

ЮЗ: Ерев.

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

2 (418). **A. takhtajanii** Gabrieljan et Dittrich, 1990, Биол. журн. Арм. 43, 3: 184.

Описан из Армении. *Turpus*: «Армения, Араратский район, нижний пояс Урцского хребта близ деревни Суренаван, на сухих каменистых склонах, среди фриганоидной растительности, 800 м над ур. м., 20 VI 1986, Э. Габриэлян, К. Таманян» (ERE (№ 137897); *isotypi* — G, LE (fragm.!).

ЮЗ: Ерев.

Эндемик.

3 (419). **A. versicolor** (Fisch. et C. A. Mey.) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 560. — *Acanthophyllum versicolor* Fisch. et C. A. Mey. 1837, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 4: 31.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (Schiman-Czeika, 1988: 249): «Armenia rossica, pr. Nachitschevan, in lapidosis aridissimis in eremo salso, 12 VI 1829, № 393, Szovits» (LE!).

ЮЗ: Ерев., Дар., Нах.

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

23 (76). **Gypsophila** L.*

Subgen. 1. **Dichoglottis** (Fisch. et C. A. Mey.) Peterm.

Sect. 1. **Dichoglottis** (Fisch. et C. A. Mey.) Boiss.

1 (420). **G. szovitsiana** Lazkov, 2010, Бот. журн. 95, 10: 1485. — *G. szovitsii* Fisch. et C. A. Mey. ex Fenzl, 1842, in Ledeb. Fl. Ross. 1: 289, nom. illeg., superfl., p. p., quoad *α. glabrata* Fenzl, excl. *β. glandulosa* Fenzl. — *G. diffusa* auct. non Fisch. et C. A. Mey. ex Rupr.: Шишк. 1936, Фл. СССР, 6: 453, p. p., quoad pl. ex Transcauc.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (Barkoudah, 1962: 132): «In prov. Karabagh legit... Hohenacker» (LE!).

ВЗ: Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Ю. Караб.

Эндемик.

При описании *G. szovitsii* Fisch. et C. A. Mey. ex Fenzl приведены 2 разновидности: *α. glabrata* Fenzl и *β. Glandulosa* Fenzl, при этом в синонимах второй из них стоит название *Dichoglottis linearifolia* Fisch. et C. A. Mey., поэтому название *G. szovitsii* становится излишним.

Sect. 2. **Elegantes** Ikonn.

2 (421). **G. elegans** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 319.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (Barkoudah, 1962: 135): «Terek ad Kasbek» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.**

* Г. А. Лазыков.

Указан для всех горных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 260).
Центр. (заносное), Южн. (заносное), Юго-Вост., Вост. (заносное) Европа;
Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. (Туркменистан) Азия; Сев. Америка (заносное).

3 (422). **G. heteropoda** Freyn, 1903, Bull. Herb. Boiss. sér. 2, 3: 865. — *G. nanella* Grossh. 1924, in Grossh. et Schischk. Sched. Herb. Pl. Or. Exs. 1: 5.

Описан из Туркменистана. Л е с т о т у р у с (Barkoudah, 1962: 128): «Turkmenia, Ashkhabad, Neftonska, № 423, Sint.» (W; isolectotypi — BM, E, K, L, LE!).

БК: Ман.-Самур.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.; **Т:**

Указан для **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах. (Гроссгейм, 1945: 271).

Юго-Зап. Азия (Турция, Ирак, Иран, Афганистан).

4 (423). **G. silenoides** Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 182 (Fl. Cauc.).

Описан с Кавказа. Л е с т о т у р у с (Barkoudah, 1962: 135): «VI 1830, № 158, Szovits» (LE!; isolectotypi — K, L, P).

ЗЗ: Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **?ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.

Юго-Зап. Азия (Турция).

Из районов **ЗК** собраны только верхние части растений, поэтому они определены как *G. silenoides* с вопросом. Необходимы дополнительные сборы, чтобы выяснить, встречается ли данный вид в **ЗК**.

Subgen. 2. **Gypsophila**

Sect. 1. **Capituliformes** F. N. Williams

5 (424). **G. capitata** Vieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 321.

Описан с Кавказа. Л е с т о т у р у с (Barkoudah, 1962: 90): «Ex montibus Schirvanensibus, circa Kurt-Bulak» (LE!).

БК; ВЗ: Ширв., Н. Кур.

Эндемик.

6 (425). **G. glomerata** Adams, 1805, in Weber u. Mohr, Beitr. Naturk. 1: 54.

Описан с Кавказа («Habitat ad thermas Constantinomontanas»).

ЗП; ВП: В. Ставр.; **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум.

Указан для **ЗК:** В. Куб. (Галушко, 1978: 259).

Юго-Вост., Вост. Европа.

7 (426). **G. pallasii** Иконн. 1976, Новости сист. высш. раст. 13: 118. — *G. glomerata* Vieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 321, non Adams, 1805.

Описан по гербарным материалам из Крыма и с Кавказа. Л е с т о т у р у с (Иконников, 1976: 118). «Ex Tauria et Caucaso rutheno, образец № 1» (LE!).

СЗЗ: Анап.-Гел.

Указан для **ЗП:** З. Ставр. (Гроссгейм, 1945: 265).

Юго-Вост. Европа.

По-видимому, указания относятся к предыдущему виду.

Sect. 2. **Corymbosae** Barkoudah

Subsect. 1. **Caespitosae** (Boiss.) Barkoudah

8 (427). **G. tenuifolia** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 319.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (Barkoudah, 1962: 86): «*Ex alpinus Caucasica, Kasbek*» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Занг., Ю. Караб.

Юго-Зап. Азия (Турция).

9 (428). **G. steupii** Schischk. 1928, Candollea, 3: 473.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (Barkoudah, 1962: 86): «Сочинский район, долина реки Мзымта, теснина Ахуу, известняки, 29 V 1925, В. Штейн» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб.; **ЗЗ:** Абх.

Эндемик.

Близок *G. tenuifolia*, но отличается каудексом без сохраняющихся остатков листьев.

Subsect. 2. **Plumosae** F. N. Williams

10 (429). **G. altissima** L. 1753, Sp. Pl.: 407.

Описан из Сибири. *Lectotypus* (Lazkov in Cafferty, Jarvis, 2004: 1052): *Herb. Linn. 579.10 (LINN!)*

Указан для **ВП:** В. Ставр. (Галушко, 1978: 262), Тер.-Кум.; **ВК:** В. Сулак. (Гроссгейм, 1945: 266).

Вост. Европа; Сев., Центр. Азия.

Гербарного материала по этому виду с изученной территории я не видел.

Sect. 3. **Paniculaeformes** F. N. Williams

Subsect. 1. **Paniculaeformes**

11 (430). **G. bicolor** (Freyn et Sint.) Grossh. 1919, Вестн. Тифл. бот. сада, 46–47: 60. — *G. paniculata* L. subsp. *bicolor* Freyn et Sint. 1903, Bull. Herb. Boiss. sér. 2, 3: 864.

Описан из Туркмении. *Lectotypus* (Barkoudah, 1962: 96): «Turkmenia, Ashkhabad, Neftonska, № 423, Sint.» (W; *isolectotypi* — E, L).

ЗП: Аз.-Куб.; **ВК:** Ман.-Самур.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.; **Т.**

Указан для **ВК:** Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Занг., Ю. Караб. (Гроссгейм, 1945: 266).

Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. (Туркменистан) Азия.

12 (431). **G. paniculata** L. 1753, Sp. Pl.: 407.

Описан по гербарным материалам из Сибири и Восточной Европы. *Lectotypus* (Barkoudah, 1962: 95): *Herb. Linn. 579.5 (LINN)*.

ЗП; ВП; ЗК: Бело-Лаб.; **ЦК:** Малк.; **ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх.; **ВЗ:** Ширв.; **Т.**

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап. (Турция), Ср. Азия; Сев. Америка (заносное).

Subsect. 2. **Acutifoliae** Barkoudah

13 (432). **G. acutifolia** Fisch. ex Spreng. 1818, Novi Provent. Hal. Berol.: 21. — *G. stevenii* Fisch. ex Schrank, 1819, Pl. Rar. Hort. Monac.: 32, tab. 32. — *G. glauca* Steven ex DC. 1824, Prodr. 1: 353. — *G. albida* Schischk. 1928, Candollea, 3: 474.

Описан с Кавказа (sphalm. «Habitat in Russia meridionale»). Neotypus (Barkoudah, 1962: 101): «Georgia» (B-WILLD).

ЗК: Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Ю. Караб.

Указан для **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Ширв.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Занг. (Гроссгейм, 1945: 268, 269).

Эндемик.

14 (433). **G. meyeri** Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 118 (Fl. Cauc.).

Описан с Кавказа. Lectotypus (Barkoudah, 1962: 102): «In collibus ad fluvium Kuban, 17 VII 1829, Meyer» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.

Эндемик.

Отличается от близкого вида *G. acutifolia* почти линейными листьями, утолщенными ветвями каудекса, несущими укороченные вегетативные побеги, формирующие, по-видимому, подушку.

Subsect. 3. **Trichotomae** F. N. Williams

15 (434). **G. anatolica** Boiss. et Hohen. 1849, in Boiss. Diagn. Pl. Or. sér. 1, 8: 57.

Описан из Турции. Lectotypus (Barkoudah, 1962: 104): «Turkey, Cappadocia, along the Euphrates, № 545, Aucher-Eloy» (G-BOIS; isolectotypi — FI, P).

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан.

Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Ирак, Иран).

Отличается от *G. perfoliata* L. относительно меньшей по размеру чашечкой и менее длинными цветоножками, отчего цветки в соцветии более скучены.

16 (435). **G. perfoliata** L. 1753, Sp. Pl. 1: 408. — *G. trichotoma* Wender. 1836, Linnaea, 11: 92.

Описан по гербарным материалам из Испании и с «Востока». Lectotypus (Barkoudah, 1962: 104): Herb. Linn. 579.16 (LINN).

ЗП; ВП: В. Ставр., Тер.-Кум.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.

Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап. (Иран, Турция), Ср. Азия.

17 (436). **G. robusta** Grossh. 1920, Вестн. Тифл. бот. сада, 51: 30. — *G. yorae* Woronow, 1924, Бот. мат. (Ленинград), 5: 62.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (Barkoudah, 1962: 107): «Transcaucasia, Tiflis, prope st. ferr. Vasiani, in lapidosis, 6 VII 1920, A. Grossheim» (TBI; isolectotypi — LE!, TGM).

ЦЗ: Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Н. Кур., Караб.

Эндемик.

Отличия *G. robusta* от *G. scorzonerifolia* Ser. только в опушенных нижних листьях. Судя по изученному изотипу *G. robusta*, верхние листья также голые или почти голые.

18 (437). **G. scorzonerifolia** Ser. 1824, in DC. Prodr. 1: 352.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (Barkoudah, 1962: 105): «Prope Kislar» (G; isolectotypus — LE!).

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЦК:** Малк.; **БК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.

Указан для **ВП:** В. Ставр. (Галушко, 1978: 261).

Центр. (заносное), Вост. Европа.

Subsect. 4. **Suffruticosae** (Boiss.) Barkoudah

19 (438). **G. lipskyi** Schischk. 1928, Candollea, 3: 475.

Описан из Нахичевани. *Lectotypus* (Barkoudah, 1962: 109): «Ганза, 26 VI [18]93, Липский» (LE!; isolectotypus — G).

ЮЗ: Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.

Эндемик.

20 (439). **G. takhtadzhanii** Schischk. ex Ikonn. 1978, Новости сист. высш. раст. 15: 145.

Описан из Армении. *Typus*: «Armenia, Daralagez, prope pagum Arpa, in collibus calcareis, 20 VIII 1938, № 26000, Тахтаджян» (ERE; isotypus (fragm.) — LE!).

ЮЗ: Дар., Нах.

Эндемик.

От *G. lipskyi* отличается более высокими стеблями, малым количеством их остатков на каудексе, обычно более широкими листьями. Встречаются и промежуточные формы.

21 (440). **G. virgata** Boiss. 1842, Diagn. Pl. Or. sér. 1, 1: 13. — *G. transcaucasica* Barkoudah, 1962, Meded. Bot. Mus. Utrecht, 188: 116.

Описан из Ирана. *Lectotypus* (Barkoudah, 1962: 105): «W. Iran, № 547, Aucher-Eloy» (G-BOIS).

ЮЗЗ: Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Нах.

Указан для **ЮЗ:** Ю. Караб. (Гроссгейм, 268).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

Sect. 4. **Excapae** F. N. Williams

22 (441). **G. imbricata** Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 176 (Fl. Cauc.).

Описан из Северной Осетии. *Lectotypus* (Barkoudah, 1962: 57): «Ad fl. Ardon, 420–450 hex., 4 IX 1861, Ruprecht» (LE!).

ЦК: В. Тер.

Указан для **ЗК:** В. Куб. (Галушко, 1978: 261).

Эндемик.

23 (442). **G. pulvinaris** Rech. f. 1979, *Candollea*, 34, 2: 230. — *G. aretioides* auct. non Boiss., р. р., quoad pl. ex Саус.: Шишк. 1936, Фл. СССР, 6: 744; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 264; Карягин, 1952, Фл. Азерб. 3: 353; Шишк. и В. Е. Авет. 1956, Фл. Арм. 2: 166.

Описан из Ирана. *Typus*: «Persia, W. Azerb., Maku, in fissures rupium calc. septentriones versus expositis ad occidentem pagi, 4000 ft, 25 VIII 1971, № 1704, Grey-Wilson et Hewer» (W; isotypi — E, K).

ЮЗ: Нах.

Юго-Зап. Азия (Иран).

G. pulvinaris отличается от *G. aretioides* Boiss. более рыхлой дерновиной и длинными листьями. Ш. А. Гуссейнов (1990: 236) привел *G. aretioides* для **ВК:** В. Сулак., по-видимому, ошибочно. Мы не видели данных материалов и не знаем, к какому виду их можно отнести.

Sect. 5. **Heterochroa** (Bunge) Schischk.

24 (443). **G. glandulosa** (Boiss.) Walp. 1843, *Repert. Bot. Syst.* 2: 774. — *Heterochroa glandulosa* Boiss. 1842, *Diagn. Pl. Or. sér.* 1, 1: 15.

Описан из Турции. *Lectotypus* (Barkoudah, 1962: 105): «Turkey, Wilayet Rize (Lazistan), № 630, Aucher-Eloy» (G; isolectotypi — BM, K, P).

ЗК: В. Куб.; **ЗЗ:** Инг.-Рион.

Юго-Зап. Азия (Турция).

Subgen. 3. **Macrorrhizae** (Boiss.) Pax et K. Hoffm.

Sect. **Macrorrhizae** Boiss.

25 (444). **G. muralis** L. 1753, *Sp. Pl.*: 408. — *G. stepposa* Klokov, 1921, *Журн. Русск. бот. общ.* 6: 137. — *Psammophiliella muralis* (L.) Ikonn. 1976, *Новости сист. высш. раст.* 13: 116. — *P. stepposa* (Klokov) Ikonn. 1976, *цит. соч.*: 117.

Описан по гербарным материалам из Европы. *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 1994: 157): *Herb. Burser XI: 137 (UPS-BURSER)*.

ЗП; ВП: В. Ставр., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Уруп-Теб.; **СЗЗ:** Пшад.-Джубг.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Иорск.-Шек.; **ЮЗ:** Севан.

Указан для всех районов Предкавказья (Галушко, 1978: 260); **ЦК:** В. Кум. (Гроссгейм, 1945: 272).

Европа; Сев., Ср., Центр. Азия; Сев. Америка (заносное).

Subgen. 4. **Pseudosaponaria** F. N. Williams

Sect. **Pseudosaponaria**

26 (445). **G. pilosa** Huds. 1767, Philos. Trans. Roy. Soc. London (Biol.), 56: 252. — *Silene porrigens* Gouan ex L. 1768, Syst. Nat. ed. 12, 3: 230. — *Gypsophila porrigens* (Gouan ex L.) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 557.

Описан по культивированным в Ботаническом саду Челси растениям неизвестного происхождения. *Л е с т о т у р у с* (Barkoudah, 1962: 152): «Cultivated in Chelsea Gardens» (BM).

Указан для **ВЗ**: Караб. (Рупрехт, 1869: 182); **ЮЗ**: Ерев. (Тахтаджян, Фёдоров, 1972: 79), Нах. (Рупрехт, 1969: 182).

Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. Азия.

24 (77). **Vaccaria** Wolf*

1 (446). **V. hispanica** (Mill.) Rauschert, 1965, Wiss. Zeitschr. Univ. Halle, 14: 496; Rauschert, 1966, Feddes Repert. 73, 1: 52. — *Saponaria hispanica* Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: in corrig., № 4. — *S. segetalis* Neck. 1768, Delic. Gallo-Belg. 1: 194, nom. illeg. — *Vaccaria pyramidata* Medik. 1789, Philos. Bot. 1: 96. — *Saponaria vaccaria* L. var. *grandiflora* Fisch. ex Ser. 1824, in DC. Prodr. 1: 365. — *Vaccaria grandiflora* (Fisch. ex Ser.) Jaub. et Spach, 1850, Ill. Pl. Or. 3: tab. 231. — *V. segetalis* (Neck.) Garcke, 1864, in Asch. Fl. Prov. Brandenb. 1: 84.

Описан по культивированным растениям неизвестного происхождения. *Л е с т о т у р у с* (Burt, Lewis, 1952: 342): Herb. Clifford: 166, «*Saponaria* 2» (BM).

ЗП; **ЗК**: Бело-Лаб.; **ЦК**: В. Тер.; **ВК**: В. Сулак.; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ**; **ЮЗЗ**; **ЮЗ**; **Т**.

Указан для всех районов Предкавказья (Галушко, 1978: 262); **ЗК**: Уруп-Теб.; **ЦК**: В. Кум., Малк.; **ЦЗ**: Лори. (Гроссгейм, 1945: 278).

Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср., Вост. (заносное), Южн. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное).

25 (78). **Saponaria** L.*

Subgen. 1. **Saponaria**

Sect. **Saponaria**

1 (447). **S. glutinosa** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 322.

Описан из Крыма. *Л е с т о т у р у с* (Шулц, 1984: 1479): «*Ex Tauria*» (LE!).

ЗП: Аз.-Куб.; **СЗЗ**: Анап.-Гел.

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия; Сев. Африка.

2 (448). **S. officinalis** L. 1753, Sp. Pl.: 408.

Описан из Центральной Европы. *Л е с т о т у р у с* (Шулц, 1984: 1479): Herb. Linn. 580.1 (LINN).

* Г. А. Лазьков.

ЗП; ВП: В. Ставр.; **ЗК; ЦК; ВК:** Ассо-Арг.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Месх.

Указан для **ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак. (Галушко, 1978: 268); **ВК:** Кубин. (Рзазаде, 1952: 386); **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Севан. (Гроссгейм, 1945: 386).

Атл., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

Subgen. 2. **Saporizae** Simmler

Sect. 1. **Parviflorae** (Simmler) V. A. Shultz

3 (449). **S. cerastoides** Fisch. ex C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 212. Описан из Ленкорани. *Lectotypus* (Шулц, 1984: 1480): «Lenkoran, 29 V 1830 [C. A. Meyer]» (LE!).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; **Т:**

Указан для **ЗЗ:** Абх., Адж. (Гвинианидзе, 1978: 206), Рион.-Квир. (Гроссгейм, 1945: 296).

Юго-Зап. Азия (Иран, Турция).

Sect. 2. **Proteinia** Ser.

Subsect. **Bifidae** (Simmler) V. A. Shultz

4 (450). **S. orientalis** L. 1753, Sp. Pl.: 409.

Описан с «Востока». *Lectotypus* (Шулц, 1984: 1481): Herb. Linn. 580.10 (LINN).

ВК; ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ; Т:**

Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. (Туркменистан) Азия.

5 (451). **S. viscosa** C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 212.

Описан из Талыша. *Lectotypus* (Шулц, 1984: 1481): «In campis et collibus siccis lapidosis pr. pagum Swant, 20 VI 1830, № 145 [C. A. Meyer]» (LE!).

ЮЗ: Дар., Нах., Мегр.-Зан.; **Т:**

Юго-Зап. Азия (Турция, Ирак, Иран).

Subgen. 3. **Spanizium** (Griseb.) Lazkov comb. nova.

— *Spanizium* Griseb. 1843, Spic. Fl. Rumel. 1: 180

Typus: Saponaria prostrata Willd. (*Spanizium ocyroides* Griseb.).

Sect. **Spanizium** (Griseb.) Boiss.

6 (452). **S. prostrata** Willd. 1809, Enum. Pl. Horti Berol. 1: 465. — *Spanizium ocyroides* Griseb. 1843, Spic. Fl. Rumel. 1: 180. — *S. prostratum* (Willd.) V. A. Shultz, 1984, Бот. журн. 69, 4: 530.

Описан из Турции. *Lectotypus* (Hedge, 1967: 146): «Cultivated specimen grown at the Berlin Botanic Garden from seed from Galatia» (B-WILLD).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Месх.

Указан для **ЗЗ:** Рион.-Квир.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах. (Гроссгейм, 1945: 296).
Юго-Зап. Азия (Турция).

26 (79). *Dianthus* L.*

Sect. 1. *Armerium* F. N. Williams

1 (453). *D. armeria* L. 1753, Sp. Pl.: 410.

Описан из Европы.

ЗП; ЗК: Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК; ВК:** Ман.-Самур., Кубин.;
СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-
Муровд., Ширв.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Нах.; **Т:**

Атл., Сев., Центр., Южн., Юго-Вост. (Крым), Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап.
Азия (Турция, сев. Иран).

2 (454). *D. pseudarmeria* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 323.

Описан из Крыма. *Le s t o t u r u s* (Kuzmina, 2003: 96): «In Tauria» (LE!).

ЗП: З. Ставр.; **ЗК:** Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** Ассо-Арг.,
В. Сулак., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Зернов, 2006: 259); **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш.
(Галушко, 1978: 263).

Центр., Южн., Юго-Вост. (Крым), Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).

Sect. 2. *Carthusiani* (Boiss.) F. N. Williams

Subsect. 1. *Microlepides* F. N. Williams

3 (455). *D. membranaceus* Borbás, 1876, Österr. Bot. Zeitschr. 26: 125. — *D. rehmannii* Włocki, 1880, Kosmos (Lvov), 5: 494. — *D. pseudobarbatus* Bess. ex Włocki, 1885, Deutsche Bot. Monatsschr. 3, 9: 131. — *D. glabriusculus* auct. non (Kit.) Borbás: Клеопов, 1929, Вісн. Київ. бот. саду, 14: 11.

Описан из Западной Украины.

?**ЗП:** Аз.-Куб.

Центр., Вост. Европа.

Вид *D. rehmannii*, впоследствии относимый самим В. Włocki (1884) в синонимы *D. membranaceus*, описан «с Кавказа», однако среди изученного кавказского материала *D. membranaceus* обнаружен не был.

Subsect. 2. *Carthusianoides* F. N. Williams

4 (456). *D. borbasii* Vandas, 1886, Öesterr. Bot. Zeitschr. 36: 193.

Описан из Украины.

ЗП: З. Ставр.

* М. Л. Кузьмина: секции *Armerium*, *Macrolepides*, *Barbulatum*, *Carthusiani*; А. А. Нерсесян: секции *Dianthus*, *Fimbriati*, *Verruculosi*.

Указан для **ЗП**: Аз.-Куб. (Галушко, 1978: 263; Зернов, 2006: 259); **СЗЗ**: Анап.-Гел. (Зернов, 2006: 259).

Центр., Юго-Вост. (Причерноморье), Вост. Европа; Сев. (Зап. Сибирь), Ср. (сев.-зап.) Азия.

Растения этого вида иногда определяют как *D. pallidiflorus* Ser., так как группа из 2–3 сидячих или почти сидячих цветков *D. pallidiflorus* схожа с немногочетковыми головчатыми соцветиями *D. borbasii*.

5 (457). **D. capitellatus** Klokov, 1952, Фл. УРСР, 4: 659, 617. — *D. borbasii* Vandas subsp. *capitellatus* (Klokov) Tutin, 1963, Feddes Repert. (Beih.), 68: 192. — *D. pseudomembranaceus* Schischk. ex Grossh. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 282.

Описан из Ростовской области.

ЗП: Аз.-Куб.

Юго-Вост. (Причерноморье), Вост. Европа.

6 (458). **D. polymorphus** Vieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 324.

Описан с Кавказа и Нижней Волги («ad Caucasum et ad Wolgam inferiorem»). Neotypus (Kuzmina, 2003: 90): «Ad fl. Kuma, 1885, Krassnow» (LE!).

ЗП; ВП; СЗЗ: Анап.-Гел.

Центр. (юго-вост.), Юго-Вост. (Причерноморье, Крым), Вост. Европа; Ср. (зап.) Азия.

Неотип выделен в связи с тем, что в коллекции Ф. К. Биберштейна (LE — Herb. Vieb) не нашелся правильно определенный Биберштейном образец *D. polymorphus*, имеющий соответствующую этикетку (Kuzmina, 2003: 90).

7 (459). **D. ruprechtii** Schischk. 1930, in Grossh. Фл. Кавк. 2: 433; Шишк. 1936, Фл. СССР, 6: 818, 896. — *D. carthusianorum* L. β. *caucasicus* Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 174 (Fl. Cauc.).

Описан из Дагестана. Т у р u s: «Caucasus orient., Dagestania australis, versus fontes fluvii Samur, pr. Baschmouchach, 1050–1100, 14 VII 1860, Ruprecht» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**: Малк., В. Тер.; **ВК; ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион.; **ЦЗ**: Карг.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ**: Месх.

Эндемик.

Возможно нахождение в прилегающих районах Турции.

8 (460). **D. calocephalus** Boiss. 1845, Diagn. Pl. Or. sér. 1, 6: 23; Nersesian, 2011, Takhtajania, 1: 44.

Описан из западной Турции. Т у р u s: «Roches du Tmoli, supra sardes» (G-BOIS!).

ЦЗ: Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ**: Ерев., Севан., Нах., Мегр.-Зан.

Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия).

Subsect. 3. **Capitati** Fedor.

9 (461). **D. capitatus** Balb. ex DC. 1813, Cat. Pl. Horti Monsp.: 103. — *D. subulosus* Freyn et Conrath, 1895, Bull. Herb. Boiss. 3, 2: 76. — *D. atrorubens* auct. non All.: Vieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 324.

Описан по растениям, выращенным из семян неизвестного происхождения, полученных А. Р. de Candolle от Г. В. Balbis под названием «*D. capitatus*» («Semina reseri a cl. Balbisio sub nomine *D. capitati*»).

ЗП; ВП: Тер.-Кум.; **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **ВК:** Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Мегр.-Зан.

Указан для **ВП:** В. Ставр. (Галушко, 1978: 263); **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб. (Галушко, 1978: 263; Зернов, 2006: 259), В. Куб.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак. (Галушко, 1978: 263), Ман.-Самур. (Галушко, 1978: 263; Муртазалиев, 2009, 1: 122); **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Иорск.-Шек. (Гвинианидзе, 1978: 184, sub nom. *D. subulosus*).

Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция).

Согласно протологу, *D. subulosus* отличается от *D. capitatus* более резко заостренными прицветными чешуями и более крупными лепестками.

10 (462). **D. carmelitarum** Reut. ex Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 512; М. Kuzmina, 2003, Komarovia, 3: 95. — *D. artwinensis* Schischk. ex Grossh. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 284, nom. nud.; Reeve, 1967, Fl. Turk. 2: 129, cum auct. Schischk.

Описан из «Турецкой Армении». Туркус: «In monte Techdagh, Armeniae, Huet» (G-BOIS; isotypus — К).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗ:** Севан.

Юго-Зап. Азия (Турция).

Отличается от *D. capitatus* более узкими прицветниками, линейно-ланцетными прицветными чешуями и меньшими размерами растений. В Гербарии LE мною (Kuzmina, 2003: 95) обнаружены следующие образцы этого вида: «Caucasus, Sredinsky», «Colonia Marienfaeld am fluvii Jowa orlis von Tiflis, VI, № 1297, Hohenacker» и «Armenia, Goksschai, 4 IV 1871, Radde».

11 (463). **D. pinifolius** Sm. 1806, in Sibth. a. Sm. Fl. Graec. Prodr. 1: 284; М. Кузьмина, 1996, Бот. журн. 81, 8: 82.

Описан из Греции и Турции («in Lemno insula, et circa Byzantium»).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.

Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция).

Для Кавказа вид впервые приведен мною (Кузьмина, 1996: 82).

12 (464). **D. cibrarius** Clementi, 1855, Sert. Or. 20: 109, tab. 2, fig. 3; М. Kuzmina, 2003, Komarovia, 3: 96.

Описан из западной Турции. Туркус: «Copiose occurit in convalle quadam Olympi Bith. latere S. E., floret Augusto mense [Clementi]» (G; isotypus — К).

ЮЗ: Ерев., Нах., Занг.

Юго-Зап. Азия (зап. Турция).

Sect. 3. **Macrolepides** (F. N. Williams) Klokov

13 (465). **D. barbatus** L. 1753, Sp. Pl.: 409.

Классическое местонахождение не установлено. Lectotypus (Jonsell, Jarvis, 1994: 194): Herb. Clifford: 165, «*Dianthus* 6» (BM).

Культивируется во всех районах Кавказа.

Атл., Сев., Центр., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Вост., Юго-Вост. Азия; Сев. Америка.

Выращивается в качестве декоративного растения почти повсеместно в Северном полушарии, однако редко натурализуется. Вероятно, естественно произрастает в Восточной Азии (Япония, Китай).

Sect. 4. **Barbulatum** F. N. Williams

Subsect. 1. **Longisquamea** F. N. Williams

14 (466). **D. chinensis** L. 1753, Sp. Pl.: 411.

Описан из Китая. *Lectotypus* (Langen et al., 1984: 723): Herb. Linn. 581.13 (LINN).

Культивируется во многих районах Кавказа.

Вост. Азия (Япония, Китай).

Выращивается во многих странах мира в качестве декоративного растения.

Subsect. 2. **Alpini** Vierh.

15 (467). **D. deltoides** L. 1753, Sp. Pl.: 411.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis 1994: 157): Herb. Linn. 581.11 (LINN).

ВЗ: Мург.-Муровд. (заносное в Гяндже).

Европа; Сев. (Дальн. Вост.), Вост. (Япония, Китай) Азия (заносное); Сев. Америка (заносное).

16 (468). **D. raddeanus** Vierh. 1898, Sitzungsber. Akad. Wiss. (Wien), 57, 1: 1145. — *D. alpinus* L. var. *glacialis* Trautv. 1873, Тр. Петерб. бот. сада, 2: 505.

Описан из Армении. *Турус*: «[Armenia] Pylae Goesal-dara, 2 VII 1871, № 381, Radde» (LE!).

ВК: Кубин.; **ЗЗ:** Адж.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Севан., Нах., Занг., Ю. Караб.

Юго-Зап. Азия.

Subsect. 3. **Hemisyrhix** F. N. Williams

17 (469). **D. pratensis** Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 300.

Классическое местонахождение не установлено. *Lectotypus* (Kuzmina, 2002: 37): «Ex agro Sareptano, 1804» (LE — Herb. Bieb!).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос. (заносное).

Вост. Европа; Сев. Азия (сев.-зап. Казахстана, Зап. Сибирь).

18 (470). **D. caucaseus** Sm. 1805, in Sims, Curtis's Bot. Mag. 21: tab. 795. — *D. discolor* Sm. 1805, l. c. 29: tab. 1162. — *D. montanus* auct. non F. W. Schmidt: Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 328.

Описан по растениям, выращенным из семян, полученных с Кавказа («native of Mount Caucasus»). *Lectotypus* (Nersesyan, 2011: 45): [Icon] J. Sims, 1805, Curtis's Bot. Mag.: tab. 795.

ЗП: З. Ставр.; **ЗК**; **ЦК**; **ВК**: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ**: Абх., Инг.-Рион., Туап.-Адл.; **ЦЗ**; **ВЗ**: Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Ширв.; **ЮЗЗ**; **ЮЗ**: Севан., Занг.

Эндемик.

В Абхазии часто встречается гибрид *D. caucaseus* × *D. imereticus* (Rupr.) Schischk. Гибрид *D. caucaseus* × *D. campestris* Vieb. на западе Ставрополя имеет обильно ветвящиеся стебли и короткие острия прицветных чешуй, типичные для *D. campestris*, но крупные цветки, как у *D. caucaseus*.

19 (471). **D. gabrielianiae** Nersesian, 2011, Takhtajania, 1: 45.

Описан из Армении. *Турус*: «Армения, Амасийский район, оз. Арпи, Пеликаний остров, 17 VII 1991, Э. Габриэлян» (ERE (№ 146671)).

ЮЗЗ: Джав.-В. Ах.

Эндемик.

20 (472). **D. oschtenicus** Galuschko, 1965, Новости сист. высш. раст. 2: 118.

Описан с Западного Кавказа. *Турус*: «West Caucasus, mountain Oschten, 2150 m, 31 VII 1963, А. Galushko, Т. Попова» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**: Малк., В. Тер.; **ЗЗ**: Абх.

Эндемик.

21 (473). **D. vladimiri** Galuschko, 1974, Новости сист. высш. раст. 11: 298. — *D. kusnezovii* auct. non Markow: Карягин, 1952, Фл. Азерб. 3: 376.

Описан с Восточного Кавказа. *Турус*: «East Caucasus, riv. Samur, near Mis-kindzha, mt. Shalbuzdagh, 3150 m, 19 VIII 1971, V. Prima» (LE!).

ВК: Ман.-Самур., Кубин.

Эндемик.

22 (474). **D. acantholimonoides** Schischk. 1930, Бюлл. Муз. Груз. 5: 121.

Описан из Северо-Западного Закавказья (окр. Новороссийска). *Lectotypus* (Nersesyan, hoc loco): «Окр. Новороссийска, хребет Маркотх, на вершине и на склоне Ю[жной] балки, 02 VIII 1923, № 221, Т. Ф. Пояркова» (LE, cum syntуро № 214).

ЗК: Адаг.-Пшиш.; **СЗЗ**; **ЗЗ**: Туап.-Адл.

Эндемик.

23 (475). **D. kubanensis** Schischk. 1936, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер.1, 3: 184.

Описан из Адыгеи. *Турус*: «Adigey distr., Enem Tokhtamukay, 31 VII 1926, L. Sokolova» (LE!).

ЗП; **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК**: В. Кум.; **ВК**: Ассо-Арг.

Указан для **ЗК**: Адаг.-Пшиш.; **ЦК**: Малк., В. Тер. (Галушко, 1978: 266).

Эндемик.

24 (476). **D. kusnezovii** Markow. 1923, Бот. мат. (Ленинград), 4: 31. — *D. abchasicus* Gvinian. 1969, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 27: 78.

Описан из Абхазии. Т у р u s: «Klukhor pass, south slope along the road to Teberda, 2 VIII 1907, Marcovicz» (LE!; isotypi — ERE!, TBI!).

ЗЗ: Абх.

Эндемик.

Subsect. 4. **Collini** M. Kuzmina

25 (477). **D. grossheimii** Schischk. 1936, Тр. Бот. инст. Азерб. фил. АН СССР, 2: 278; Шишк. 1936, Фл. СССР, 6: 838; он же, 1937, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 3: 186; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 288, 321. — *D. seguieri* auct. non Vill.: Reeve, 1967, Fl. Turk. 2: 122.

Описан из Армении (область Вайоц Дзор, Ехегнадзорский район). Не о т у р u s (Nersesyan, hoc loco): «Азизбековский район, Агкенд, заросли куст., 20 VIII 1947, leg. П. Ярошенко [det. В. Schischkin]» (ERE (№ 58918)!).

ЮЗ: Севан., Дар.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

Как видно из процитированных источников, *D. grossheimii* был опубликован дважды, при этом указывались различные географические пункты классического местообитания: сел. Алагез и сел. Алачеп. Во «Флоре СССР» Б. К. Шишкиным (1936) сказано, что растение описано из сел. Алачен. Согласно А. А. Гроссгейму (1945: 321), все эти указания неправильные, а «на самом деле растение описано из с. Аг-кенд в Даралагезе».

Типовой материал по *D. grossheimii* до сих пор не найден ни в Гербарии ВАК (Kuzmina, 2003), ни в Гербарии LE (Nersesyan, 2011). В связи с этим А. А. Нерсисян выбран неотип, которым послужил образец, собранный в locus classicus и определенный Шишкиным.

D. grossheimii отличается от *D. collinus* Waldst. et Kit. наличием воскового налета на листьях, а также более длинными и более зелеными верхушками прицветных чешуй.

26 (478). **D. imereticus** (Rupr.) Schischk. 1930, Бюлл. Муз. Груз. 5: 123. — *D. montanus* F. W. Schmidt f. *imereticus* Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 173 (Fl. Cauc.). — *D. charadzeae* Gagnidze et Gvin. 1981, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 37: 25.

Описан из Грузии (Имеретия). Т у р u s: «Montes Imeretiae inter Kutais et Gelati, 1861, Ruprecht» (LE!).

ЗК: Уруп-Теб.; **ЦК;** **СЗЗ:** Пшад.-Джубг.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир.

Указан для **ВК:** Ассо-Арг. (Галушко, 1978: 266), Ман.-Самур. (Гусейнов, 1990: 235; Муртазалиев, 2009, 1: 123).

Эндемик.

27 (479). **D. masmeneaeus** Boiss. 1856, Diagn. Pl. Or. sér. 2, 5: 51; Reeve, 1967, Fl. Turk. 2: 123. — *D. transcausicus* Schischk. 1929, Изв. Томск. унив. 80: 452.

Описан из южной Турции. Т у р u s: «In regione alpina montis Masmeneudagh ad boream Tauri Cilicici siti cl. Balansa» (G-BOIS!; isotypi — G!, K).

ЮЗ: Ерев.

Указан для **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах. (Гвинианидзе, 1978: 186, sub nom. *D. transcausicus*).

Юго-Зап. Азия (Турция).

Subsect. 5. **Barbulatum** (F. N. Williams) M. Kuzmina

28 (480). **D. campestris** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 326.

Описан из Украины. Lectotypus (Kuzmina, 2002: 41): «Mereffa, 1804» (LE — Herb. Bieb!).

ЗП: 3. Ставр. (старый сбор: «Trinovaja, Stavropol. gub.»).

Указан для **ВП**: В. Ставр., Тер.-Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 42).

Юго-Вост., Вост. Европа; Сев. Азия.

Часто гибридизирует с *D. caucaseus*.

Subsect. 6. **Asperi** Vierh.

29 (481). **D. pallidiflorus** Ser. 1824, in DC. Prodr. 1: 358.

Описан из южной России («ad Wolgam, circa coloniam Sarepta»).

ЗП; **ВП**; **ЗК**: Уруп-Теб.; **ЦК**: В. Кум.

Указан для **ЦК**: В. Тер. (Галушко, 1978: 267); **ВК**: В. Сулак. (Галушко, 1978: 267; Муртазалиев, 2009, 1: 124).

Юго-Вост., Вост. Европа.

30 (482). **D. bicolor** Adams, 1805, in Weber u. Mohr, Beitr. Naturk. 1: 55; Шишк. 1936, Фл. СССР, 6: 829, quoad pl. cauc. — *D. caucasicus* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 327.

Описан из Пятигорска («ad aquas acidas Constantinomontanas»).

ВП: Тер.-Кум.; **ЦК**: В. Кум.; **ВК**: Ассо-Арг., Ман.-Самур.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.

Указан для **ЗП**; **ВП**: В. Ставр.; **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК**: В. Тер. (Галушко, 1978: 267); **ВК**: В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 122).

Вост. Европа.

Отличается от *D. pallidiflorus* очень короткими и не остевидными верхушками прицветных чешуй.

31 (483). **D. aristatus** Boiss. 1860, in Tchich. Asie Min. Bot. 1: 222; id. 1867, Fl. Or. 1: 505. — *D. preobrazhenskii* Клоков, 1927, Тр. сільск-госп. бот. (Харків), 1, 3: 170; Шишк. 1936, Фл. СССР, 6: 834. — *D. zonatus* Fenzl var. *aristatus* (Boiss.) Reeve, 1967, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 28: 21.

Описан из «Турецкой Армении». Ту р у s: «Asia minor, OEst., 1858, M. de Tchihatchef. *D. aristatus* sp. nov. Armenia meridian., prope Uzunbazar» (G-BOIS!).

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ**: Ерев., Севан.

Указан для **ВЗ**: Караб.; **ЮЗ**: Ю. Караб. (Карягин, 1952: 377, sub nom. *D. preobrazhenskii*).

Юго-Зап. Азия (Турция, ?зап. Сирия).

Sect. 5. **Dianthus**

32 (484). **D. caryophyllus** L. 1753, Sp. Pl. 410.

Описан по садовым экземплярам без указания местонахождения.

Широко культивируется во всех районах Кавказа.

Южн. Европа; Средиз. Культивируется во многих странах.

33 (485). **D. cretaceus** Adams, 1805, in Weber u. Mohr, Beitr. Naturk. 1: 56. — *D. petraeus* Bieb. 1808, Fl. Taur-Cauc. 1: 328, non Waldst. et Kit. 1807. — *D. liboschitzianus* Ser. ex DC. 1824, Prodr. 1: 360.

Описан из Грузии. Ту р u s: «*Dianthus cretaceus* m., Adams» (LE!).

33a. **D. cretaceus** Adams subsp. **cretaceus**.

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт., Лори.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Ерев., Севан. Дар., Нах., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЗК:** Бело-Лаб. (Галушко, 1978: 268; Зернов, 2006: 260), Уруп-Теб. (Галушко, 1978: 268); **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Зернов, 2006: 260).

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, сев.-зап. Иран).

33b. **D. cretaceus** Adams subsp. **multicaulis** (Boiss. et A. Huet) Nersesian, 2011, Новости сист. высш. раст. 42: 112. — *D. multicaulis* Boiss. et A. Huet, 1856, in Boiss. Diagn. Pl. Or. sér. 2, 5: 53. — *D. liboschitzianus* Ser. ex DC. γ . *multicaulis* (Boiss. et A. Huet) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 487. — *D. cretaceus* var. *multicaulis* (Boiss. et A. Huet) Grossh. 1930, Фл. Кавк. 2: 430.

Описан из Восточной Анатолии. Л е с т о т у р u s (Нерсесян, 2011: 113): «*Palanteuken*, 7–8000', VII 1853, A. Huet du Pavillon» (G-BOIS!).

ЗЗ: Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори (зап.); **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Севан.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

33c. **D. cretaceus** Adams subsp. **dmanissianus** (M. Kuzmina) Nersesian, 2011, Новости сист. высш. раст. 42: 113. — *D. dmanissianus* M. Kuzmina, 1996, Бот. журн. 81, 8: 80.

Описан из Грузии. Ту р u s: «Georgia, reg. Dmanissi, Gantiadi — Dmanissi, 25 VI 1976, J. Menitzky» (LE!).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос. (Боржоми; Бакуриани: юго-запад), Триал.-Н. Карт., Лори.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.

Эндемик.

Часто встречаются экземпляры с лепестками, почти не превышающими зубцы чашечки, и с недоразвитыми тычинками.

33d. **D. cretaceus** subsp. **sevanensis** Nersesian, 2011, Новости сист. высш. раст. 42: 113.

Описан из Армении. Ту р u s: «*Prope Djil*, in fauc. Dali-aga, in pratis subalpinis 7000–8000', 3 VII 1928, A. Schelkovnikov, E. Kara-Murza» (ERE (№ 1286)).

ЮЗ: Севан.

Эндемик.

34 (486). **D. zangezuristicus** Nersesian, 2011, Новости сист. высш. раст. 42: 115 — *D. cretaceus* auct. non Adams: Гроссг. 1930, Фл. Кавк. 2: 429, p. min. p.; он же 1945, цит. соч. изд. 2, 3: 289, p. min. p.; он же, 1949, Опред. раст. Кавк.: 558, p. min. p.; Шишк. и В. Е. Авет. 1956, Фл. Арм. 2: 201, p. min. p.

Описан из Армении. Т у р и с: «Армения, обл. Сюник, гора Хуступ, под зубцом, 3170 м над ур. м., 39°08' N / 46°20' E, 27 VII 2006, А. Нерсесян, М. Агабабян, М. Саркисян» (ERE (№ 174571); isotypі — ERE (№174572), LE).

ЮЗ: Занг.

Эндемик.

От близкого *D. cretaceus* отличается длинными остриями наружных прицветников, в верхней половине длинно оттянутой чашечкой и валиком под зубцами недозрелой коробочки.

35 (487). **D. integerrimus** Bunge, 1858, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 6, 7: 583; F. N. Williams, 1893, Journ. Bot. (London): 461, p. p. — *D. liboschitzianus* Ser. ex DC. β. *integerrimus* (Bunge) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 487. — *D. cretaceus* Adams var. *integerrimus* (Bunge) Grossh. 1930, Фл. Кавк. 2: 430; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 289; Гвинеан. 1978, Фл. Груз. изд. 2, 4: 196.

Описан из Грузии. Т у р и с: «In valle Tzkeniztskal Armeniae Rossicae, № 66 [Abich]». (P?).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг.; **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

36 (488). **D. takhtajanii** Nersesian, 2011, Takhtajania, 1: 47

Описан из Армении. Т у р и с: «Армения, Мегринский р-н, окр. с. Карчеван, над медно-молибденовым карьером возле бывшего с. Агарак (Егерак), 1250–1300 м над ур. м., 38°54.8' N / 46°11' E, 11 VI 2007, М. Агабабян, А. Нерсесян, И. Габриэлян» (ERE (№ 174587)).

ЮЗ: Мегр.-Зан.

Эндемик.

От *D. cretaceus* отличается жесткими, почти колючими листьями бесплодных побегов и широко-обратнойцевидными тупозубчатыми лепестками.

37 (489). **D. tlaratensis** Husseinov, 1990, Бот. журн. 75, 2: 234.

Описан из Дагестана. Т у р и с: «Дагестанская АССР, Тляратинский р-н, с. Тлярата, в местечке Угнаб, в сосновых лесах, на открытых скалистых обрывах, террасных площадках, 2000–2700 м, 25 VIII 1975, Ш. А. Гусейнов» (LE!).

ВК: В. Сулак.

Указан для **ВК:** Ман.-Самур. (Муртазалиев, 2009, 1: 126).

Эндемик.

Встречаются экземпляры, являющиеся, очевидно, гибридами с *D. daghestanicus* Charadze.

38 (490). **D. daghestanicus** Charadze, 1951, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 16: 47.

Описан из Дагестана. Т у р и с: «Чарадинский р-н, между селами Цуриб и Гидиб, 1500 м, S, фриганоидная растительность, 26 VIII 1949, М. Сахокиа» (ТВИ!).

ЦК: В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Кубин.; **ЗЗ:** Рион.-Квир.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **Т.**

Указан для **ЗК:** В. Куб.; **ЦК:** Малк. (Галушко, 1978: 268); **ВК:** Ман.-Самур. (Галушко, 1978: 268; Муртазалиев, 2009, 1: 123).

Эндемик.

39 (491). **D. elbrusensis** Charadze, 1959, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 21: 48.
Описан с Северного Кавказа. *Т y p u s*: «Балкария, верховья р. Баксан, левый борт ущ. р. Ирик, 17 VIII 1956, Р. Гагнидзе, И. Лачашвили» (ТВИ!).

ЗК: Уруп-Теб.; **ЦК**: Малк., В. Тер.; **ЗЗ**: Инг.-Рион.

Указан для **ЗК**: В. Куб.; **ВК**: Ассо-Арг. (Галушко, 1978: 267).

Эндемик.

Нередко встречаются экземпляры с признаками *D. integerrimus*, являющиеся, вероятно, гибридными.

40 (492). **D. fragrans** Adams, 1805, in Weber u. Mohr, Beitr. Naturk. 1: 56. — *D. tichomirovii* Devyatov, Taisumov et Teimurov, 1999, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 104, 2: 37.

Описан с Северного Кавказа (окр. Пятигорска). *Л е с т о т y p u s* (Кузьмина, 2004: 293): «Ad aquas acidas Constantinomontanas, Adams» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**; **ВК**: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ**: Абх.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич. (Буйнуз), Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур.

Вост. Европа (Волгоград — Кузьмина, 2004: 293).

D. tichomirovii не отличается от *D. fragrans*. Окраска венчика не представляется мне достаточным признаком для выделения нового вида, а ознакомление с неотипом *D. tichomirovii* («Северный Кавказ, Республика Дагестан, Курахский район, ущелье р. Курах, окр. с. Курах, на скалистых местах в среднем поясе, М. Тайсумов» — MW!) не выявило дополнительных диагностических признаков.

41 (493). **D. awaricus** Charadze, 1951, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 16: 50.

Описан из Дагестана. *Л е с т о т y p u s* (Nersesyan, hoc loco): «Дагестан, близ Верхнего Гуниба, на скалах, 22 VIII 1949, А. Харадзе, Л. Хинтибидзе» (ТВИ!).

ВК: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ**: Ширв.

Эндемик.

42 (494). **D. talyschensis** Boiss. et Buhse, 1860, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, 12: 34.

Описан из Талыша. *Т y p u s*: «In montibus Talish, in silvis supra Astara, 900 m, № 802-а, Buhse» (G-BOIS!; isotypus — LE!).

Т.

?Юго-Зап. Азия (сев. Иран: Талыш).

Известен только по типовому материалу. Точное место сбора типовых образцов трудно установить, так как маршрут Р. Е. Boissier и Ф. А. Buhse над Астарой проходил по самой границе современных Азербайджана и Ирана. Поэтому вид приводят как для флоры Кавказа (Шишкин, 1936; Гроссгейм, 1945; Карягин, 1952), так и для флоры Ирана (Assadi, 1985; Rechinger, 1988).

Образцы с горы Шиндан-Каласи (26 VII 1906, А. Шелковников — TGM!), определенные Б. К. Шишкиным как *D. talyschensis* и процитированные А. А. Гроссгеймом (1945: 290) во «Флоре Кавказа» и И. И. Карягиным (1952: 380) во «Флоре Азербайджана», оказались новым для флоры Кавказа видом *D. agrostolepis* Rech. f.

К. Н. Rechinger (1988) поместил *D. talyschensis* в секцию *Barbulatum* (pro sect. *Dentati* Boiss.). Поскольку вид имеет голую пластинку лепестков и морфологически близок к *D. fragrans*, мы рассматриваем его в секции *Dianthus* [sect.] *Leiopetali* Boiss., как это делал и Boissier (1867).

43 (495). **D. lanceolatus** Steven ex Rehb. 1828, Icon. Bot. Pl. Crit. 6: 34.

Описан из Восточной Европы (южное Подолье).

ЗП; ВП; ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ассо-Арг.

Указан для **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур. (Муртазалиев, 2009, 1: 124).
Вост. Европа.

44 (496). **D. leptopetalus** Willd. 1809, Enum. Pl. Horti Berol.: 468; М. Кузьмина, 2004, Фл. Вост. Евр. 11: 292. — *D. pomeridianus* auct. non Sm.: Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 329.

По протологу вид описан с Кавказа («ad Caucasum»), но, по-видимому, из окрестностей Волгограда. *Lectotypus* (Кузьмина, 2004: 292): «Ex agro Sareptano, 1803» (LE — Herb. Bieb!).

Указан для **ВП:** В. Ставр. («совхоз Турксад») (Танфильев, Кононов, 1987: 42).
Южн., Вост. Европа; Юго-Зап. (зап. и центр. Турция), Ср., Вост. Азия.

45 (497). **D. schemachensis** Schischk. 1931, Тр. геобот. обслед. пастб. Азерб. ССР, сер. А, 7: 90.

Описан из Азербайджана. *Lectotypus* (Nersesyan, hoc loco): «Transcaucasia, Azerbajdzhan, distr. Schemacha, inter pagos Kushtshy et m. Kalamadyn, 5 V 1928, fr., M. Sachokia» (LE!).

ВК: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв.
?Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

46 (498). **D. inamoenus** Schischk. 1936, Фл. СССР, 6: 897, 842. — *D. lenkoranicus* Charadze, 1951, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 16: 46.

Описан из Грузии. *Typus*: «Georgia, Tbilissi (Tiflis) in declivitatibus ad fl. Vera, 26 V 1918, fl., В. Schischkin» (ТБИ!).

ЦЗ: Карг.-Ю. Ос., Триал.-Н. Каргл.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Ширв., Н. Кур.; **ЮЗ:** Мегр.-Зан. (Шванидзор), Нах.; **Т:**

Указан для **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 123).

Юго-Зап. Азия (вост. Турция).

Изучение типового материала *D. lenkoranicus* в Гербарии ТБИ показало необоснованность выделения этого таксона в ранге отдельного вида. Типовые образцы слегка отличаются более мелкими чашечками, которые, однако, также сужаются кверху, как и чашечки у *D. inamoenus*. Окраска чашелистиков и форма их зубцов являются варьирующими признаками.

47 (499). **D. jaroslavii** Galushko, 1969, Новости сист. высш. раст. 6: 213.

Описан из Кабардино-Балкарии. *Typus*: «Caucasi borealis, Tshegem, in viciniis pag. Verchnyi Tshegem, 7 VIII 1965, А. Galushko» (LE!).

ЦК: Малк.

Эндемик.

48 (500). **D. atschurensis** Sosn. 1923, Вестн. Тифл. бот. сада, нов. сер. 1: 74.

Описан из Грузии (Месхетия). *Typus*: «Inter Achaltsich et Atschur, in rupibus prope fl. Kura, 8 VIII [19]20, D. Sosnowsky» (ТБИ!).

ЮЗЗ: Месх.

Эндемик.

49 (501). **D. anatolicus** Boiss. 1842, Diagn. Pl. Or. sér. 1, 1: 22. — *D. parviflorus* Boiss. 1842, l. c.: 21; Шишк. и В. Е. Авет. 1956, Фл. Арм. 2: 202. — *D. anatolicus* var. *parviflorus* Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 490.

Описан из Турции. Л е с т о т у п у с (Nersesyan, 2011: 48): «*Sypili dumosis supra Magnesia[m]*, VII 1842 [E. Boissier]» (G-BOIS!).

ЮЗ: Дар.

Юго-Зап. Азия (Турция).

50 (502). **D. floribundus** Boiss. 1860, in Tchich. Asie Min. Bot. 1: 221. — *D. tabrisianus* Bien. ex Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 496. — *D. schischkinii* Grossh. 1949, Бот. Мат. (Ленинград), 11: 83. — *D. woronowii* Schischk., in sched. herb. LE.

Описан из «Турецкой Армении». Т у р у с: «Asia minor, OEst., 1858, M. de Tchihatchef. Armenia ad radices borales Bingöl dagh» (G-BOIS!; isotypus — K).

ЗЗ: Адж.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Дар.

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, зап. Иран).

D. schischkinii, *D. tabrisianus* и *D. woronowii* являются конспецифичными с *D. floribundus*, так как признаки формы прицветных чешуй и степени рассеченности лепестка, которыми их отличают, варьируют в достаточно широких пределах и не могут считаться диагностическими.

51 (503). **D. canescens** C. Koch, 1842, Linnaea, 15: 710. — *D. fimbriatus* Bieb. ζ. *canescens* (C. Koch) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 496. — *D. orientalis* auct. non Adams: Reeve, 1967, Fl. Turk. 2: 120, p. p.; Assadi 1985, Iran. Journ. Bot. 3, 1: 34, p. p.

Описан из Армении («In deserto petroso prope claustrum Etschmiadsin frequenter»).

ЮЗ: Ерев.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

Толстоватые лепестки и тонкие прицветные чешуи указывают на близость *D. canescens* с *D. floribundus*, а не с *D. orientalis*.

Sect. 6. **Fimbriati** (Boiss.) F. N. Williams

52 (504). **D. libanotis** Labill. 1791, Icon. Pl. Syr. 1: 14.

Описан из Ливана. Т у р у с: «Orient. Labill.» (G-DC!; isotypus — K).

ЮЗ: Ерев., Дар., Нах.

Юго-Зап. Азия.

53 (505). **D. crinitus** Sm. 1794, Trans. Linn. Soc. London, 2, 1: 300.

Описан из Армении («in Armeriâ [errore, Armenia]. Variat flore albo. Tournefort»).

ЗЗ: Рион.-Квир.; **ЦЗ;** **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ;** **Т.**

Указан для **ВК:** Ман.-Самур. (Муртазалиев, 2009, 1: 123).

Юго-Зап., ?Ср. Азия.

54 (506). **D. crossopetalus** (Fenzl ex Boiss.) Grossh. 1930, Фл. Кавк. 2: 428. — *D. crinitus* Sm. γ. *crossopetalus* Fenzl ex Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 496.

Описан из Ирана. Л е с т о т у п у с (Rechinger, 1988: 179): «In l. arenosis et lapidosis prope urben Teheran, 15 IV 1843, № 21, Th. Kotschy. Pl. Pers. bor. Ed. R. F. Hohenacker, 1846» (W; isolectotypus — G-BOIS!).

ЮЗ: Нах., Мегр.-Зан.; **Т.**

Юго-Зап. Азия (Турция, сев. и зап. Иран).

Отличается от близкого полиморфного *D. crinitus* низкорослостью, очень длинной (30–45 мм) чашечкой и длинными травянистыми острями прицветных чешуй.

55 (507). **D. orientalis** Adams, 1805, in Weber u. Mohr, Beitr. Naturk. 1: 54. — *D. fimbriatus* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 332.

Описан из Грузии (окр. Тбилиси). *Тур у s:* «Habitat circa Tiflis, Adams» (LE!).

55a. **D. orientalis** Adams subsp. **orientalis**.

БК: Ман.-Самур.; **ЦЗ;** **ВЗ:** Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ;** **Т.**

Юго-Зап. Азия (Турция, Ирак, Иран).

55b. **D. orientalis** Adams subsp. **ketzkhovellii** (Makaschv.) Nersesian comb. et stat. nov. — *D. ketzkhovellii* Makaschv. 1947, Сообщ. АН ГрузССР, 8, 7: 447.

Описан из Аджарии. *Тур у s:* «Adzharia, distr. Chulo, inter pp Chulo et Schuachevi, 700–900 m, 21 VIII 1947, A. Makaschvili» (ТБИ!).

ЗЗ: Адж.; **ЮЗЗ:** Месх.

Юго-Зап. Азия (вост. Турция).

55c. **D. orientalis** Adams subsp. **aphanoneurus** Rech. f. 1986, Pl. Syst. Evol. 151: 290. — *D. aphanoneurus* (Rech. f.) M. Kuzmina, 1996, Бот. журн. 81, 8: 82.

Описан из западного Ирана. *Тур у s:* «Persia occidentalis, prov. Luristan, m. Sawers, 9000 ped., VII 1868, C. Haussknecht» (W!; sp. auth. — G-BOIS!, G!).

ЮЗ: Дар., Занг., Мегр.-Зан., Нах.

Юго-Зап. Азия (зап. и южн. Иран).

Экземпляры из Армении отличаются от типовых голой пластинкой лепестка.

55d. **D. orientalis** Adams subsp. **nassireddini** (Stapf) Rech. f. 1986, Pl. Syst. Evol. 151: 292. — *D. nassireddini* Stapf, 1886, Denkschr. Akad. Wiss. Math.-Naturw. Kl. (Wien), 51: 279. — *D. fimbriatus* Bieb. var. *brachyodontus* Boiss. et A. Huet, 1856, in Boiss. Diagn. Pl. Or. sér. 2, 5: 53, p. p. — *D. dumulosus* Boiss. et A. Huet, 1853, Pl. Arm. Exs., in sched. herb. LE; Гроссг. 1930, Фл. Кавк. 2: 427. — *D. brachyodontus* (Boiss. et A. Huet) Grossh. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 294; Карягин, 1952, Фл. Азерб. 3: 382.

Описан из западного Ирана. *Тур у s:* «In monte Elwend (Media), 1882, legit Th. Pichler» (WU!; isotypi — K!, WU!).

Т.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, сев. Ирак, зап. Иран).

55e. **D. orientalis** Adams subsp. **obtusisquameus** (Boiss.) Rech. f. 1986, Pl. Syst. Evol. 151: 291. — *D. fimbriatus* Bieb. β. *obtusisquameus* Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 495.

Описан из Ирана. *Л е с т о т у р у s* (Rechinger, 1988: 162): «In valle Talagon m. Elbrus [errore, Elburs], 14 VII 1843, № 515, leg. Kotschy» (G-BOIS!).

ЮЗ: Дар.

Юго-Зап. Азия (зап. и центр. Иран).

56 (508). **D. martuniensis** M. Kuzmina, 1996, Бот. журн. 81, 8: 81.

Описан из Армении. Т у р у s: «Армянская ССР, Мартунинский р-н, Селимский пер., 18 VIII 1954, С. Г. Тамамшян, Г. А. Денисова» (LE!).

ЮЗ: Севан., Дар., Нах.

Юго-Зап. Азия (юго-вост. Турция).

Морфологически близок *D. orientalis* subsp. *macropetalus* (Boiss.) Rech. f., распространенному в Ираке и на западе Ирана, но отличается от него разветвленными в верхней части стеблями и красноватыми, кверху суженными чашечками, а также густо опушенными пластинками лепестков.

В **ЮЗ:** Севан., Дар. встречаются промежуточные между *D. martuniensis* и *D. orientalis* растения, имеющие длинные острия прицветных чешуй, широкие листья, голые пластинки лепестков, короткие влагалища стеблевых листьев и скученные в основании стеблей укороченные побеги.

57 (509). **D. jacobsii** Rech. f. 1983, Pl. Syst. Evol. 142: 243.

Описан из Ирана. Т у р у s: «Persia, W, prov. Kurdistan, Sanangaj, low rolling mountains of dark slaty rock with open herbaceous vegetation, 35°03' N, 46°57' E, 1200–1400 m, 21 VI 1963, № 6979, Jacobs» (W!; isotypus — E).

ЮЗ: Нах.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, Иран).

58 (510). **D. agrostolepis** Rech. f. 1983, Pl. Syst. Evol. 142: 246. — *D. talyschensis* auct. non Boiss. et Buhse: Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 290; Карягин, 1952, Фл. Азерб. 3: 380, р. р., excl. typo.

Описан из Ирана. Т у р у s: «Persia, N, prov. Gilan, in fagetis saxosis supra Sefid Poshteh inter Asalem [Navrud] et Khalkhal, 1900–2100 m, 17 VII 1975, № 18537, Wendelbo et Assadi» (W!).

БК: Кубин. (с. Гюмюр); **Т** (гора Шиндан-Каласи).

Юго-Зап. Азия (сев. и сев.-зап. Иран).

Для флоры Кавказа приводится впервые по образцам: «Gub. Vaku, distr. Kuba, in siccis supra р. Gümür, 5000', 11 VII 1899, № 3999, Alexeenko» (LE), «Гора Шиндан-Каласи (6000' над уров. моря), Талыш, Ленкоранск. уезда, Бакинск. губ., 26 VII 1906, А. Schelkownikow» (TGM) — см. примечание к *D. talyschensis*, «Вершина [оры] Шандан-Каласи, щебнистый склон, 20 VIII 1931, № 1229, Н. Шипчинский» (LE!).

Образец из Талыша (26 VII 1906, А. Шелковников — TGM) отличается от типовых образцов *D. agrostolepis* более длинными (до 4 мм) влагалищами листьев.

59 (511). **D. plumarius** L. 1753. Sp. Pl.: 411. — *D. arenarius* auct. non L.: Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 292.

Описан из Европы и Канады.

Выращивается в качестве декоративного растения во многих районах Кавказа.

Центр. Европа. Разводится как декоративное растение во многих странах мира, иногда натурализуется.

60 (512). **D. juzeptchukii** M. Kuzmina, 1996, Бот. журн. 81, 8: 80.

Описан из Грузии. Т у р у s: «Груз. ССР, Бакуриани, гора Цхра-Цкаро, подъем от перевала к вершине, альпийский луг, 30 VII 1954, С. В. Юзепчук» (LE!).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос. (Бакуриани).

Эндемик.

Известен только по типовому образцу. От видов группы родства *D. arenarius* L. отличается притупленными прицветными чешуями.

Sect. 7. **Verruculosi** (Boiss.) Nersesian

61 (513). **D. cyri** Fisch. et C. A. Mey. 1837, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 4: 34.

Описан из Закавказья. Т у р у s: «In desertis ad fl. Kur., in prov. Elisabethopol, VII Hohenack.» (LE!).

ЗЗ: Адж.; **ЦЗ;** **ВЗ:** Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах.; **Т:**

Юго-Зап. Азия.

Некоторые виды *Dianthus* произрастают в непосредственной близости к границам Кавказа и могут быть найдены в регионе: *D. andronakii* Woronow ex Schischk. (сев.-вост. Турция, ущ. р. Чорох; возможно нахождение в **ЗЗ**), *D. plumbeus* Schischk. (вост. Турция; возможно нахождение в **ЗЗ**, **ЮЗЗ**), *D. recognitus* Schischk. (зап. и сев.-вост. Турция; возможно нахождение в **ЗЗ**), *D. szowitsianus* Boiss. и *D. hyrcanicus* Rech. f. (встречаются рядом с границей Азербайджана и могут быть найдены в **Т**). *D. arenarius* L., распространенный в Европе, указан для **ЗК** (Терек) (Гроссгейм, 1945: 292), вероятно, по ошибке. — Прим. А. А. Нерсисян.

27 (80). **Kohlrauschia** Kunth*

1 (514). **K. prolifera** (L.) Kunth, 1838, Fl. Berol. ed. 2, 1: 108. — *Dianthus prolifera* L. 1753, Sp. Pl.: 410. — *Tunica prolifera* (L.) Scop. 1772, Fl. Carniol. ed. 2, 1: 299. — *Petrorrhagia prolifera* (L.) P. W. Ball et Heywood, 1964, Bull. Brit. Mus. (Bot.), 3, 4: 161.

Описан из Европы. L e c t o t y p u s (Thomas, 1983: 73): Herb. Linn. 178.19, «4 prolifera» (S).

ЗП; **ВП;** **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **СЗЗ:** Пшад.-Джубг.; **ЗЗ:** Рион.-Квир. (Гроссгейм, 1945: 275); **ЮЗ:** Севан. (Шишкин, Аветисян, 1956: 181).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Иран); Сев. Африка.

2 (515). **K. velutina** (Guss.) Rchb. 1844, Icon. Fl. Germ. Helv. 4: 43. — *Dianthus velutinus* Guss. 1825, Index Sem. Hort. Vicedifalco: 2. — *Tunica velutina* (Guss.) Fisch. et C. A. Mey. 1839, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 6: 66. — *Petrorrhagia velutina* (L.) P. W. Ball et Heywood, 1964, Bull. Brit. Mus. (Bot.), 3, 4: 166.

Описан из Италии.

ВЗ: Ширв.; **Т:**

Атл., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз., Юго-Зап. Азия (Турция); Сев., Центр. Африка.

* Г. А. Лазьков.

28 (81). **Petrorhagia** (Ser. ex DC.) Link*

Sect. **Pseudogypsophila** (A. Br.) P. W. Ball et Heywood

1 (516). **P. alpina** (Hablitz) P. W. Ball et Heywood, 1964, Bull. Brit. Mus. (Bot.), 3, 4: 145. — *Gypsophila alpina* Hablitz, 1783, Neue Nord. Beytr. Phys. Geogr. Erd- Völkerbeschreib. 4: 57. — *G. stricta* Bunge, 1829, in Ledeb. Icon. Pl. Fl. Ross. 1: 4, tab. 5. — *Tunica stricta* (Bunge) Fisch. et C. A. Mey. 1837, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 4: 50. — *Fiedleria alpina* (Hablitz) Ovcz. 1967, Докл. АН ТаджССР, 10, 1: 52.

Описан из Ирана. Лектотипус (Бобров, 1958: 1546): «[Гилян] in alpinis Samamisisicis [S. G. Gmelin]» (LE!).

ЗЗ: Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ;** **Т.**

Указан для **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт. (Гвинианидзе, 1978: 176); **ВЗ:** Мург.-Муровд. (Шишкин, Аветисян, 1956: 178); **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах. (Гвинианидзе, 1978: 176).

Юго-Зап. (от Турции до Пакистана), Ср., Центр., Южн. (вост. Пакистан) Азия.

2 (517). **P. saxifraga** (L.) Link, 1831, Handbuch, 2: 235. — *Dianthus saxifragus* L. 1753, Sp. Pl.: 413. — *Tunica saxifraga* (L.) Scop. 1772, Fl. Carniol. ed. 2, 1: 300.

Описан из Европы. Лектотипус (Jonsell, Jarvis, 1994: 157): Herb. Burser XVI: 42 (UPS-BURSER).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Тоб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг.; **ЗЗ;** **ЦЗ;** **ВЗ;** **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **Т.**

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

3 (518). **P. cretica** (L.) P. W. Ball et Heywood, 1964, Bull. Brit. Mus. (Bot.), 3, 4: 142. — *Saponaria cretica* L. 1762, Sp. Pl. ed. 2: 584. — *Tunica cretica* (L.) Fisch. et C. A. Mey. 1837, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 4: 49. — *T. pachygona* Fisch. et C. A. Mey. 1837, l. c.: 50.

Описан с Крита. Лектотипус (Davis, 1957: 164): Herb. Linn. 580.4 (LINN).

ВЗ: Ширв.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мегр.-Зан.

Указан для **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Гвинианидзе, 1978: 178).

Средиз.; Юго-Зап. (Сирия, Ирак, Иран), Ср. (Туркменистан) Азия.

29 (82). **Velezia** L.*

1 (519). **V. rigida** L. 1753, Sp. Pl.: 332.

Описан из Южной Европы. Лектотипус (Strid in Cafferty, Jarvis, 2004: 1053): Herb. Linn. 326.1 (LINN!)

ВП: Тер.-Сулак.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ;** **ЮЗ:** Ерев., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ВК:** В. Сулак. (Галушко, 1978: 269); **ЮЗ:** Дар. (Гроссгейм, 1945: 298).

* Г. А. Лазьков.

Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (от Турции и Ирака до Пакистана), Южн. (вост. Пакистан), Ср. Азия.

Trib. 2. **Sileneae** DC.

30 (83). **Silene** L., nom. cons.*

Subgen. 1. **Behen** (Moench) Bunge

Sect. 1. **Behen** (Moench) Dumort.

1 (520). **S. crispata** Steven, 1856, Bull. Soc. Nat. Moscou, 29, 1: 315. — *S. cserei* auct. non Baumg.: Шишк. 1936, Фл. СССР. 6: 598, р. р., quoad syn. *S. crispata*.

Описан из Украины. *Le ct o t y p u s* (Иконников, 1975: 198): «Sudak» (LE!).

СЗЗ: Анап.-Гел.

Юго-Вост. Европа.

От широко распространенного вида *S. cserei* Baumg. отличается преимущественно тупобугорчатыми семенами и, отчасти, волнистыми по краю листьями.

2 (521). **S. cserei** Baumg. 1817, Enum. Stirp. Transsilv. 3: 345. — *S. saponariifolia* Schott ex Bess. 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 47. — *S. schottiana* Schur, 1866, Enum. Pl. Transsilv. 103. — *S. conringiifolia* Andr. ex Rogow. 1869, Обозр. высш. спор. раст. Киев. окр.: 44. — *S. aeoniopsis* Bornm. 1940, Feddes Repert. (Beih.) 89, 1: 112. — *S. alexeji* Kolak. 1948, Зам. сист. георг. раст. (Тбилиси), 14: 65. — *S. cserei* subsp. *aeoniopsis* (Bornm.) Chowdhuri, 1957, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 22: 269. — *S. caliacrae* Jordanov et Panov, 1966, Фл. Бълг. 3: 473, 593. — *S. anatolica* Melzh. et A. Baytop, 1980, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 38, 3: 449.

Описан из Румынии.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**: В. Кум., Малк.; **ВК**: Ман.-Самур.; **ЗЗ**: Абх.

Указан для **ЗП**: З. Ставр. (Танфильев, Кононов, 1987: 40); **ВП**: В. Ставр.; **ЗК**: Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1978: 256); **ВК**: Кубин. (Гроссгейм, 1945: 235).

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция); Сев. Америка (заносное).

3 (522). **S. vulgaris** (Moench) Garcke, 1869, Fl. N. Mitt.-Deutschl. ed. 9: 64. — *Behen vulgaris* Moench, 1794, Methodus: 709. — *Cucubalus behen* L. 1753, Sp. Pl.: 414. — *C. latifolius* Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: № 2. — *C. venosus* Gilib. 1782, Fl. Lithuan. 2: 165, nom. inval. — *Silene cucubalus* Wibel, 1790, Prim. Fl. Werth.: 241. — *S. inflata* Sm. 1800, Fl. Brit.: 467, nom. illeg. — *S. commutata* Guss. 1827, Fl. Sicul. Prodr. 1: 499. — *S. puberula* Jord. ex Boreau, 1857, Fl. Centre Fr. ed. 3, 2: 94, non Bertol. 1842. — *S. wallichiana* Klotzsch, 1862, Bot. Ergebn. Reise Waldem.: 139, tab. 30. — *S. venosa* (Gilib.) Asch. 1864, Fl. Prov. Brandenb. 1: 86. — *S. cucubalus* var. *bosniaca* Beck, 1891, Ann. Naturh. Mus. (Wien), 6: 333. — *S. bosniaca* (Beck) Hand.-Mazz. 1905, Österr. Bot. Zeitschr. 55: 428. — *S. latifolia* (Mill.) Britten et Rendle, 1907, List Brit. Seed-Pl. Ferns: 5, non Poir. 1789. — *S. vulgaris* (Moench) Garcke var.

* Г. А. Лазьков.

commutata (Guss.) Coode et Cullen, 1967, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 28, 1: 3. — *Oberna pubicaulis* Galushko ex Taisumov, 2009, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 5: 70. — ?*Silene cserei* auct. non Baumg.: Карягин, 1952, Фл. Азерб. 3: 323.

Описан из Европы. Lectotypus (Aeschimann, Vocquet, 1983: 204): Herb. Linn. 582.4 (LINN).

ВП; ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ЦК:** В. Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 40); для всех горных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 256); **ЦЗ:** Лори.; для всех районов Грузии (Гвинианидзе, 1978: 132); **ЮЗ:** Дар. (Гроссгейм, 1945: 235).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Южн. Азия; Сев., Центр. Африка; Сев. Америка (заносное).

Sect. 2. **Fimbriatae** (Boiss.) Bornm.

4 (523). **S. lacera** (Steven) Sims, 1821, Curtis's Bot. Mag. 48: tab. 2255. — *Cucubalus lacerus* Steven, 1812, Mém. Soc. Nat. Moscou, 3: 262.

Описан с Кавказа («Inter fragmina schistosa ad rivum Chodjal sub pago Chinalug»).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК; СЗЗ; ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд.

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ЦК:** В. Кум. (Галушко, 1978: 255); **ЮЗ:** Севан. (Шишкин, Аветисян, 1956: 124).

Эндемик.

5 (524). **S. multifida** (Adams) Rohrb. 1868, Monogr. *Silene*: 88. — *Cucubalus multifidus* Adams, 1805, in Weber u. Mohr, Beitr. Naturk. 1: 57. — *Silene fimbriata* Sims, 1806, Curtis's Bot. Mag. 23: tab. 908. — *S. macrophylla* Lag. 1816, Gen. Sp. Pl.: 15.

Описан из Грузии. Lectotypus (Лазьков, 1996: 104): «In summitate montis Kaischaur, Adams» (LE!).

ВП: В. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Занг., Мегр.-Зан.

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; всех лесных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 255); **ЗЗ:** Рион.-Квир. (Гроссгейм, 1945: 236); всех районов Грузии (Гвинианидзе, 1978: 133); **ЮЗ:** Дар. (Шишкин, Аветисян, 1956: 124), Ю. Караб. (Гроссгейм, 1945: 236).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

Sect. 3. **Procumbentes** (Chowdhuri) Devyatov et V. N. Tikhom.

6 (525). **S. procumbens** Murray, 1786, Comment. Götting. ser. 2, 7: 83, tab. 2, fig. 1–6.

Описан с Урала («Nullo adscripto nomine huius semina inter Uralensia multa a. 1779 collecta a generosissima L. B. ab Asch obtinui, quae subsequente anno terae mandata demum a. 1784 flores tulerunt»). *Lectotypus* (Lazkov, hoc loco): [Icon] J. A. Murr. 1786, Comment. Götting. ser. 2, 7: tab. 2, fig. 1–6.

Указан для **ЗП**: З. Ставр. (Гроссгейм, 1945: 236; Танфильев, Кононов, 1987: 40).

Вост. Европа; Сев., Ср. Азия.

Subgen. 2. *Siphonomorpha* (Otth) Endl.

Sect. 1. *Saxifragoideae* Willk.

7 (526). **S. lenkoranica** Lazkov, 2010, Бот. журн. 95, 10: 1483.

Описан из Азербайджана. *Турпу*: «Transcaucasia, Azerbajdjan, prov. Baku, distr. Lenkoran, in monte Nodus-Galasi, 16 VIII 1928, B. Klopotovskyy» (LE!).

Т.

Эндемик.

Sect. 2. *Siphonomorpha* Otth

8 (527). **S. nutans** L. 1753, Sp. Pl.: 417.

Описан из Северной Европы. *Lectotypus* (Jeanmonod, Vocquet, 1983: 394): Herb. Linn. 583.18 [specim. medium] (LINN).

Указан для **ЗП**: З. Ставр. (Гроссгейм, 1945: 254); **ЗК**: Уруп-Теб. (Танфильев, Кононов, 1987: 41).

Европа; Средиз.; Сев. Азия.

9 (528). **S. italica** (L.) Pers. 1805, Syn. Pl.: 498. — *Cucubalus italicus* L. 1759, Syst. Nat. ed. 10, 2: 1030.

Описан, вероятно, из Италии. *Lectotypus* (Ghafoor in Jafri, El-Gadi, 1978: 85): Herb. Linn. 582.13 (LINN).

ЗП; **ВП**: В. Ставр.; **ЗК**; **ЦК**; **ВК**; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ**; **ЮЗ**: Ерев., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб; **Т.**

Указан для **ВП**: Тер.-Сулак.; **СЗЗ**: Пшад.-Джубг.; **ЦЗ**: Триал.-Н. Карг., Лори.; **ВЗ**: Н. Кур., Караб.; **ЮЗ**: Севан., Дар. (Гроссгейм, 1945: 254).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. (Туркменистан) Азия; Сев. Африка.

Sect. 3. *Spergulifoliae* (Boiss.) Schischk.

10 (529). **S. alpicola** Schischk. 1927, Изв. Томск. унив. 77, 3: 291.

Описан с Западного Кавказа. *Lectotypus* (Лазьков, 1996: 102): «Кубанская экспедиция, Б. Бамбак (Парныгу), течение р. Бамбачки (гай Андреевского), 18 VII 1906, Б. Н. Клопотов» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЗЗ:** Абх.

Эндемик.

11 (530). **S. argentea** Ledeb. 1842, Fl. Ross. 1: 311. — *S. pruinosa* Boiss. 1842, Diagn. Pl. Or. sér. 1, 1: 23. — *S. cappadocica* Boiss. et Heldr. 1849, in Boiss. Diagn. Pl. Or. sér. 1, 8: 86. — *S. pestalozzae* Boiss. 1849, l. c. 8: 87. — *S. brachycarpa* Boiss. et Bal. 1859, in Boiss. Diagn. Pl. Or. sér. 2, 6: 29. — *S. armeniaca* Rohrb. 1867, Index Sem. Horto Bot. Berol. App. 2: 5. — *S. brotherana* Sommier et Levier, 1893, Тр. Петерб. бот. сада, 13: 36. — *S. cappadocica* Boiss. et Heldr. β. *glandulosa* Freyn, 1895, Bull. Herb. Boiss. 3: 78. — *S. muradica* Schischk. 1920, Вестн. Тифл. бот. сада, 1: 27. — *S. supina* Bieb. subsp. *pruinosa* (Boiss.) Chowdhuri, 1957, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 22: 266.

Описан из Закавказья. *Л е с т о т ы п у с* (Лазьков, 1996: 101): «E provinciis transcaucasicis occidentalibus versus fines turcicas, Nordmann» (LE!).

?ЗЗ: Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Месх.

Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Ирак).

Встречаются формы, промежуточные между *S. argentea* и *S. spergulifolia* (Willd.) Bieb.

12 (531). **S. arguta** Fenzl, 1842, Pugil. Pl. Nov. Syr. Tauri Occ.: 8. — *S. sisia-nica* Boiss. et Buhse, 1860, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, 12: 37. — *S. prilipkoana* Schischk. 1936, Тр. Бот. инст. АН АзербСССР, 2: 277. — *S. pachyneura* Schischk. 1937, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 3: 191.

Описан из Турции («Hab. in subalpinis ad alpinis Tauri occidentalis (Kotschy. — Specimen unicum)»). *Л е с т о т ы п у с* (Lazkov, hoc loco): «In monte Tauro, aestate, 1836, № 83, Th. Kotschy» (LE!).

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия (Турция, Ирак, Иран).

13 (532). **S. caucasica** Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 622. — *S. tatjanae* Schischk. 1937, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 3: 179.

Описан из Дагестана. *Л е с т о т ы п у с* (Melzheimer, 1988: 431): «Tufandagh, 31 VII 1830 [С. А. Мейер]» (LE!).

ВК; ВЗ: Алаз.-Агрич.; **ЮЗ:** Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Указан для **ВЗ:** Ширв. (Гроссгейм, 1945: 252).

Эндемик.

14 (533). **S. cephalantha** Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 613. — *S. transcaucasica* Bordz. 1912, Тр. Бот. сада Юрьев. унив. 13: 19. — *S. repens* auct. non Patr.: Boiss. 1867, l. c.: 614.

Описан из Турции («Hab. in Armenia Turcica ad Palanteuken (Ку Suppl. 774)»). *Л е с т о т ы п у с* (Lazkov, hoc loco): «Iter Cilicico-Kurdicum 1859. Plantae in Karduchia ad Erzerum lectae. Suppl. 774 *Silene cephalantha* Boiss. Crescit in Palantekin frequens alt. 7500 ped., 10 VIII 1859, T. Kotschy» (G; isolectotypi — W!, WU).

ВК: Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ; ВЗ:** Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ.**

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

- 15 (534). **S. caespitosa** Steven, 1812, Mém. Soc. Nat. Moscou, 3: 262.
 Описан из Азербайджана («In rupibus circa pagum Sudur provinciae Kubensis, Fl. Junio»). *Lectotypus* (Lazkov, hoc loco): «Alp. Cauc. or.» (LE!).
БК: Кубин.
 Эндемик.
- 16 (535). **S. commelinifolia** Boiss. 1842, Diagn. Pl. Or. sér. 1, 1: 35. — *S. heterophylla* Freyn, 1897, Bull. Herb. Boiss. 5, 1: 585. — *S. commelinifolia* var. *ovatifolia* Melzh. 1988, in Rech. f. Fl. Iran. 163: 61.
 Описан по гербарным материалам из Ирана и Турции. *Lectotypus* (Melzheimer, 1988: 460): «Armenia, № 4206, Aucher-Eloy» (G; isolecotypus — LE!).
ЮЗ: Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.
 Юго-Зап. Азия (Ирак, Иран).
- 17 (536). **S. depressa** Bieb. 1808, Fl. Taur. Cauc. 1: 336.
 Описан из Грузии. *Lectotypus* (Лазьков, 1996: 102): «Ex Iberia, 1806, Steven» (LE!).
ЦЗ: Карт.-Ю. Ос., Лори.; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Занг., Ю. Караб.
 Указан для **ЮЗ:** Мегр.-Зан. (Гроссгейм, 1945: 252).
 Эндемик.
- 18 (537). **S. humilis** C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 215.
 Описан из Дагестана. *Lectotypus* (Лазьков, 1996: 103): «Inter fragmina schisti in alpibus Tufandagh cum Sedo roseo, 31 VII 1830, № 164 [C. A. Meyer]» (LE!).
БК.
 Эндемик.
- 19 (538). **S. ikonnikovii** Lazkov, 1996, Бот. журн. 81, 7: 109.
 Описан из Дагестана. *Турис:* «Агульский р-н Дагестана, альп. область близ перевала Кокмагдаг, h — 3200 м, 4 VIII 1940, Р. Еленевский» (LE!).
БК: В. Сулак., Ман.-Самур.
 По-видимому, является гибридом между *S. cephalantha* и *S. caucasica*. По признакам близок к *S. cephalantha*, но отличается железисто опушенной чашечкой.
- 20 (539). **S. kubanensis** Sommier et Levier, 1895, Тр. Петерб. бот. сада, 13: 37.
 Описан с Кавказа. *Lectotypus* (Лазьков, 1996: 99): «Kuban in alta valle fl. Tieberda ad rupes, 1500 m, 31 VIII 1890, S. L.» (LE!).
ЗК: В. Куб.
 Эндемик.
- 21 (540). **S. linearifolia** Otth, 1824, in DC. Prodr. 1: 374. — *S. petraea* Adams, 1805, in Weber u. Mohr, Beitr. Naturk. 1: 58, non Waldst. et Kit. 1803. — *S. angustifolia* Bieb. 1808, Fl. Taur. Cauc. 1: 337, non Poir. 1789. — *S. melikjanii* Taisumov et Teimurov, 2010, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 115, 1: 70.

Описан с Кавказа («in Alpibus Caucasicis»). *Lectotypus* (Lazkov, hoc loco): «Alp. Sauc., m. Steven» (G, photo — LE!).

ЦК: В. Тер.; **ВК; ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Н. Кур.

Эндемик.

22 (541). **S. lipskyi** Lazkov, 1996, Бот. журн. 81, 4: 96. — *S. humilis* auct. non C. A. Mey., p. p.: Шишк. 1936, Фл. СССР, 6: 662; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 250; Гвиниан. 1978, Фл. Груз. изд. 2, 4: 151.

Описан из Грузии. *Турп* s: «Центральный Кавказ, г. Казбек, 9–11000', 24 VII 1898, Н. Десулави» (LE!).

ЗК: В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.

Эндемик.

23 (542). **S. lychnidea** C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 213. — *S. subuniflora* Sommier et Levier, 1893, Тр. Петерб. бот. сада, 13: 39.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (Лазьков, 1996: 100): «In alpina ad rivulorum margines versus fl. Elborus, alt. 7500 ped., 13 VII 1829, № 20 [C. A. Meyer]» (LE!, cum isoelectotypo).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ЗЗ:** Абх.

Эндемик.

24 (543). **S. meyeri** Fenzl ex Boiss. et Buhse, 1860, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, 12: 38. — *S. delectabilis* Turrill, 1929, Kew Bull. 1929: 225.

Описан из Азербайджана. *Lectotypus* (Лазьков, 1996: 102): «In rupestribus altiorum montium Talusch, VI 1830 [C. A. Meyer]» (LE!).

ЮЗ: Ерев., Севан., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.; **Т:**

Указан для **ЦЗ:** Лори. (Шишкин, Аветисян, 1956: 140).

Юго-Зап. Азия (Иран).

25 (544). **S. montbretiana** Boiss. 1842, Diagn. Pl. Or. sér. 1, 1: 26. — *S. aucheriana* Boiss. 1842, l. c.: 27. — *S. hohenackeri* Boiss. 1853, Diagn. Pl. Or. sér. 2, 1: 71. — ?*S. montbretiana* Boiss. var. *kurdica* Boiss. et Noë, 1856, in Boiss. Diagn. Pl. Or. sér. 2, 5: 55. — *S. oligophylla* Melzh. 1985, Pl. Syst. Evol. 150: 313.

Описан из Ирана. *Lectotypus* (Chowdhuri, 1957: 266): «Persia, Dalm-Kou, № 4208, Aucher-Eloy» (G; isoelectotypus — LE!).

Т:

Юго-Зап. Азия (Иран).

26 (545). **S. palinotricha** Fenzl ex Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 621. — *S. grossheimii* Schischk. 1931, Тр. геобот. обслед. пастб. Азерб. ССР, сер А, 7: 89.

Описан из Ирана. *Lectotypus* (Ghazanfar, 1983: 106): «Pl. Pers. bor., in jugo Nasserou m Demavend, 21 VI 1843, № 344, Th. Kotschy» (BM!; isoelectotypi — G, LE!, W!).

ВЗ: Ширв.

Юго-Зап. Азия (Иран).

27 (546). **S. pungens** Boiss. 1842, Diagn. Pl. Or. sér. 1, 1: 32. — *S. chustupica* Nersesian, 2007, Фл. растит. и раст. рес. Арм. 16: 104, рис. 1, 2.

Описан из Турции. *Л е с т о т у р у с* (Ghazanfar, 1983: 106): «In Olympo Armeniae, 29 V 1849, № 450, Aucher-Eloy» (G-BOIS; isolectotypi — K!, LE!).

ЮЗ: Занг.

Юго-Зап. Азия (Турция, Ирак, Иран).

28 (547). **S. pygmaea** Adams, 1805, in Weber u. Mohr, Beitr. Natur. 1: 59. — *S. spathulata* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 341, nom. illegit., superfl. — *S. petraea* Ledeb. et Schrank, 1824, Syll. Pl. Nov. 1: 211. — *S. ledebourii* Heynh. 1846, Alph. Aufz. Gew. 2: 667.

Описан из Осетии («Hab. in Ossetia»). *Л е с т о т у р у с* (Lazkov, hoc loco): «Habitat ad Lars pago Ossetio, Adams» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Эндемик.

29 (548). **S. schafta** S. G. Gmel. ex Fisch. et C. A. Mey. 1838, in Hohen. Bull. Soc. Nat. Moscou, 12: 397. — *S. pichleri* Stapf, 1886, Denkschr. Akad. Wiss. Math.-Naturw. Kl. (Wien), 51: 283.

Описан из Азербайджана. *Л е с т о т у р у с* (Melzheimer, 1988: 466): «In rupestribus montis Keridachi, tr. Suwant, X, Hohenack.» (LE!).

Т.

Юго-Зап. Азия (Иран).

30 (549). **S. spergulifolia** (Willd.) Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 305. — *Cucubalus spergulifolius* Willd. 1799, Sp. Pl. 2, 1: 690.

Описан из Армении. *Л е с т о т у р у с* (Melzheimer, Greuter, 1979: 619): «[Armenia] Vieweg» (B-WILLD (B –W 08600 –01 0)).

ЦК: Малк., В. Тер.; **ВК; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт. (Гвинианидзе, 1978: 146), Лори.; **ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗ:** Дар. (Гроссгейм, 1945: 247).

Юго-Зап. Азия (Турция).

31 (550). **S. supina** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 336.

Описан с Кавказа. *Л е с т о т у р у с* (Лазьков, 1996: 101): «Ex Caucaso, ad thermas constantinontanas, 1798» (LE!).

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.

Вост. Европа.

Образцы, приведенные во «Flora Iranica» (Melzheimer, 1988) под названием *S. supina*, относятся к видам *S. microphylla* Boiss. и *S. montbretiana*.

Sect. 4. **Odontopetalae** Schischk. ex Chowdhuri

32 (551). **S. raddeana** Trautv. 1873, Тр. Петерб. бот. сада, 2: 472. — *S. araxina* Trautv. 1875, l. c. 3, 2: 278. — *S. artwinensis* Schischk. 1927, Изв. Томск. унив. 77, 3: 291.

Описан из Турции. *Lectotypus* (Лазьков, 1996: 99): «Aschich-dade, 29 VI 1871, Radde» (LE!).

ЮЗ: Дар., Нах.

Указан для **ЮЗ:** Занг. (Шишкин, Аветисян, 1956: 124).

Юго-Зап. Азия (Турция).

Отличается от *S. odontopetala* Fenzl только наличием густых железистых волосков на листьях. Развитость стеблевых листьев имеет скорее экологическую обусловленность.

33 (552). **S. odontopetala** Fenzl, 1842, Pugil. Pl. Nov. Syr. Tauri Occ. 1: 9; Melzh. 1988, in Rech. f. Fl. Iran. 163: 374, tab. 120, 447 (fig. 1–3), excl. syn. *S. raddeana* Trautv. — *S. physocalyx* Ledeb. 1842, Fl. Ross. 1: 321.

Описан из Турции («Hab. in alpibus Tauri occidentalis (Kotschi, coll. № 82)»). *Lectotypus* (Lazkov, hoc loco): «Hab. monte Tauro, Aestate 1836, № 82, Th. Kotschi» (G; isolectotypus — LE!).

Указан для **ЗЗ:** Адж. (Дмитриева, 1960: 321); **ЮЗЗ:** Месх. (Гвинианидзе, 1978: 134).

Юго-Зап. Азия (Ливан, Сирия, Турция).

Sect. 5. **Succulentae** (Boiss.) Chowdhuri

34 (553). **S. succulenta** Forssk. 1775, Fl. Aegypt.-Arab.: 89.

Описан из Египта. *Lectotypus* (Greuter, 1997: 253): «Alexandriae ad catacombas, № 567, Forsskål» (C).

ЮЗ: Ерев.

Средиз.; Сев. Африка.

В Гербарии LE имеется единственный образец этого вида: «Арм. ССР, Вединский район, пески между с. Веди и Гореван, 30 V 1939, А. Оганесян». При последующих трехкратных поисках в указанном на этикетке месте вид не найден, о чем свидетельствует прикрепленная на гербарный лист заметка А. А. Гроссгейма. Произрастание этого вида на Кавказе нуждается в подтверждении. Возможно, это был случайный занос или этикетка фальшивая.

Sect. 6. **Sclerocalycinae** (Boiss.) Schischk.

35 (554). **S. bupleuroides** L. 1753, Sp. Pl.: 421. — *S. longiflora* Ehrh. 1792, Beitr. Naturk. 7: 144. — *S. ucrainica* Klokov, 1952, Фл. УРСР, 4: 656. — *S. mariae* Klokov, 1952, цит. соч.: 657. — *S. odessana* Klokov, 1952, цит. соч.: 657.

Описан из Ирана. *Lectotypus* (Greuter, 1997: 264): Herb. Clifford: 171, «*Silene* 3, fol. 1» (BM).

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ.**

Указан для **ВЗ:** Мург.-Муровд. (Гроссгейм, 1945: 244).

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. (Туркменистан) Азия.

36 (555). **S. chlorifolia** Sm. 1789, Pl. Icon. Ined. 1: 13, tab. 13. — *S. perfoliata* Otth, 1824, in DC. Prodr. 1: 384. — *S. morganae* Freyn, 1897, Bull. Herb. Boiss. 5: 586.

Описан из Турции. *Lectotypus* (Melzheimer, 1988: 399): «Armenia, Tournefort» (OXF).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **БК;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ;** **Т.**

Указан для **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Н. Кур. (Гроссгейм, 1945: 246).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

37 (556). **S. lasiantha** C. Koch, 1841, Linnaea, 15: 712. — *S. sahendica* Boiss. et Buhse, 1860, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, 12: 38. — *S. marschallii* auct. non C. A. Mey.: Melzh. 1988, in Rech. f. Fl. Iran. 163: 387, p. p., quoad syn. *S. lasiantha* et *S. sahendica*.

Описан из Армении («In Armenia occidentali»).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос., Лори.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

38 (557). **S. longidens** Schischk. 1922, Бюлл. Муз. Груз. 1: 16.

Описан из Азербайджана. *Lectotypus* (Лазьков, 1996: 100): «Gub. Vaku, distr. Shemacha, in declivis m. Nijal supra p. Zarnov, in abruptis lapidosis, 6100', 31 VII 1900, Alexeenko» (TBI; isolectotypi (6) — LE!).

ВЗ: Ширв.

Эндемик.

39 (558). **S. peduncularis** Boiss. 1842, Diagn. Pl. Or. sér. 1, 1: 30. — *S. arguta* Boiss. et Buhse, 1860, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, 12: 37, non Fenzl, 1842.

Описан из Ирана. *Lectotypus* (Melzheimer, 1988: 408): «Seidkhoji, № 4219, Aucher-Eloy» (G; isolectotypus — K!).

ЮЗ: Нах.

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

Растения из Нахичевани несколько отличаются от типовых образцов *S. peduncularis*, и, возможно, относятся к новому виду. Для окончательного решения этого вопроса необходимы дополнительные сборы.

40 (559). **S. solenantha** Trautv. 1881, Тр. Петерб. бот. сада, 7, 2: 421.

Описан из Дагестана. *Lectotypus* (Лазьков, 1996: 105): «Schalbus Dagh, 1880, № 119, Becker» (LE!; isolectotypi — LE (2)!, TBI).

БК: Ман.-Самур.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Эндемик.

41 (560). **S. tenella** C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 216.

Описан из Талыша. *Lectotypus* (Лазьков, 1996: 105): «M. Talusch, № 1867, Meyer» (LE!).

Т.

Юго-Зап. Азия (Иран).

Sect. 7. **Lasiostemones** (Boiss.) Schischk.

42 (561). **S. marschallii** C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 214. — *S. lasiopetala* Fenzl, 1842, Pugil. Pl. Nov. Syr. Tauri Occ. 1: 8. — *S. puberula* Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 636, non Bertol. — *S. propinqua* Schischk. 1922, Бюлл. Муз. Груз. 1: 14, табл. 4; Melzh. 1988, in Rech. f. Fl. Iran. 163: 384, tab. 131, 449 (fig. 4–6). — *S. praestans* Schischk. 1941, Бот. мат. (Ленинград), 9, 3: 106.

Описан из Азербайджана. *Lectotypus* (Лазыков, 1996: 106): «In altioribus montibus Talüsch, locis siccis lapidosis, VI 1830 [C. A. Meyer]» (LE!).

ЦЗ: Карг.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ;** **Т.**

Указан для **ВК:** В. Сулак. (Гуссейнов, 1990: 235), Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд. (Гроссгейм, 1945: 243).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

Указания для **ВК**, по-видимому, ошибочные.

Sect. 8. **Tataricae** Chowdhuri

43 (562). **S. eremitica** Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 644. — *S. salsuginosa* Fomin, 1904, Тр. Тифл. бот. сада, 6, 3: 34.

Описан из Ирана. *Lectotypus* (Coode, Cullen, 1967: 202): «[Iran] in eremose arenoso subsalso prov. Aderbidjan Persise inter Khoi et Seidkhodji, Szowits» (G).

ЮЗ: Ерев., Нах.

Указан для **ЮЗ:** Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

44 (563). **S. tatarica** (L.) Pers. 1805, Syn. Pl.: 497. — *Cucubalus tataricus* L. 1753, Sp. Pl.: 415. — *Silene ruthenica* Otth, 1824, in DC. Prodr. 1: 370.

Описан из Восточной Европы («in Tataria»). *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 1994: 156): Herb. Linn. 582.15 (LINN!).

Указан для бассейна Терека без указания конкретного местонахождения (Гроссгейм, 1945: 241).

Сев., Центр., Вост. Европа.

Sect. 9. **Compactae** (Boiss.) Schischk.

45 (564). **S. compacta** Fisch. ex Hornem. 1813, Hort. Bot. Hafn. 1: 417. — *S. ispi-rensensis* Khokhr. 1997, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 102, 4: 46, non Boiss. 1856.

Описан, вероятно, с Кавказа («Hab. in Russia?»).

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставро.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Тиб.; **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ;** **ЦЗ;** **ВЗ;** **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Мегр.-Зан.

Указан для всех горных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 250); **ЗК:** Адаг.-Пшиш., В. Куб.; **СЗЗ:** Пшад.-Джубг. (Гроссгейм, 1945: 240); для всех районов Грузии (Гвинианидзе, 1978: 136).

Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

Sect. 10. **Rigidulae** (Boiss.) Schischk.

46 (565). **S. arenosa** C. Koch, 1841, *Linnaea*, 15: 711. — *S. cabulica* Bornm. 1934, *Bot. Jahrb. Syst.* 66: 221. — *S. austroiranica* Rech. f., Aellen et Esfand. 1951, *Bot. Jahrb. Syst.* 75: 349.

Описан из Закавказья («Prope flumen Araxin in arena frequenter»). *Lectotypus* (Lazkov, hoc loco): «Ad Araxen, 1837, № 873, Koch» (LE!).

ЮЗ: Ерев., Нах.

Указан для **ЮЗ:** Мегр.-Зан. (Гроссгейм, 1945: 254).

Юго-Зап. (от Турции до Пакистана), Южн. (вост. Пакистан) Азия.

Sect. 11. **Suffruticosae** (Rohrb.) Schischk.

47 (566). **S. fruticulosa** Bieb. 1798, *Tabl. Prov. Mer. Casp.*: 115. — *S. suffrutescens* Bieb. 1800, *Beschr. Länd. Terek Casp.*: 175, nom. illeg., superfl. — *S. caspica* Pers. 1805, *Syn. Pl.* 1: 497, nom. illeg., superfl. — *S. leptopetala* Schrenk, 1844, *Bull. Acad. Sci. Pétersb.* 2: 198.

Описан из Азербайджана. *Lectotypus* (Лазьков, 2002: 130): «Ex montibus Schirvanensibus, a. 1796» (LE!).

ВЗ: Ширв.

Вост. Европа.

Sect. 12. **Chloranthae** (Rohrb.) Schischk.

48 (567). **S. chlorantha** (Willd.) Ehrh. 1792, *Beitr. Naturk.* 7: 144. — *Cucubalus chloranthus* Willd. 1787, *Fl. Berol. Prodr.*: 155, tab. 5, fig. 9. — *S. elata* Otth, 1824, in DC. *Prodr.* 1: 370. — ?*S. subspathulata* Schur, 1866, *Enum. Pl. Transsilv.*: 102.

Описан из Германии.

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЦК:** В. Кум.

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев. Азия.

49 (568). **S. chloropetala** Rupr. 1869, *Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.)*, sér. 7, 15, 2: 195 (Fl. Cauc.).

Описан из Дагестана. *Lectotypus* (Шишкин, 1936: 623, «тип»): «Caucasus orient., Dagestania superior montosa, Anzuch, supra fl. Avar., 640-670 h., 16 VII 1861, Ruprecht» (LE!).

ВК.

Эндемик.

50 (569). **S. dagestanica** Rupr. 1869, *Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.)*, sér. 7, 15, 2: 194 (Fl. Cauc.).

Описан из Дагестана. *Lectotypus* (Шишкин, 1936: 623, «тип»): «Caucasus orient., Dagestania superior montosa, Kaputscha, in rupib. ad fl., pr. Kalaki, 800 hex., 17 VII 1861, Ruprecht» (LE!, cum isolectotуро).

ВК: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.

Эндемик.

51 (570). **S. panjutinii** Kolak. 1980, Фл. Абх. изд. 2, 1: 177. — *S. boissieri* Panjutin, 1946, Бот. мат. (Ленинград), 9, 3: 107, non J. Gay ex Coss., 1849.

Описан из Абхазии. *Л е с т о т у р у с* (Гвинианидзе, 1978: 142): «Абхазия, Бзыбский хребет, ур. Япсху, скалистое плато, 1800 м, 28 VII 1936, П. Панютин» (ТВИ; *isolectotypus* — LE!).

ЗЗ: Абх.

Эндемик.

52 (571). **S. saxatilis** Sims, 1806, Curtis's Bot. Mag. 18: tab. 689; Vieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 338. — *S. tenuis* Willd. 1809, Enum. Pl. Horti Berol. 1: 474. — *S. ruprechtii* Schischk. 1925, в Гроссг., Сосн. и Шишк. Фл. Тифл. 1: 204. — *S. zangezura* Jelen. 1960, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 64, 5: 120.

Описан по растениям, выращенным в ботаническом саду, полученным, вероятно, с Кавказа (в протологе по ошибке указано «из Сибири») («Introduced a few years since from Siberia by Mr. Loddiges, Nurseryman et Hackney»). *Л е с т о т у р у с* (Lazkov, hoc loco): [Icon] J. Sims, 1806, Curtis's Bot. Mag.: tab. 689.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК;** **ВК;** **ЗЗ;** **ЦЗ;** **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Севан., Дар., Нах., Занг.

Указан для всех горных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 252); для всех районов Грузии (Гвинианидзе, 1978: 139); **ЮЗ:** Ерев., Мегр.-Зан. (Шишкин, Авестисян, 1956: 132).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

53 (572). **S. shahrudensis** Rech. f. 1951, Bot. Jahrb. Syst. 75: 352. — *S. parrowiana* auct. non. Boiss. et Hausskn. ex Boiss.: Лазьков, 1996, Бот. журн. 81, 8: 106.

Описан из Ирана. *Т у р у с:* «Plants of Iran, Shahrud, Khorassan, on dry mountain slope, in clumps, fl. yellow, plant viscid, 26 IX 1940, № 16943, W. Koelz» (W!).

ЮЗ: Нах.

Юго-Зап. Азия (Иран).

Sect. 13. **Otites** (Adans.) Otth

54 (573). **S. borysthenica** (Gruner) Walters, 1964, Feddes Repert. (Beih.) 69, 1: 41. — *S. otites* Sm. *γ. borysthenica* Gruner, 1868, Bull. Soc. Nat. Moscou, 41, 3: 126. — *Cucubalus parviflorus* Ehrh. 1792, Beitr. Naturk. 7: 143, non Lam. 1778. — *Silene parviflora* (Ehrh.) Pers. 1805, Syn. Pl. 1: 497, non Moench, 1794. — *Viscago parviflora* Hornem. 1813, Hort. Bot. Hafn.: 411. — *Otites parviflorus* (Ehrh.) Grossh. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 255. — *Silene borysthenica* subsp. *parviflora* (Hornem.) Šourková, 1977, Preslia, 49, 1: 12.

Описан из Украины («In collibus arenosis reg. demissae ad Borysthenem, d. 26 Jul.»).

ЗП; **ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЦК:** В. Тер.

Указан для **ЗК:** Уруп-Теб., В. Куб. (Танфильев, Кононов, 1984: 40); **ЦК:** В. Кум. (Гроссгейм, 1945: 255).

Сев., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев., Центр. Азия.

55 (574). **S. cyri** Schischk. 1925, в Гроссг., Сосн. и Шишк. Фл. Тифл. 1: 102, in clav. — *Otites cyri* (Schischk.) Grossh. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 255. — *Silene turcomanica* Клеоров, 1936, Журн. Инст. бот. АН УРСР, 9: 108.

Описан с Кавказа. Лектотипус (Гвинианидзе, 1978: 156): «Tiflis, V 1867, Radde» (TGM; isolectotypi (2) — LE!).

ВП: Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ВК; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт., Лори.; **ВЗ; ЮЗ:** Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ВП:** В. Ставр.; **ЮЗ:** Дар. (Гроссгейм, 1945: 255).

Вост. Европа; Юго-Зап. (Иран), Ср. (Туркменистан) Азия.

56 (575). **S. chersonensis** (Zapal.) Клеоров, 1929, Вісн. Київ. бот. саду, 9: 9. — *S. densiflora* d'Urv. var. *chersonensis* Zapal. 1911, Consp. Fl. Gallic. Crit. 3: 489. — *Otites densiflorus* (d'Urv.) Grossh. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 255, p. p., quoad syn. *Silene chersonensis*. — *Silene densiflora* auct. non d'Urv.: Лазьков, 1996, Бот. журн. 81, 8: 109, p. p., quoad syn. *S. chersonensis*.

Описан из Украины.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп.-Теб.; **ЦК; ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.

Центр., Вост. Европа; Сев., Центр., Азия.

57 (576). **S. densiflora** d'Urv. 1822, Mém. Soc. Linn. Paris 1: 303; Лазьков, 1996, Бот. журн. 81, 8: 109, p. p., excl. syn. *Silene chersonensis* (Zapal.) Клеоров et *S. donetzica* Клеоров. — *Otites densiflorus* (d'Urv.) Grossh. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 255, p. p., excl. syn. *Silene chersonensis* et *S. donetzica*. — *Silene otites* auct. non (L.) Sm.: Coode et Cullen, 1967, Fl. Turk. 2: 203, p. p., quoad syn. *S. densiflora*.

Описан из Крыма. Лектотипус (Wrigley, 1986: 76): «In pascuis Tauriae, prope Kerch, 1820, D'Urville» (P; isolectotypus — K!).

ЗП: Аз.-Куб.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.

Указан для **ЗП:** З. Ставр. (Гроссгейм, 1945: 255; Галушко, 1978: 257; Танфильев, Кононов, 1987: 40); **ВК:** Ман.-Самур. (Гуссейнов, 1990: 235).

Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).

По-видимому, указания относятся к другому виду.

58 (577). **S. donetzica** Клеоров, 1936, Журн. Инст. бот. АН УРСР, 9: 116. — *S. densiflora* d'Urv. subsp. *sillingeri* Hendrych, 1948, Stud. Bot. Čechosl. 9, 2-4: 116. — *S. donetzica* subsp. *sillingeri* (Hendrych) Šourková, 1977, Preslia, 49, 1: 12. — *Otites densiflorus* (d'Urv.) Grossh. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 255, p. p., quoad syn. *Silene donetzica* Клеоров. — *S. densiflora* auct. non d'Urv.: Лазьков, 1996, Бот. журн. 81, 8: 109, p. p., quoad syn. *S. donetzica*.

Описан по гербарным материалам из Украины и с Кавказа. Лектотипус (Wrigley, 1986: 75): «USSR, DN3, Ukraine, Stalinskaja Oblast', Amvrosievka distr., in declivibus cretaceis ad fossam stepaceam Vjelyi Jar dictam, 1931, Клеоров» (KW).

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.

Указан для **ЦК:** В. Кум. (Клеоров, 1936: 116).

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа.

От *S. chersonensis* отличается коротко опушенными в нижней части стеблями.

59 (578). **S. roopiana** Kleopow, 1936, Журн. Инст. бот. АН УРСР, 9: 115. — *Otites roopianus* (Kleopow) Grossh. 1945, Фл. Кавк. изд 2, 3: 256. — *Silene otites* auct. non (L.) Sm.: Coode et Cullen, 1967, Fl. Turk. 2: 203, p. p., quoad syn. *S. roopiana*.

Описан из Турции. Lectotypus (Лазьков, 1996: 109): «Armenia Rossica, in via inter pagos Czuruk et Sarabkhana (prov. Kars), 26 VI 1910, F. Roop» (LE!).

Указан для **ЗЗ**: Адж.; **ЮЗЗ**: Месх. (Гвинианидзе, 1978: 157).

Юго-Зап. Азия (Турция).

От других видов группы *S. otites* отличается изогнутыми и полуприжатými волосками на листьях, напоминающими таковые у *S. borysthenica*.

60 (579). **S. wolgensis** (Hornem.) Otth, 1824, in DC. Prodr. 1: 370. — *Viscago wolgensis* Hornem. 1819, Suppl. Hort. Bot. Hafn.: 48. — *Silene effusa* Fisch. ex Otth, 1824, in DC. Prodr. 1: 370. — *Otites wolgensis* (Hornem.) Grossh. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 255. — *O. orae-syvashicae* Klokov, 1952, Фл. УРСР, 4: 658. — *Silene orae-syvashicae* (Klokov) Czer. 1981, Сосуд. раст. СССР: 171.

Описан из России («W. suppl. Hab. ad Wolgam D. F. intr. 1815»).

ЗП; **ВП**; **ЦК**: В. Тер.; **ВК**: Ассо-Арг., Ман.-Самур.

Указан для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 257); **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК**: В. Кум. (Гроссгейм, 1945: 255).

Юго-Вост., Вост. Европа; Сев., Ср., Центр. Азия.

Sect. 14. **Dianthoideae** (Chowdhuri) Lazkov

61 (580). **S. dianthoides** Pers. 1805, Syn. Pl. 1: 500. — *S. melanophylla* Boiss. 1842, Diagn. Pl. Or. sér. 1, 1: 24. — *S. calyculata* C. Koch, 1847, Linnaea, 19: 56. — *S. marcowiczii* Schischk. 1922, Бюлл. Муз. Груз. 1: 11. — *S. froedinii* Rech. f. 1951, Bot. Jahrb. Syst. 75: 350.

Описан с «Востока».

ЗК: Бело-Лаб., В. Куб.; **ЦК**: Малк., В. Тер.; **ЗЗ**: Инг.-Рион.; **ЦЗ**: Карг.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карг., Лори.; **ВЗ**: Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ**: Араг.; **ЮЗ**.

Указан для **ЗЗ**: Адж. (Хохряков, 1995: 19); **ВК**: В. Сулак., Ман.-Самур. (Гусейнов, 1990: 235).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

По-видимому, указан для **ВК** ошибочно.

Subgen. 3. **Silene**

Sect. 1. **Dichotomae** (Rohrb.) Chowdhuri

62 (581). **S. dichotoma** Ehrh. 1792, Beitr. Naturk. 7: 143; Coode a. Cullen, 1967, Fl. Turk. 2: 234, p. p., excl. subsp. *euxina* (Rupr.) Coode et Cullen; Chater et al. 1993, Fl. Europ. ed. 2, 1: 216, p. p., excl. subsp. *euxina*. — *S. talyschensis* Schischk. 1922, Бюлл. Муз. Груз. 1: 7, табл. 2.

Описан из Центральной Европы.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП**: В. Ставр.; **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК**: В. Тер.; **ЗЗ**: Абх.; **Т**.

Указан для **ЦК**: Малк. (Гроссгейм, 1945: 239).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа.

63 (582). **S. iberica** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 335. — *S. thirkeana* C. Koch, 1847, Linnaea, 19: 56.

Описан из Грузии. *Lectotypus* (Лазьков, 1996: 108): «Iberia, Steven» (LE!).

БК: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ**: Карг.-Ю. Ос., Лори.; **ВЗ**: Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ**; **ЮЗ**.

Указан для **БК**: Ассо-Арг. (Очиаури, 1981: 57); **ЗЗ**: Абх., Рион.-Квир. (Гроссгейм, 1945: 239), Адж. (Дмитриева, 1960: 320); **ЦЗ**: Триал.-Н. Карг.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек. (Гроссгейм, 1945: 239).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

64 (583). **S. euxina** (Rupr.) Hand.-Mazz. 1909, Ann. Naturh. Mus. (Wien), 23: 154. — *S. dichotoma* Ehrh. *β. euxina* Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 184 (Fl. Cauc.). — *S. mathei* Pénzes, 1959, Feddes Repert. 62: 20. — *S. euxina* var. *bulgarica* Jordanov et Panov, 1966, Фл. Бълг. 3: 509, 596. — *S. dichotoma* subsp. *euxina* (Rupr.) Coode et Cullen, 1967, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 28, 1: 8.

Описан из Закавказья. *Lectotypus* (Coode, Cullen, 1967: 236): «Transcaucasia occident., Guria, in litore marino pr. Poti, 19 IX 1861» (LE!).

ЗЗ: Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.

Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).

Sect. 2. **Silene**

65 (584). **S. gallica** L. 1753, Sp. Pl.: 417, nom. cons. — *S. anglica* L. 1753, l. c.: 416, nom. rej. — *S. quinquevulnera* L. 1753, l. c.: 416, nom. rej.

Описан из Франции. *Lectotypus* (Greuter, 1995: 102): Herb. Linn. 583.11 (LINN).

ЦК: В. Тер.; **ЗЗ**: Абх., Инг.-Рион., Адж.; **Т**.

Указан для **ЦК**: Малк.; **БК**: Ассо-Арг. (Галушко, 1978: 254); **ЗЗ**: Туап.-Адл., Рион.-Квир. (Гроссгейм, 1945: 240).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция); Сев. Африка.

66 (585). **S. nocturna** L. 1753, Sp. Pl.: 416. — *S. brachypetala* Robill. et Castigl. ex DC. 1815, in DC. et Lam. Fl. Fr. ed. 3, Suppl.: 607.

Описан по гербарным материалам из Италии и Америки. *Lectotypus* (Ghafoor in Jafri, El-Gadi, 1978: 91): Herb. Linn. 583.8 (LINN).

Т.

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. Европа.

Sect. 3. **Psammophilae** (Talavera) Greuter

67 (586). **S. pendula** L. 1753, Sp. Pl.: 418.

Описан с Сицилии и Крита. *Lectotypus* (Talavera, 1978: 162): Herb. Linn. 583.35 (LINN).

ЗП: 3. Ставр.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион. Заносное Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.

Subgen. 4. **Conosilene** (Rohrb.) F. N. Williams

Sect. **Coniomorpha** Otth

68 (587). **S. conica** L. 1753, Sp. Pl.: 418. — *S. subconica* auct. non Friv.: Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1: 256.

Описан из Испании. *Lectotypus* (Melzheimer, 1988: 483): Herb. Linn. 583.30 (LINN).

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Сулак.; **ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг; **ЮЗ.**

Указан для всех районов Предкавказья (Галушко, 1978: 256); **ЗЗ:** Адж. (Гроссгейм, 1945: 234); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Гвинианидзе, 1978: 162), Триал.-Н. Карт. (Гроссгейм, 1945: 234); **ВЗ; ЮЗЗ:** Месх. (Гвинианидзе, 1978: 162).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Иран, Афганистан), Ср. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное).

69 (588). **S. conoidea** L. 1753, Sp. Pl.: 418.

Описан из Испании. *Lectotypus* (Burt, Levis, 1952: 343): Herb. Linn. 583.29 (LINN).

ВК: Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Ширв.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЦЗ:** Лори.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб. (Гроссгейм, 1945: 235); **ЮЗЗ:** Месх. (Гвинианидзе, 1978: 162); **ЮЗ:** Севан., Дар. (Гроссгейм, 1945: 235).

Атл., Сев., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. (Ладожско-Ильменский, Верхне-Днепрский и Волжско-Камский р-ны — заносное) Европа; Средиз.; Юго-Зап. (от Турции и Ирака до Пакистана), Ср., Центр., Вост., Южн. (вост. Пакистан) Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное).

70 (589). **S. coniflora** Nees ex Otth, 1824, in DC. Prodr. 1: 371.

Описан из Месопотамии («in Mesopotamiâ (v. s. ex h. Olivier)»).

ВЗ: Ширв.

Указан для **ЮЗ:** Нах. (Гроссгейм, 1949: 82).

Юго-Зап. (от Турции и Ирака до Пакистана), Ср., Южн. (вост. Пакистан) Азия.

31 (84). **Viscaria** Bernh., nom. cons.*

1 (590). **V. vulgaris** Bernh. 1800, Syst. Verz. Erfurt: 261. — *Lychnis viscaria* L. 1753, Sp. Pl.: 436. — *L. viscosa* Gilib. 1782, Fl. Lituaniæ. 2: 171, nom. inval. — *Vis-*

* Г. А. Лазыков.

caria vulgaris Röhl. 1812, *Deutschl. Fl. ed. 2, 2: 275.* — *Steris viscaria* (L.) Raf. 1840, *Autik. Bot.: 27.* — *Viscaria viscosa* (Gilib.) Asch. 1860, *Fl. Prov. Brandenb. 1: 85;* Горшк. 1936, *Фл. СССР, 6: 576, cum auct. bas. Scop.* — *Silene viscaria* (L.) Jess. 1879, *Deutsche Excurs.-Fl.: 280.* — *Viscaria viscaria* (L.) Voss, 1896, in *Vilm. Blumengärtn. ed. 3: 100, comb. inval.*

Описан из Европы.

ЗП: 3. Ставр.; **ЦК:**

Сев., Центр., Вост. Европа.

Долгое время вид приводился как *V. viscosa* и с разным авторством — (Gilib.) Asch. или (Scop.) Asch. Название базионима — *Lychnis viscosa* Gilib. — «ном. illeg.», так как работа J. E. Gilibert (1782) «*Flora lituanica inchoata*», в которой оно предложено, является безусловно отвергаемой (McNeill et al., 2006: App. VI). *L. viscosa* Scop. должно считаться комбинацией *L. viscosa* (L.) Scop. 1772, *Fl. Carn. ed. 2, 1: 306*, так как оно основано на *Cucubalus viscosus* L. 1753, *Sp. Pl.: 414*. Эти растения в настоящем Конспекте рассматриваются как *Elisanthe viscosa* (L.) Rupr.

32 (85). **Coronaria** Guett.*

Subgen. 1. **Coronaria**

1 (591). **C. tomentosa** A. Br. 1843, *Flora (Regensb.), 26: 368.* — *Agrostemma coronaria* L. 1753, *Sp. Pl.: 436.* — *Lychnis coriacea* Moench, 1794, *Methodus: 709, nom. illeg.* — *Coronaria coriacea* (Moench) Schischk. 1936, *Фл. СССР, 6: 699, comb. inval.*

Описан из Италии. *Lectotypus* (Ghazanfar, Nasir, 1986: 55): *Herb. Linn. 601.2 (LINN).*

ЮЗ: Нах., Занг.; **Т:**

Указан для **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Гвинианидзе, 1978: 117).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Иран, Пакистан), Ср., Южн. (вост. Пакистан) Азия; Сев. Африка.

Subgen. 2. **Coccyganthe** (Rchb.) Devjatov et V. N. Tikhom.

2 (592). **C. flos-cuculi** (L.) A. Br. 1843, *Flora (Regensb.), 26: 386.* — *Lychnis flos-cuculi* L. 1753, *Sp. Pl.: 436.* — *Coccyganthe flos-cuculi* (L.) Fourr. 1868, *Ann. Soc. Linn. Lyon, sér. 2, 16: 345.*

Описан из Европы. *Lectotypus* (Sell in Jonsell, Jarvis, 1994: 158): *Herb. Clifford: 174, «Lychnis 2» (BM).*

ЗП: 3. Ставр.; **ЦК:** В. Тер.

Европа; Средиз.; Сев. Азия.

33 (86). **Elisanthe** (Fenzl) Fenzl*

Sect. 1. **Carpophora** (Klotzsch) Devjatov et V. N. Tikhom.

1 (593). **E. viscosa** (L.) Rupr. 1869, *Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 200 (Fl. Cauc.).* — *Cucubalus viscosus* L. 1753, *Sp. Pl.: 414.* — *Melan-*

* Г. А. Лазыков.

drium viscosum (L.) Čelak. 1968, Lotos, 18: 118. — *Carpophora viscosa* (L.) Tzvel. 2001, Новости сист. высш. раст. 33: 100.

Описан по гербарным материалам из Швеции, Италии и Англии. Lectotypus (Ghazanfar, Nasir, 1986: 64): Herb. Linn. 582.7 (LINN).

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** **ЗК:** Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан.; **Т:**

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Галушко, 1978: 258); **ЦК:** В. Тер. (Гроссгейм, 1945: 259); **ЗЗ:** Адж. (Дмитриева, 1960: 321); **ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Нах., Ю. Караб. (Гроссгейм, 1945: 259).

Сев., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап. (Турция, Сирия, Иран), Ср., Центр. Азия.

Sect. 2. *Cordifoliae* (Chowdhuri) Lazkov

2 (594). **Е. akinfiewii** (Schmalh.) Grossh. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 259. — *Silene akinfiewii* Schmalh. 1892, Ber. Deutsch. Bot. Ges. 10: 287. — *Charesia akinfiewii* (Schmalh.) E. A. Busch, 1926, Тр. Бот. муз. Акад. наук, 19: 183. — *Melandrium akinfiewii* (Schmalh.) Schischk. 1936, Фл. СССР, 6: 709.

Описан с Кавказа («In Caucaso centrali, ad glaciem Harves, 6000', leg. Akinfiew»). Lectotypus (Лазьков, 2010: 1485): «Ледник Харвес, 6000 ф., 12 VII 1891, I. Akinfiew» (LE!).

ЦК: Малк., В. Тер.; **ЗЗ:** Инг.-Рион.

Эндемик.

3 (595). **Е. lazica** (Boiss.) Lazkov, 2010, Бот. журн. 95, 10: 1485. — *Silene lazica* Boiss. 1842, Diagn. Pl. Or. sér. 1, 1: 35.

Описан из Турции («Hab. in Alpibus Lazistani. Aucher pl. exs. № 494»). Lectotypus (Лазьков, 2010: 1485): «Alpes Lazistani, № 494, Aucher-Eloy — Herbar d'Orient» (G; isolectotypi (2) — LE!).

Указан для **ЗЗ:** Адж. (Хохряков, 1995: 19).

Юго-Зап. Азия (Турция).

Sect. 3. *Elisanthe*

4 (596). **Е. noctiflora** (L.) Willk. 1852, Icon. Descr. Pl. Nov. 1: 78. — *Silene noctiflora* L. 1753, Sp. Pl.: 419. — *Melandrium noctiflorum* (L.) Fries, 1843, Bot. Not. (Lund), 10: 178.

Описан из Швеции и Германии. Lectotypus (Jonsell, Jarvis, 1994: 159): Herb. Linn. 183.17 (S).

ЗП; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Мегр.-Зан.; **Т:**

Указан для **СЗЗ:** Пшад.-Джубг.; **ЗЗ:** Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт., Лори.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Ю. Караб. (Гроссгейм, 1945: 259).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Ирак, Иран), Ср., Центр. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное).

Sect. 4. **Petrocoma** (Rupr.) Lazkov

5 (597). **E. hoefftiana** (C. A. Mey.) Lazkov, 2010, Бот. журн. 95, 10: 1485. — *Silene hoefftiana* C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 215. — *Petrocoma hoefftiana* (C. A. Mey.) Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 200 (Fl. Cauc.).

Описан с Кавказа («In rupestribus Caucasi occidentalis versus rivulum Kassaut (alt. 1000 hexap.) et prope acidulum Nartzana (alt. 600 hexap.)»). Лекто-тип у с (Лазьков, 2010: 1485): «In rupestribus prope accidulum Nartzana, 12 VIII 1829 [C. A. Meyer]» (LE!).

ЗК: Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., Малк., В. Тер.; **БК:** Аcco-Арг.

Эндемик.

34 (87). **Melandrium** Röhl.*

1 (598). **M. album** (Mill.) Garcke, 1858, Fl. N. Mitt.-Deutschl. ed. 4: 55. — *Lychnis alba* Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: № 4.

Описан из Европы по культивированным растениям неизвестного происхождения.

Возможны заносы.

Атл., Сев., Центр., Вост. Европа; Ср., Центр., Вост. (заносное) Азия.

Все указания *M. album* для Кавказа относятся к следующему виду.

2 (599). **M. latifolium** (Poir.) Maire, 1936, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, 27: 211. — *Silene latifolia* Poir. 1789, Voy. Barbarie, 2: 165. — *Lychnis divaricata* Rchb. 1826, Icon. Bot. Pl. Crit. 4: 3. — *Melandrium divaricatum* (Rchb.) Fenzl, 1842, in Ledeb. Fl. Ross. 1: 328. — *M. eriocalycinum* Boiss. 1853, Diagn. Pl. Or. sér. 2, 1: 78. — *M. eriocalycinum* var. *persicum* Boiss. et Buhse, 1860, Nouv. Мém. Soc. Nat. Moscou, 12: 39. — *M. album* (Mill.) Garcke subsp. *eriocalycinum* (Boiss.) Hayek, 1924, Feddes Repert. (Beih.), 30, 1: 286. — *M. boissieri* Schischk. 1925, в Гроссг., Сосн. и Шишк. Фл. Тифл. 1: 205. — *M. persicum* (Boiss. et Buhse) Bornm. 1935, Feddes Repert. 39: 92. — *Silene alba* (Mill.) E. H. L. Krause subsp. *eriocalycina* (Boiss.) Walters, 1964, Feddes Repert. 69, 1: 48. — *S. latifolia* subsp. *eriocalycina* (Boiss. et Buhse) Greuter et Burdet, 1982, Willdenowia, 12: 189. — *S. latifolia* subsp. *persica* (Boiss. et Buhse) Melzh. 1988, in Rech. f. Fl. Iran. 163: 473. — *Melandrium album* auct. non (Mill.) Garcke, p. p., quoad pl. ex Cauc.: Шишк. 1936, Фл. СССР, 6: 725; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 260; Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1: 259; Гвиниан. 1978, Фл. Груз. изд. 2, 4: 123.

Описан из Алжира.

* Г. А. Лазьков.

ЗП; ВП: В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ; ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ; Т.**

Указан для **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт., Лори.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ:** Араг. (Гроссгейм, 1945: 261).

Атл., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран), Ср. (Туркменистан); Сев. Африка.

3 (600). **M. balansae** Boiss. 1888, Fl. Or. Suppl.: 109. — *M. saxosum* Khokhr. 1989, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 6: 95. — ?*M. sylvestre* auct. non (Schkuhr) Röhl., р. р., quoad pl. ex Саус.: Шишк. 1936, Фл. СССР, 6: 725; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 260. — ?*M. rubrum* auct. non (Weigel) Garcke, р. р., quoad pl. ex Саус.: Гвиниан. 1978, Фл. Груз. изд. 2, 4: 121.

ЗК: Бело-Лаб.; **ЗЗ.**

Юго-Зап. Азия (Турция).

35 (88). **Cucubalus** L.*

1 (601). **C. baccifer** L. 1753, Sp. Pl.: 414.

Описан из Европы. Lectotypus (Walters in Jarvis et al., 1993: 39): Herb. Linn. 582.1 (LINN).

ЗП: 3. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **Т.**

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум. (Галушко, 1978: 259), Тер.-Сулак. (Гроссгейм, 1945: 261); **ЦК:** В. Тер. (Галушко, 1978: 259); **ЗЗ:** Абх. (Гвинианидзе, 1978: 164); **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек. (Гроссгейм, 1945: 261).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Ирак, Иран, Афганистан).

36 (89). **Agrostemma** L.*

1 (602). **A. githago** L. 1753, Sp. Pl.: 435.

Описан из Европы. Lectotypus (Ghafoor in Jafri, El-Gadi, 1978: 56): Herb. Linn. 601.1 (LINN).

ЗП; ВП: Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК; ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.; **Т.**

Указан для всех районов Предкавказья (Галушко, 1978: 249); **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ЗЗ:** Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт., Лори.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ:** Ю. Караб. (Гроссгейм, 1945: 227).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Южн. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка.

* Г. А. Лазьков.