

11 (64). *Bufonia* L.*

1 (328). **B. oliveriana** Ser. 1824, in DC. Prodr. 1: 388. — *B. parviflora* Griseb. 1834, Spic. Fl. Rumel. 1: 197. — *B. virgata* Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 665. — *B. tenuifolia* auct non L.: Гвин. 1978, Фл. Груз. изд. 2, 4: 69.

Описан из Ирана («Circa Teheran Persiae (v. s. ex herb. Olivier)»).

ЗП: Аз.-Куб.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв.; **ЮЗ:** Ерев., Дар.

Указан для **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт. (Гроссгейм, 1945: 201); **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах. (Гвинашвили, 1978: 69); **ЮЗ:** Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб; **Т** (Гроссгейм, 1945: 201).

Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Ирак, Иран, Афганистан), Ср. (Туркменистан) Азия.

2 (329). **B. takhtajanii** Nersesjan, 2002, Фл. растит. и раст. рес. Арм. 14: 4. — *B. sintenisii* auct. non Freyn: Нерсесян, 1999, Фл. растит. и раст. рес. Арм. 12: 56.

Описан из Армении. Турус: «Армения, Араратский р-н, окр. с. Веди, внутреннее ущелье хребта Ерах, гипсоносные, щебнистые склоны, 18 VI 1998, А. Нерсесян» (ERE, cum isotypis; isotypi — В, LE!).

ЮЗ: Ерев.

Эндемик.

12 (65). *Lepyrodiclis* Fenzl*

1 (330). **L. holosteoides** (C. A. Mey.) Fisch. et C. A. Mey. 1841, Enum. Pl. Nov. 1: 93. — *Gouffea holosteoides* C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 217.

Описан с Кавказа. Lectotypus (McNeill, 1963: 402): «In locis humidis prope pag. Swant, 23 VI 1830, C. A. Meyer» (LE!).

ЮЗЗ: Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Севан., Нах.; **Т.**

Указан для **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Ерев., Мегр.-Зан. (Гроссгейм, 1945: 201).

Вост. Европа (заносное); Сев. (заносное), Юго-Зап. (от Турции и Ирака до Афганистана), Ср., Центр., Вост. (заносное) Азия.

2 (331). **L. stellarioides** Schrenk, 1841, in Fisch. et C. A. Mey. Enum. Pl. Nov. 1: 93.

Описан из Казахстана. Lectotypus (McNeill, 1963: 402): «In collibus aridis Koguldur, 29 V 1840 [Schrenk]» (LE!).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.

Юго-Зап. (Ирак, Иран, Афганистан), Ср. Азия.

* Г. А. Лазьков.