

13 (66). **Cerastium** L.*

Subgen. 1. **Cerastium**

Sect. 1. **Caespitosa** (Pax et K. Hoffm.) I. V. Sokolova

1 (332). **C. holosteoides** Fries, 1817, Nov. Fl. Suec. 4: 52. — *C. caespitosum* Gilib. 1782, Fl. Lithuan. 2: 159, nom. inval. — *C. fontanum* Baumg. subsp. *triviale* (Spenn.) Jalas, 1963, Arch. Soc. Zool. Bot. Fenn. Vanamo, 18, 1: 63. — *C. holosteoides* subsp. *triviale* (Link) Möschl, 1964, Mém. Soc. Brot. 17: 11.

Описан с юга Швеции.

ЗП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ.

Указан для **Т** (Халилов, 1952: 290).

Европа; Азия; Сев. Африка; Америка (заносное); Австралия (заносное).

Sect. 2. **Cerastium**

2 (333). **C. arvense** L. 1753, Sp. Pl.: 438.

Описан по материалам из Скандинавии и Южной Европы.

ЗП: З. Ставр.; **ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.

Европа; Сев., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка (заносное).

3 (334). **C. ponticum** Albov, 1894, Bull. Herb. Boiss. 2: 449.

Описан из Абхазии. *Le cotype* (Соколова, 1996: 38): «Mons Khóon pres Tschipchira (crete Bzybienne), pâturages alpins, 2 X 1893, № 497, N. Alboff» (G!).

3а. **C. ponticum** Albov var. **ponticum**.

ЗЗ: Туап.-Адл. (Красная Поляна, р. Мзымта), Абх.

Эндемик.

3б. **C. ponticum** Albov var. **glabratum** Sachok. et Charadze, 1978, Фл. Груз. изд. 2, 4: 50; iid. 1939, в Колак. Фл. Абх. 2: 90, descr. ross.

Описан из Абхазии. *Typus*: «Abchazia. M. Arabica, 26 VIII 1967, Z. Gvinia-nidze, D. Mtzchvetadze» (ТВИ!).

ЗЗ: Абх.

Эндемик.

4 (335). **C. szowitsii** Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 717; Шишк. 1936, Фл. СССР, 6: 465, р. р.; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 196, р. р. — *C. araraticum* auct. non Rupr.: Гроссг. 1930, Фл. Кавк. 2: 383, р. р.; Cullen, 1967, Fl. Turk. 2: 79, р. р.

Описан из Азербайджана (гора Кирс). *Typus*: «Armenia Rossica, mons Kias, Szowits» (G!).

4а. **C. szowitsii** Boiss. var. **szowitsii**.

ВЗ: Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

* И. В. Соколова (Соколова, 1996).

4b. **C. szowitsii** Boiss. var. **album** (Buschm.) I. V. Sokolova ex Czer. 1993, Vasc. Pl. Russ. Adjac. States: 162. — *C. gnaphalodes* Fenzl subsp. *album* Buschm. 1939, Feddes Repert. 46: 34.

Описан из Турции. Т у р u s: «Armenia turcica, Szandschak Gumuschkhane in lapidos mont. Aktasch. It[er] orient[ale], 1894, № 6229, Sintenis» (WU; isotypus — LE!).

ВЗ: Караб.; **ЮЗ:** Севан., Занг.
Юго-Зап. Азия (вост. Турция).

5 (336). **C. araraticum** Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 234 (Fl. Cauc.). — *C. szowitsii* auct. non Boiss.: Шишк. 1936, Фл. СССР, 6: 465, р. р.; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 196, р. р.

Описан из Турции (гора Арарат). Л е с т о т у р u s (Соколова, 1996: 39): «In m. Ararat, 1700 hex., leg. Moritz» (LE!).

5a. **C. araraticum** Rupr. var. **araraticum**. — *C. szowitsii* Boiss. var. *glabratum* (Trautv.) Grossh. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 196.

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан.

Указан для **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карг. (Харадзе, 1978: 53).

Юго-Зап. Азия (вост. Турция).

По-видимому, указан для **ЦЗ** ошибочно.

5b. **C. araraticum** Rupr. var. **lanuginosum** Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 234 (Fl. Cauc.). — *C. szowitsii* Boiss. var. *lanuginosum* (Rupr.) Grossh. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 196.

Описан из Турции (гора Арарат). Л е с т о т у р u s (Соколова, 1996: 39): «In m. Ararat, 17 V 1844, leg. D. Bayer» (LE!).

ЮЗ: Севан., Дар. (Ехегнадзорский р-н, р. Ехегис).

Юго-Зап. Азия (вост. Турция).

6 (337). **C. capillatum** I. V. Sokolova, 1990, Бот. журн. 75, 10: 1450.

Описан из Центрального Закавказья. Т у р u s: «Herbarium provinciae Lori. Безобдальский хр., гора Тодор, сев. склон, 7000–8000 ф., 12 VII 1920, А. Шелковников» (LE; isotypus — TGM).

ЦЗ: Лори; **ЮЗ:** Ю. Караб.

Юго-Зап. Азия (вост. Турция).

7 (338). **C. gnaphalodes** Fenzl, 1842, Pugil. Pl. Nov. Syr. Tauri Occ. 1: 11.

Описан из Турции. Л е с т о т у р u s (Buschmann, 1938: 130): «Taurus, № 53, Kotschy» (W).

ЮЗЗ: Месх.

Юго-Зап. Азия.

8 (339). **C. dagestanicum** Schischk. 1936, Фл. СССР, 6: 883, 465. — *C. szowitsii* auct. non Boiss.: Гроссг. 1930, Фл. Кавк. 2: 382.

Описан из Дагестана. Т у р u s: «Dagestania, Achty, 1880, leg. Becker» (LE!).

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.

Эндемик.

9 (340). **C. argenteum** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 361. — *C. banaticum* auct. non (Rochel) Heuff.: Cullen, 1967, Fl. Turk. 2: 78, p. p., in textu.

Описан из окр. Тбилиси. *Lectotypus* (Соколова, 1996: 40): «Ex argo Tiflensis, a. 1803 [Bieberstein]» (LE!).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.

Указан для **ВК:** Ман.-Самур. (Гусейнов, 1990: 236).

Эндемик.

Мы согласны с мнением Р. А. Муртазалиева (2009: 96) о сомнительности указания этого вида для Дагестана.

Ошибочно указан для **Т** и прилегающих районов Ирана (Möschl, 1966: 165, 1988: 97).

10 (341). **C. sosnowskyi** Schischk. 1936, Фл. СССР, 6: 464. — *C. argenteum* Bieb. subsp. *glabratum* Sosn. 1923, Вестн. Тифл. бот. сада, нов. сер. 1: 73. — *C. banaticum* auct. non (Rochel) Heuff.: Cullen, 1967, Fl. Turk. 2: 78, p. p.

Описан из Юго-Западного Закавказья. *Lectotypus* (Соколова, 1996: 40): «Distr. Achalzich, ad rupes prope p. Zniss, 1 VIII 1920, D. Sosnowsky» (ТБИ!).

ЗЗ: Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Боржомское ущелье, перевал Цхра-Ццаро).

Указан для **ЗЗ:** Адж.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах. (Харадзе, 1978: 52).

Юго-Зап. Азия (Турция).

В Гербарии LE хранится гербарный лист *C. sosnowskyi* с этикеткой: «Бзыбь, № 864, Захарова, Панютин». Других сборов этого вида из Абхазии нет.

11 (342). **C. annae** I. V. Sokolova, 1990, Бот. журн. 75, 10: 1449.

Описан из Западного Закавказья. *Турис:* «Мегрельский [Эгрисский] хребет, западный склон горы Джвари, известняковые осыпи, 2700 м над ур. м., 9 VIII 1947, А. Колаковский» (LE!).

ЗЗ: Инг.-Рион.

Эндемик.

12 (343). **C. polymorphum** Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 237 (Fl. Cauc.). — *C. alpinum* auct. non L.: Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 361.

Описан из центральной части Большого Кавказа. *Lectotypus* (Соколова, 1996: 40): «Kaischaur, Steven» (LE — Herb. Bieb!).

12a. **C. polymorphum** Rupr. var. **polymorphum**. — *C. polymorphum* α. *decumbens* Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 238 (Fl. Cauc.).

ЗК; ЦК: Малк., В. Тер.; **ВК:** Аcco-Арг.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.
Эндемик.

12b. **C. polymorphum** Rupr. var. **mollifolium** Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 238 (Fl. Cauc.). — *C. polymorphum* γ. *alpestre* Rupr. 1869, l. c.: 239. — *C. polymorphum* δ. *myrtifolium* Rupr. 1869, l. c.: 239. —

C. polymorphum ε. *meyeri* Rupr. 1869, l. с.: 239. — *C. polymorphum* η. *viscidulum* Rupr. 1869, l. с.: 239.

Описан с Большого Кавказа. *Lectotypus* (Соколова, 1996: 40): «In herbidis ad rivulum Malka, 12 VII, № 24, Meyer» (LE!).

ЗК; ЦК: Малк., В. Тер.; **ВК; ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич. (Лагодехский и Закатальский р-ны).

Эндемик.

Sect. 3. **Fugacia** (Fenzl ex Pax et K. Hoffm.) I. V. Sokolova

13 (344). **C. glomeratum** Thuill. 1799, Fl. Envir. Paris, ed. 2: 226.

Описан из Франции.

ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб., **ВП:** В. Ставр. (Галушко, 1978: 241); **ЦЗ:** Лори, **ВЗ:** Ширв. (Халилов, 1952: 288); **ЮЗ:** Занг. (Шишкин, Аветисян, 1956: 35).

Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. Азия; Америка (заносное).

14 (345). **C. brachypetalum** Desp. ex Pers. 1805, Syn. Pl. 1: 520.

Описан из Франции (г. Ле-Ман).

14а. **C. brachypetalum** Desp. ex Pers. subsp. **brachypetalum**. — *C. tauricum* Spreng. 1818, Novi Provent. Hal. Berol.: 10. — *C. brachypetalum* subsp. *roeseri* (Boiss. et Heldr.) Nyman, 1878, Consp. Fl. Europ. 1: 109.

ЗП: Аз.-Куб.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Караб.; **ЮЗ:** Занг., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ВП:** В. Ставр., **ЗК:** В. Куб. (Галушко, 1978: 241); **ВЗ:** Мург.-Муровд. (Шишкин, Аветисян, 1956: 35).

Европа; Средиз.

14б. **C. brachypetalum** Desp. ex Pers. subsp. **strigosum** (Fries) Lonsing, 1939, Feddes Repert. 46: 157. — *C. strigosum* Fries, 1818, Fl. Halland. 1: 78. — *C. brachypetalum* subsp. *brachypetalum*: Sell a. Whitehead, 1964, Feddes Repert. 69, 1: 18.

Описан с юго-запада Швеции.

ЦК: В. Кум.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.

Сев. (юг), Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.

15 (346). **C. luridum** Guss. 1842, Fl. Sicul. Syn. 1: 510.

Описан с Сицилии.

Т:

Южн. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия.

16 (347). **C. pumilum** Curtis, 1777, Fl. Londin. 2, 16: tab. 30. — *C. glutinosum* auct. non Fries: Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 193, р. р. — *C. pumilum* subsp. *pumilum*: P. D. Sell a. Whitehead, 1964, Feddes Repert. 69, 1: 22.

Описан из Великобритании (окр. Лондона).

ЗП: Аз.-Куб.; **ЦК:** В. Кум.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. (заносное), Вост. (заносное) Азия; Сев. Америка (заносное).

17 (348). **C. glutinosum** Fries, 1817, Nov. Fl. Suec. 4: 51. — *C. pumilum* Curtis subsp. *pallens* (F. W. Schultz) Schinz et Thell. 1907, Bull. Herb. Boiss. sér. 2, 7: 402. — *C. pumilum* auct. non Curtis: Гроссг. 1930, Фл. Кавк. 2: 326, p. p.

Описан с юга Швеции.

ЗП: Аз.-Куб., З. Ставр.

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур. (Галушко, 1978: 239); **ВП:** Тер.-Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 98); **ЦЗ:** Лори, **ЮЗ:** Занг. (Шишкин, Аветисян, 1956: 35).

Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия.

18 (349). **C. semidecandrum** L. 1753, Sp. Pl.: 438. — *C. rotundatum* Schur, 1877, Verh. Naturf. Ver. Brünn, 15, 2: 146. — *C. balearicum* F. Herm. 1913, Verh. Bot. Ver. Brandenb. 54: 247. — *C. dentatum* Möschl, 1933, Österr. Bot. Zeitschr. 82: 230.

Описан из Северной Европы.

ЗП; ВП; ЦК; ВК; СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ; ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЗЗ:** Инг.-Рион. (Харадзе, 1978: 58).

Европа; Средиз.; Юго-Зап., Юго-Вост. (заносное) Азия; Сев. Америка (заносное); Австралия (заносное).

19 (350). **C. syvaschicum** Клеоров, 1939, Журн. Инст. бот. АН УРСР, 21–22 (29–30): 245.

Описан из Украины (Причерноморье). *Lectotypus* (Клоков, 1947: 64): «О-в Бирючий, Чича» (KW!).

ЗП: Аз.-Куб.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.

Юго-Вост. (Крым), Вост. (юг Украины) Европа.

Растения из причерноморских и приазовских областей Кавказа и Украины близки к средиземноморскому *C. diffusum* Pers. У последнего вида, согласно диагнозу, цветоножки в 2–4 раза превышают чашечку, тогда как у причерноморских растений — не более чем в 2 раза. Поэтому мы рассматриваем их в качестве самостоятельного вида.

Subgen. 2. **Schizodon** Fenzl

Sect. 1. **Schizodon** (Fenzl) Schischk.

20 (351). **C. purpurascens** Adams, 1805, in Weber u. Mohr, Beitr. Naturk. 1: 60.

Описан с Кавказа (Осетия).

20a. **C. purpurascens** Adams subsp. **purpurascens**.

ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ: Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ; ЮЗ:**

Юго-Зап. Азия.

20b. **C. purpurascens** Adams subsp. **parviflorum** (Trautv.) I. V. Sokolova ex Czer. 1993, Vasc. Pl. Russ. Adjac. States: 162. — *C. purpurascens* var. *parviflorum* Trautv.

1873, Тр. Петерб. бот. сада, 2, 2: 514. — *C. purpurascens* f. *ensifolium* Möschl, 1966, Sitzungsber. Akad. Wiss. (Wien), abt. 1, 175, 7–8: 198.

Описан из Армении (Цахкадзор, бывш. Дарачичар). *Lectotypus* (Соколова, 1996: 43): «Daratschitschach, 30 V 1871, G. Radde» (LE!; isolectotypi — TBI!, TGM!).

ВЗ: Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ.**

Юго-Зап. Азия (Турция, ?Иран).

В **ЦЗ**, **ЮЗЗ** и **ЮЗ** встречаются экземпляры *C. purpurascens* с признаками, промежуточными между двумя подвидами.

21 (352). **C. elbrusense** Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 729. — *C. pseudokasbek* Vysok. 1950, Тр. Бот. инст. АН АрмССР, 7: 61. — *C. purpurascens* Adams var. *elbrusense* (Boiss.) Möschl, 1966, Sitzungsber. Akad. Wiss. (Wien), abt. 1, 175, 7–8: 198. — *C. kasbek* auct. non Parrot: Cullen, 1967, Fl. Turk. 2: 77.

Описан из Ирана (горы Эльбурс). *Lectotypus* (Möschl, 1988: 100, «typus»): «498. In alpinis Hasartschal in partibus occidentalibus m. Elbrus [errore, Elburs], 1843, Th. Kotschy» (G!; isolectotypus — LE!).

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ:** Севан., Нах., Занг.

Указан для **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах. (Харадзе, 1978: 44).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

22 (353). **C. ruderale** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 357.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (Соколова, 1996: 44): «Ex argo Kisljariensi, 1798 [M. Bieberstein]» (LE!).

ВП: Тер.-Сулак. (Кизляр); **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** В. Сулак.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ;** **ЮЗ.**

Указан для **ЗП;** **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум. (Галушко, 1978: 241); **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт. (Харадзе, 1978: 55).

Эндемик.

По крайней мере часть приведенных указаний относится к неверно определенным экземплярам *C. nemorale* Bieb.

23 (354). **C. dichotomum** L. 1753, Sp. Pl.: 438.

Описан из Испании.

ЦК: В. Тер. (Эльхотово); **ЮЗЗ:** Араг.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Ширв.; **ЮЗ;** **Т.**

Атл., Сев. (юг Скандинавии — заносное), Центр., Южн., Вост. (заносное) Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия.

24 (355). **C. inflatum** Gren. 1841, Mém. Compt. Rend. Soc. Enum. Doubs, 1: 6, 45; Link, 1829, in Desf. Cat. Pl. Horti Paris: 463, nom. nud. — *C. dichotomum* L. subsp. *inflatum* (Link) Cullen, 1967, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 27, 2: 211, nom. inval.

Описан из Ирана («Persia»).

ЮЗ.

Средиз. (вост.); Юго-Зап., Ср. Азия.

25 (356). **C. longifolium** Willd. 1789, Sp. Pl. 2: 814.

Описан из Армении (возможно, нынешней территории Турции; «in Armenia»).

ЮЗ: Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Юго-Зап. Азия.

26 (357). **C. saccardoanum** Diratz. 1912, in Bég. et Diratz. Contrib. Fl. Armenia: 42, tab. 1, 3–5.

Описан из Турции. Т у р u s: «Arm. cilic.: Elbistan, 10 VI 1907, № 63, Asdurian» (FI?).

ЮЗ: Нах. (Азнабюрт).

Юго-Зап. Азия (Турция).

27 (358). **C. fragillimum** Boiss. 1842, Diagn. Pl. Or. sér. 1, 1: 54.

Описан из Турции («Hab. ad umbram Juniperorum in regione alpina, Cadmus, Mesogis, Tmolus; legi Jun. 1842»). L e c t o t y p u s (Sokolova, hoc loco): «Umbrosis Cadmi supra Colossam, VI 1842» (G!).

ЮЗ: Нах. (Норашенский р-н, с. Ахура).

Юго-Зап. Азия.

Sect. 2. **Strephodon** Ser.

28 (359). **C. undulatifolium** Sommier et Levier, 1893, Тр. Петерб. бот. сада, 13, 1: 41.

Описан по материалам с Кавказа (Сванетия и гора Эльбрус). L e c t o t y p u s (Соколова, 1996: 44): «In latere bor. occ. montis Elbrus (vulgo Minghitau), in monte supra flumen Kukurtli, 3000 m, 9 IX 1890, S. Sommier, E. Levier» (LE!).

ЦК: Малк., В. Тер.; **ЗЗ:** Инг.-Рион.

Эндемик.

В Гербарии МВ хранится гербарный лист *C. undulatifolium* с этикеткой: «Армянская ССР, Даралагез, левый склон долины Арпачая, VII 1929, А. и И. Шукины». Других сборов вида за пределами Большого Кавказа нет, поэтому достоверность этикетки сомнительна.

29 (360). **C. multiflorum** C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 222. — *C. salatavicum* Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 229 (Fl. Cauc.).

Описан с Главного Кавказского хребта. L e c t o t y p u s (Соколова, 1996: 45): «In regione alpina (alt. 5000–6000 ped.) versus torrentem Terek prope pagos Kobi et Sion, 14–15 IX 1829, Meyer» (LE!).

ЗК: В. Куб.; **ЦК:** Малк. (Приэльбрусье), В. Тер.; **ВК;** **ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.

Эндемик.

Ошибочно указан для **Т** (Möschl, 1966: 192, 1988: 95).

30 (361). **C. kasbek** Parrot, 1815, Reise Cauc. 2: 88.

Описан с Кавказа (гора Казбек). L e c t o t y p u s (Соколова, 1996: 45): «...In monte Kasbecki..., Parrot» (LE!).

ЦК: В. Тер.; **ВК;** ?**ВЗ:** Алаз.-Агрич.

Указан для **ЦК**: Малк. (Эльбрус) (Галушко, 1978: 239); **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос. (Харадзе, 1978: 35).

Эндемик.

31 (362). **C. davuricum** Fisch. ex Spreng. 1815, Pl. Min. Cogn. Pugil. 2: 65. — *Dichodon davuricum* (Fisch. ex Spreng.) Á. Löve et D. Löve, 1975, Bot. Not. (Lund), 128, 4: 507 («*dahuricum*»).

Описан из Забайкалья.

ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ: Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ**; **Т**: Сев. (вост.), Вост. Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр. Азия.

32 (363). **C. hemschinicum** Schischk. 1936, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 2: 134. — *C. davuricum* auct. non Fisch. ex Spreng.: Cullen, 1967, Fl. Turk. 2: 76, р. р.

Описан из Турции (Лазистан). Т у р и с: «Lazistania turcica, fauces flum. Furtuna-dere, prope pag. Gzat, in rupestribus, alt. circa 1300 m, 1 IX 1917, В. Schischkin» (LE!).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ**: Месх. (окр. Абастумани); **ВЗ**: Алаз.-Агрич.

Указан для **ЗК; ВК**: Ассо-Арг. (Галушко, 1978: 238).

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

33 (364). **C. oreades** Schischk. 1936, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 2: 133. — *C. svanicum* Charadze, 1938, Тр. Тбил. бот. инст. 2: 186.

Описан с Главного Кавказского хребта. Т у р и с: «Терская обл., Владикавказский окр., Мамиссонский перевал, по склонам, 16 VII 1916, № 2098, Н. Введенский» (LE!).

ЦК: В. Тер. (Мамиссонский перевал); **ВК**: В. Сулак.; **ЗЗ; ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.

Указан для **ЗК**: Уруп-Теб., В. Куб. (Галушко, 1978: 238); **ВК**: Ман.-Самур. (Муртазалиев, 2009, 1: 99); **ВЗ** (Халилов, 1952: 285).

Эндемик.

34 (365). **C. microspermum** С. А. Мей. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 222.

Описан из Тальша. Л е с т о т у р и с (Соколова, 1996: 45): «In locis graminosis altior. montium Talusch, VI 1830 [С. А. Meyer]» (LE!).

Т.

Юго-Зап. Азия (Иран).

35 (366). **C. holosteum** Fisch. ex Hornem. 1813, Hort. Bot. Hafn.: 434.

Описан по экземпляру, присланному из Ботанического сада в Горенках («*missum... ex horto gorinkano*»).

35а. **C. holosteum** Fisch. ex Hornem. var. **holosteum**.

ЗП: З. Ставр.; **ВП**: Тер.-Сулак.; **ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ**: Инг.-Рион.; **ВЗ**: Мург.-Муровд.; **ЮЗ**.

Указан для **ЦЗ**: Лори (Шишкин, Аветисян, 1956: 29).

Эндемик.

35b. **C. holosteuum** Fisch. ex Hornem. var. **meyerianum** (Rupr.) I. V. Sokolova ex Czer. 1993, Vasc. Pl. Russ. Adjac. States: 161. — *C. meyerianum* Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 221 (Fl. Cauc.).

Описан с Кавказа (окр. Владикавказ). *Typus*: «In sylvis pr. Wladikawkask, 10 IX 1829 [Meyer]» (LE!).

ЗК: Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**.

Указан для **ВК**: В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 99).

Эндемик.

По-видимому, указан для **ВК** ошибочно.

36 (367). **C. nemorale** Vieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 317.

Описан с Кавказа (окр. Ставрополя). *Lectotypus* (Соколова, 1996: 46): «Ex nemoribus circa Stauropolin et Severnaja, 1813» (LE — Herb. Vieb!).

ЗП; **ВП**: В. Ставр.; **ЗК**; **ЦК**; **ВК**; **ЗЗ**: Инг.-Рион.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос. (Тбилиси); **ЮЗ**: Ерев.; **Т** (Лерик).

Указан для **ЦЗ**: Лори (Шишкин, Аветисян, 1956: 30); **ВЗ** (Халилов, 1952: 285). Вост. Европа; ?Юго-Зап., Ср. (Кыргызстан — Лазьков и др., 2011: 227) Азия.

37 (368). **C. perfoliatum** L. 1753, Sp. Pl.: 437.

Описан из Греции (возможно, местонахождение указано ошибочно: «in Graecia»).

ЗП; **ВП**: Тер.-Сулак.; **ВК**; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ВЗ**; **ЮЗ**.

Указан для **ЮЗЗ**: Араг. (Шишкин, Аветисян, 1956: 30).

Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. Азия.

14 (67). **Stellaria** L.*

Sect. 1. *Alsine* (L.) Tzvel.

1 (369). **S. media** (L.) Vill. 1789, Hist. Pl. Dauphiné, 3: 615. — *Alsine media* L. 1753, Sp. Pl.: 272.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Turrill, 1956: 24): Herb. Linn. 388.1 (LINN).

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП**: В. Ставр.; **ЗК**: Бело-Лаб., В. Куб.; **ЦК**; **ВК**; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Адж.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ**: Месх.; **ЮЗ**: Ерев., Нах., Занг., Ю. Караб.; **Т**.

Указан для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 235); **ЗЗ**: Инг.-Рион. (Гагнидзе, Кемулариа-Натадзе, 1985: 61).

Европа; Средиз.; Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное); Австралия (заносное).

2 (370). **S. neglecta** Weihe, 1825, in Bluff et Fingerh. Comp. Fl. Germ. 1: 560.

Описан из Германии.

ЗП: Аз.-Куб.; **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**; **ВК**; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах.; **ЮЗ**: Ерев., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т**.

* Г. А. Лазьков.