

35b. **C. holosteam** Fisch. ex Hornem. var. **meyerianum** (Rupr.) I. V. Sokolova ex Czer. 1993, Vasc. Pl. Russ. Adjac. States: 161. — *C. meyerianum* Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 221 (Fl. Cauc.).

Описан с Кавказа (окр. Владикавказ). *Typus*: «In sylvis pr. Wladikawkask, 10 IX 1829 [Meyer]» (LE!).

ЗК: Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**.

Указан для **ВК**: В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 99).

Эндемик.

По-видимому, указан для **ВК** ошибочно.

36 (367). **C. nemorale** Vieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 317.

Описан с Кавказа (окр. Ставрополя). *Lectotypus* (Соколова, 1996: 46): «Ex nemoribus circa Stauropolin et Severnaja, 1813» (LE — Herb. Vieb!).

ЗП; **ВП**: В. Ставр.; **ЗК**; **ЦК**; **ВК**; **ЗЗ**: Инг.-Рион.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос. (Тбилиси); **ЮЗ**: Ерев.; **Т** (Лерик).

Указан для **ЦЗ**: Лори (Шишкин, Аветисян, 1956: 30); **ВЗ** (Халилов, 1952: 285). Вост. Европа; ?Юго-Зап., Ср. (Кыргызстан — Лазьков и др., 2011: 227) Азия.

37 (368). **C. perfoliatum** L. 1753, Sp. Pl.: 437.

Описан из Греции (возможно, местонахождение указано ошибочно: «in Graecia»).

ЗП; **ВП**: Тер.-Сулак.; **ВК**; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ВЗ**; **ЮЗ**.

Указан для **ЮЗЗ**: Араг. (Шишкин, Аветисян, 1956: 30).

Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. Азия.

14 (67). **Stellaria** L.*

Sect. 1. *Alsine* (L.) Tzvel.

1 (369). **S. media** (L.) Vill. 1789, Hist. Pl. Dauphiné, 3: 615. — *Alsine media* L. 1753, Sp. Pl.: 272.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Turrill, 1956: 24): Herb. Linn. 388.1 (LINN).

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП**: В. Ставр.; **ЗК**: Бело-Лаб., В. Куб.; **ЦК**; **ВК**; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Адж.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ**: Месх.; **ЮЗ**: Ерев., Нах., Занг., Ю. Караб.; **Т**.

Указан для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 235); **ЗЗ**: Инг.-Рион. (Гагнидзе, Кемулариа-Натадзе, 1985: 61).

Европа; Средиз.; Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное); Австралия (заносное).

2 (370). **S. neglecta** Weihe, 1825, in Bluff et Fingerh. Comp. Fl. Germ. 1: 560.

Описан из Германии.

ЗП: Аз.-Куб.; **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**; **ВК**; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах.; **ЮЗ**: Ерев., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т**.

* Г. А. Лазьков.

Указан для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 235); **ЗЗ**: Инг.-Рион. (Гагнидзе, Кемулариа-Натадзе, 1985: 61).

Европа; Средиз.; Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное).

3 (371). **S. pallida** (Dumort.) Piré, 1863, Bull. Soc. Bot. Belg. 2: 40. — *Alsine pallida* Dumort. 1827, Fl. Belg.: 109.

Описан из Бельгии.

ВП: Тер.-Кум.; **ВК**: Ман.-Самур.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗ**: Ерев., Мегр.-Зан.

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Южн. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное).

Sect. 2. **Hylebia** W. D. J. Koch

4 (372). **S. nemorum** L. 1753, Sp. Pl.: 421.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 1994: 159): Herb. Burser XVI (1): 69 (UPS-BURSER).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**: Малк.; **ВК**: Ман.-Самур.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Адж.

Указан для **ЗП**: Аз.-Куб. (Галушко, 1978: 235), **ЗЗ**: Инг.-Рион. (Гагнидзе, Кемулариа-Натадзе, 1985: 61), Рион.-Квир. (Гвиниашвили, 1978: 19); **ЮЗЗ**: Месх. (Гроссгейм, 1945: 181).

Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

Sect. 3. **Larbreia** (A. St.-Hil.) Bluff et Fingerh.

5 (373). **S. alsine** Grimm, 1767, Nova Acta Acad. Leop.-Carol. 3 (App.): 313.

Описан из Германии.

ЗЗ: Адж.

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Центр., Вост., Южн. (вост. Пакистан) Азия; Сев. Америка.

6 (374). **S. anagalloides** C. A. Mey. ex Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 222 (Fl. Cauc.).

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (Lazkov, hoc loco): «In locis humidis versus mont. Ragun, in Caucaso occidentali, 14 VII 1829 [C. A. Meyer]» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**; **ВК**: Ассо-Арг., В. Сулак.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.

Указан для **ЦЗ**: Лори.; **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах. (Гроссгейм, 1945: 183).

Эндемик.

7 (375). **S. crassifolia** Ehrh. 1784, Hannover Mag. 8: 116.

Описан из Германии.

ЮЗ: Севан.

Атл., Сев., Центр., Вост. Европа; Сев., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

8 (376). **S. graminea** L. 1753, Sp. Pl.: 422.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 1994: 159): Herb. Burser XI: 111 (UPS- BURSER).

ЗП; ВП: В. Ставр., Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЗК; ЦК; ВК:** Ассо-Арг.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Адж.

Указан для **ВП:** В. Ставр. (Гроссгейм, 1945: 183), **ВЗ:** Иорск.-Шек.; **ЮЗЗ:** Месх. (Гвиниашвили, 1978: 22).

Европа; Средиз.; Сев., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка (заносное).

9 (377). **S. persica** Boiss. 1853, Diagn. Pl. Or. sér. 2, 1: 85.

Описан из Ирана. *Lectotypus* (Coode, 1967: 71): «[Iran] Monta Ellwind Persiae, № 610, Aucher-Eloy» (G).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Тиб., В. Куб.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Севан., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Указан для **ЦК:** В. Кум. (Галушко, 1978: 237); **ВК:** Ассо-Арг. (Очиаури, 1981: 58); **ЗЗ:** Инг.-Рион. (Гагнидзе, Кемулария-Натадзе, 1985: 61); **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт., Лори.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Ерев., Дар. (Гроссгейм, 1945: 183).

Юго-Зап. Азия (Иран, Турция).

Sect. 4. **Stellaria**

10 (378). **S. holostea** L. 1753, Sp. Pl.: 422.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 1993: 91): Herb. Linn. 584.4 (LINN).

ЗП: З. Ставр.; **ЗК; ЦК:** В. Тер.; **ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Месх.; **Т.**

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Гроссгейм, 1945: 182); **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум. (Галушко, 1978: 237); **СЗЗ:** Пшад.-Джубг.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд. (Гроссгейм, 1945: 182).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка (заносное).

15 (68). **Holosteum** L.*

1 (379). **H. glutinosum** (Bieb.) Fisch. et C. A. Mey. 1839, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 6: 52. — *Arenaria glutinosa* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 344. — *Holosteum polygamum* C. Koch. 1841, Linnaea, 15: 708. — *H. umbellatum* L. var. *glutinosum* (Bieb.) J. Gay, 1845, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 3, 4: 33.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (Лазьков, Зернов в Зернов, Соколов, 2004: 109): «Ех sabulosis deserti Cumani, a. 1798 [Bieberstein]» (LE!).

ЗП: З. Ставр.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., **ЮЗ:** Ерев., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

* Г. А. Лазьков.