

8 (376). **S. graminea** L. 1753, Sp. Pl.: 422.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 1994: 159): Herb. Burser XI: 111 (UPS- BURSER).

ЗП; ВП: В. Ставр., Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЗК; ЦК; ВК:** Ассо-Арг.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Адж.

Указан для **ВП:** В. Ставр. (Гроссгейм, 1945: 183), **ВЗ:** Иорск.-Шек.; **ЮЗЗ:** Месх. (Гвиниашвили, 1978: 22).

Европа; Средиз.; Сев., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка (заносное).

9 (377). **S. persica** Boiss. 1853, Diagn. Pl. Or. sér. 2, 1: 85.

Описан из Ирана. *Lectotypus* (Coode, 1967: 71): «[Iran] Monta Ellwind Persiae, № 610, Aucher-Eloy» (G).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Тиб., В. Куб.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Севан., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Указан для **ЦК:** В. Кум. (Галушко, 1978: 237); **ВК:** Ассо-Арг. (Очиаури, 1981: 58); **ЗЗ:** Инг.-Рион. (Гагнидзе, Кемулария-Натадзе, 1985: 61); **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт., Лори.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Ерев., Дар. (Гроссгейм, 1945: 183).

Юго-Зап. Азия (Иран, Турция).

Sect. 4. **Stellaria**

10 (378). **S. holostea** L. 1753, Sp. Pl.: 422.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 1993: 91): Herb. Linn. 584.4 (LINN).

ЗП: З. Ставр.; **ЗК; ЦК:** В. Тер.; **ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Месх.; **Т.**

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Гроссгейм, 1945: 182); **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум. (Галушко, 1978: 237); **СЗЗ:** Пшад.-Джубг.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд. (Гроссгейм, 1945: 182).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка (заносное).

15 (68). **Holosteum** L.*

1 (379). **H. glutinosum** (Bieb.) Fisch. et C. A. Mey. 1839, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 6: 52. — *Arenaria glutinosa* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 344. — *Holosteum polygamum* C. Koch. 1841, Linnaea, 15: 708. — *H. umbellatum* L. var. *glutinosum* (Bieb.) J. Gay, 1845, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 3, 4: 33.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (Лазьков, Зернов в Зернов, Соколов, 2004: 109): «Ех sabulosis deserti Cumani, a. 1798 [Bieberstein]» (LE!).

ЗП: З. Ставр.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., **ЮЗ:** Ерев., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

* Г. А. Лазьков.

Указан для **ВП**: В. Ставр., Тер.-Кум. (Галушко, 1978: 242); **ЗЗ**: Рион.-Квир.; **ВЗ**: Н. Кур. (Гроссгейм, 1945: 199); **ЮЗЗ**: Месх., Джав.-В. Ах. (Гвинуашвили, 1978: 63), Араг. (Гроссгейм, 1945: 199).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. Азия.

2 (380). **H. marginatum** С. А. Мей. 1838, Bull. Soc. Nat. Moscou, 11: 402.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (Лазьков, Зернов в Зернов, Соколов, 2004: 109): «Dürre Stellen um Helenendorf [Hohenacker]» (LE!).

ЦК: В. Кум.; **ВК**; **ЗЗ**: Рион.-Квир.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ЮЗЗ**: Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ**: Ерев., Севан., Дар., Нах., Ю. Караб.; **Т**:

Юго-Зап. (Турция, Иран) Азия.

3 (381). **H. umbellatum** L. 1753, Sp. Pl.: 88

Описан по гербарным материалам из Европы (Германия, Франция). *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 1993: 54): Herb. Bergius, «4 umbellatum» [specim. basal.] (SBT).

ЗП; **ВП**; **ЗК**; **ЦК**; **ВК**; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗ**: Ерев., Нах.

Указан для **ЗЗ**: Рион.-Квир.; **ВЗ**: Иорск.-Шек., Караб. (Гроссгейм, 1945: 198).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (от Турции и Ирака до Пакистана), Ср., Центр., Южн. (вост. Пакистан) Азия.

16 (69). **Myosoton** Moench*

1 (382). **M. aquaticum** (L.) Moench, 1794, Methodus: 225. — *Cerastium aquaticum* L. 1753, Sp. Pl.: 439. — *Malachium aquaticum* (L.) Fries, 1817, Fl. Halland.: 78.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 1994: 156): Herb. Linn. 603.23 (LINN).

ЗП; **ВП**: В. Ставр.; **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК**: В. Кум.; **ВК**; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Лори.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич.; **Т**:

Указан для **ВП**: Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЗК**: Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1978: 237), В. Куб. (Гроссгейм, 1945: 184); **ЦК**: Малк. (Галушко, 1978: 237); **ЦЗ**: Триал.-Н. Карт.; **ЮЗ**: Занг., Мегр.-Зан. (Гроссгейм, 1945: 184).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран, Пакистан), Ср., Вост., Южн. (вост. Пакистан) Азия; Сев. Америка (заносное).

17 (70). **Minuartia** L.*

Sect. 1. **Acutiflorae** (Fenzl) Hayek

1 (383). **M. biebersteinii** (Rupr.) Schischk. 1929, Журн. Никитск. бот. сада, 10, 2: 38. — *Alsine biebersteinii* Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 215 (Fl. Cauc.).

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (McNeill, 1963: 345): «Caucasus, Ossetia, districtus Alagir, pr. Sadon, 620 hex., 21 V 1861, Ruprecht» (LE!).

* Г. А. Лазьков.