

Указан для **ВП**: В. Ставр., Тер.-Кум. (Галушко, 1978: 242); **ЗЗ**: Рион.-Квир.; **ВЗ**: Н. Кур. (Гроссгейм, 1945: 199); **ЮЗЗ**: Месх., Джав.-В. Ах. (Гвиниашвили, 1978: 63), Араг. (Гроссгейм, 1945: 199).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. Азия.

2 (380). **H. marginatum** С. А. Мей. 1838, Bull. Soc. Nat. Moscou, 11: 402.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (Лазьков, Зернов в Зернов, Соколов, 2004: 109): «Dürre Stellen um Helenendorf [Hohenacker]» (LE!).

**ЦК**: В. Кум.; **ВК**; **ЗЗ**: Рион.-Квир.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ЮЗЗ**: Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ**: Ерев., Севан., Дар., Нах., Ю. Караб.; **Т**:

Юго-Зап. (Турция, Иран) Азия.

3 (381). **H. umbellatum** L. 1753, Sp. Pl.: 88

Описан по гербарным материалам из Европы (Германия, Франция). *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 1993: 54): Herb. Bergius, «4 umbellatum» [specim. basal.] (SBT).

**ЗП**; **ВП**; **ЗК**; **ЦК**; **ВК**; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗ**: Ерев., Нах.

Указан для **ЗЗ**: Рион.-Квир.; **ВЗ**: Иорск.-Шек., Караб. (Гроссгейм, 1945: 198).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (от Турции и Ирака до Пакистана), Ср., Центр., Южн. (вост. Пакистан) Азия.

#### 16 (69). **Myosoton** Moench\*

1 (382). **M. aquaticum** (L.) Moench, 1794, Methodus: 225. — *Cerastium aquaticum* L. 1753, Sp. Pl.: 439. — *Malachium aquaticum* (L.) Fries, 1817, Fl. Halland.: 78.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 1994: 156): Herb. Linn. 603.23 (LINN).

**ЗП**; **ВП**: В. Ставр.; **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК**: В. Кум.; **ВК**; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Лори.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич.; **Т**:

Указан для **ВП**: Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЗК**: Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1978: 237), В. Куб. (Гроссгейм, 1945: 184); **ЦК**: Малк. (Галушко, 1978: 237); **ЦЗ**: Триал.-Н. Карт.; **ЮЗ**: Занг., Мегр.-Зан. (Гроссгейм, 1945: 184).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран, Пакистан), Ср., Вост., Южн. (вост. Пакистан) Азия; Сев. Америка (заносное).

#### 17 (70). **Minuartia** L.\*

Sect. 1. **Acutiflorae** (Fenzl) Hayek

1 (383). **M. biebersteinii** (Rupr.) Schischk. 1929, Журн. Никитск. бот. сада, 10, 2: 38. — *Alsine biebersteinii* Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 215 (Fl. Cauc.).

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (McNeill, 1963: 345): «Caucasus, Ossetia, districtus Alagir, pr. Sadon, 620 hex., 21 V 1861, Ruprecht» (LE!).

\* Г. А. Лазьков.

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.

Указан для **ЗЗ:** Абх. (Колаковский, 1980: 164), Адж. (Дмитриева, 1960: 317).

Эндемик.

2 (384). **M. lineata** (Boiss.) Bornm. 1910, Beih. Bot. Centralbl. 27, 2: 318. — *Alsine juniperina* Fenzl *s. lineata* Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 677. — *Arenaria lineata* C. A. Mey. ex Fenzl, 1842, in Ledeb. Fl. Ross. 1: 351, nom. nud., in syn. — *Minuartia armena* Schischk. 1956, Фл. Арм. 2: 57, 62, nom. inval., descr. ross. — *M. daralagezica* Schischk. 1956, цит. соч.: 57, 62, nom. inval., descr. ross. — *M. armena* Schischk. ex Ikonn. 1996, Бот. журн. 81, 6: 102. — *M. daralagezica* Schischk. ex Ikonn. 1996, Бот. журн. 81, 6: 102.

Описан по гербарным материалам с Кавказа, из Турции, Ирана и Средней Азии. *Lectotypus* (McNeill, 1963: 346): «*Alsine lineata* mihi, montes Talüsch, Meyer» (LE!).

**ЗЗ:** Адж.; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ВК:** Ассо-Арг. (Очиаури, 1981: 56); **ЮЗ:** Занг., Мегр.-Зан. (Гроссгейм, 1945: 210).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

По-видимому, указан для **ВК** ошибочно.

3 (385). **M. subuniflora** (Albov) Woronow, 1914, в Фомин и Воронов, Опред. раст. Кавк. и Крыма, 2, 2: 178. — *Alsine subuniflora* Albov, 1895, Мат. фл. Колх.: 35.

Описан из Абхазии («Hab. in Abchasia: in lapidosis jugi calcarei Aossakwashera prope m. Kutush, alt. 2500–2600 m (N. A. 1894, № 49)»).

**ЗЗ:** Абх.

Эндемик

#### Sect. 2. **Lanceolatae** (Fenzl) Graebn.

4 (386). **M. acuminata** Turrill, 1929, Kew Bull.: 225. — *M. dianthifolia* auct. non (Boiss.) Hand.-Mazz.: Шишк. 1936, Фл. СССР, 6: 499; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 209; Карягин, 1952, Фл. Азерб. 3: 301; Шишк. и В. Е. Авет. 1956, Фл. Арм. 2: 62.

Описан из Ирана («N. Persia: Mishou Dagh, 19th July 1928, Gilliat-Smith 2374»).

**ЮЗ:** Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

#### Sect. 3. **Minuartia**

5 (387). **M. akinfiewii** (Schmalh.) Woronow, 1914, в Фомин и Воронов, Опред. раст. Кавк. и Крыма, 2, 2: 176. — *Alsine akinfiewii* Schmalh. 1892, Ber. Deutsch. Bot. Ges. 10: 287.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (McNeill, 1963: 356): «Боржом, 5000 футов, 28 VI 1888 [И. Акинфиев]» (LE!).

**ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ВЗ:** Караб. (Гроссгейм, 1945: 206); **ЮЗ:** Ерев. (Нерсесян, 1999: 56) Эндемик.

6 (388). **M. glomerata** (Bieb.) Degen, 1910, in Fritsch, Mitt. Naturw. Ver. Steierm. 46: 319. — *Arenaria glomerata* Vieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 350.

Описан из Крыма. *Lectotypus* (McNeill, 1963: 384): «Ex Tauria, a. 1795» (LE!).

**СЗЗ:** Анап.-Гел.

Юго-Вост. Европа.

7 (389). **M. intermedia** (Boiss.) Hand.-Mazz. 1912, Ann. Naturh. Mus. (Wien), 26: 148. — *Alsine intermedia* Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 685.

Описан из Турции. *Lectotypus* (McNeill, 1963: 361): «Turkey, Cilicia, ad pylas Cilicicas (Defile des Portes Ciliciennes), 23 VI 1855, № 598, Balansa» (G; *isolecotypi* — BM, JE, K).

**ЮЗ:** Занг., Мегр.-Зан.

Указан для **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗ:** Ю. Караб. (Гроссгейм, 1945: 206).

Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Ирак, Иран).

Не исключено, что *M. intermedia* является гибридом между *M. wiesneri* (Stapf) Schischk. и *M. meyeri* (Boiss.) Bornm.

8 (390). **M. meyeri** (Boiss.) Bornm. 1919, Beih. Bot. Centralbl. 27, 2: 318. — *Alsine meyeri* Boiss. 1849, Diagn. Pl. Or. sér. 1, 8: 96.

Описан с Кавказа и из Сирии. *Lectotypus* (Rechinger, 1988: 44): «Talish, Swant, R. F. Hohenacker» (G-BOIS).

**ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Мегр.-Зан.; **Т:**

Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран), Ср. Азия.

9 (391). **M. setacea** (Thuill.) Hayek, 1908, Fl. Steiermark, 1: 271. — *Arenaria setacea* Thuill. 1799, Fl. Env. Paris, ed. 2: 220. — *Minuartia anatolica* (Boiss.) Woronow, 1914, in Woronow et Schelk. Sched. Herb. Fl. Cauc. 4: 92. — *M. buschiana* Schischk. 1936, Фл. СССР, 6: 884, 493. — *M. micrantha* Schischk. 1936, цит. соч.: 884, 494. — *M. woronowii* Schischk. 1936, цит. соч.: 884, 495. — *M. abchasica* Schischk. 1936, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 3: 170.

Описан из Франции.

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК;** **ВК:** Ассо-Арг.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион.;

**ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Нах.

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд., Караб (Гроссгейм, 1945: 207, 208).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

Вид изменчив по величине чашечки, длине лепестков, опушению, скульптуре семян, поэтому нами не были признаны таксоны, указанные в синонимике.

10 (392). **M. sclerantha** (Fisch. et C. A. Mey.) Thell. 1912, Mém. Soc. Nat. Sci. Math. Cherbourg, 38: 231. — *Alsine sclerantha* Fisch. et C. A. Mey. 1838, in Hohen. Bull. Soc. Nat. Moscou, 11: 400.

Описан с Кавказа. Lectotypus (McNeill, 1963: 365) «Prope Helenendorf, Hohenacker» (LE!).

**БК:** Ман.-Самур.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Юго-Зап. Азия (Турция, Ирак, Иран).

11 (393). **M. wiesneri** (Stapf) Schischk. 1936, Фл. СССР, 6: 490. — *Alsine wiesneri* Stapf, 1886, Denkschr. Akad. Wiss. Math.-Naturw. Kl. (Wien), 51: 20.

Описан из Ирана. Lectotypus (McNeill, 1963: 359): «Rudbar, 1882, Pichler» (WU).

**БК:** Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЮЗ:** Ерев. (Тахтаджян, Фёдоров, 1972).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

#### Sect. 4. **Plurinerviae** McNeill

12 (394). **M. oreina** (Mattf.) Schischk. 1929, Изв. Томск. унив. 80: 433. — *M. hirsuta* Hand.-Mazz. subsp. *oreina* Mattf. 1922, Feddes Repert. (Beih.), 15: 114, 118. — *M. recurva* (All.) Schinz et Thell. subsp. *oreina* (Mattf.) McNeill, 1963, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 24, 3: 338.

Описан из Турции и Ирана. Lectotypus (McNeill, 1963: 318): «Turkey, Kurdistan, Taurus Armenus, in monte Meleto (Meretug) Dagh districtus Bitlis, in lapidosis circa cacumen, substrato calcareo, ca 2900–3100 m, 11 VIII 1910, № 2758, Handel-Mazzetti» (WU).

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **БК;** **ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ;** **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ;** **Т:**

Указан для всех горных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 243); **ЗЗ:** Абх. (Гроссгейм, 1945: 208).

Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, Ирак, Иран).

Не вполне ясны отличия этого вида от *M. recurva*. Весь комплекс *M. recurva* требует специального исследования.

#### Sect. 5. **Sabulina** (Rchb.) Graebn.

13 (395). **M. hybrida** (Vill.) Schischk. 1936, Фл. СССР, 6: 488. — *Arenaria hybrida* Vill. 1779, Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 48. — *A. tenuifolia* L. 1753, Sp. Pl.: 424. — *Minuartia tenuifolia* (L.) Hiern, 1889, Journ. Bot. (London), 37: 321, non Nees ex Mart. 1814. — *M. turcomanica* Schischk. 1936, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 3: 168; Шишк. 1936, цит. соч.: 487. — *M. viscosa* auct. non Schinz et Thell.: Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 204; Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1: 243.

Описан по гербарным материалам из Европы.

**ЗП:** Аз.-Куб.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **БК:** Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мегр.-Зан.; **Т:**

Указан для **ЗП**: З. Ставр. (Гроссгейм, 1945: 208); **ЗЗ**: Адж. (Дмитриева, 1960: 316); **ВЗ**: Иорск.-Шек. (Гроссгейм, 1945: 204).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (от Ирана и Ирака до Пакистана), Ср., Южн. (вост. Пакистан) Азия.

14 (396). **M. regeliana** (Trautv.) Mattf. 1921, Bot. Jahrb. Syst. 57, 2: 29. — *Alsine tenuifolia* Crantz var. *regeliana* Trautv. 1860, Bull. Soc. Nat. Moscou, 33: 156.

Описан из Казахстана. *Л е с т о т у р у с* (Лазьков, 2006: 53): «Tersakan..., 30 VI 1840 [A. Schrenk]» (LE!).

Указан для **ВЗ** (Шишкин, 1936: 489; Цвелёв, 2004: 200).

Ср. Азия.

Никакого материала из Закавказья я не видел. По-видимому, следует согласиться с мнением А. А. Гроссгейма (1945: 316) об отсутствии данного вида на Кавказе.

#### Sect. 6. **Spectabiles** (Fenzl) Hayek

##### Subsect. 1. **Laricifoliae** (Mattf.) McNeill

15 (397). **M. aizoides** (Boiss.) Bornm. 1914, Beih. Bot. Centralbl. 31, 2: 193. — *Alsine aizoides* Boiss. 1842, Diagn. Pl. Or. sér. 1, 1: 47.

Описан из Турции. *Л е с т о т у р у с* (McNeill, 1963: 329): «In Alpibus Armeniae, № 589, Aucher-Eloy» (G; isolectotypus — K).

**ВП**: В. Ставр., Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЗК**: В. Куб.; **ЦК**: Малк., В. Тер.; **ВК**; **ЗЗ**: Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ**: Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич.; Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ**: Араг.; **ЮЗ**: Ерев., Севан., Нах.

Указан для **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЗЗ**: Рион.-Квир., **ЦЗ**: Триал.-Н. Карг.; **ЮЗЗ**: Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ**: Занг., Ю. Караб. (Гроссгейм, 1945: 210).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

16 (398). **M. circassica** (Albov) Woronow, 1914, в Фомин и Воронов, Опред. раст. Кавк. и Крыма, 2, 2: 181. — *Alsine circassica* Albov, 1894, Bull. Herb. Boiss. 2: 449. — *A. caucasica* Adams ex Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 203 (Fl. Cauc.), non Boiss. 1853. — *Minuartia caucasica* (Adams ex Rupr.) Mattf. 1919, in Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 5, 1: 941.

Описан с Кавказа («Circassie: Mont Ochten, 8000 p. (N. Alboff 1893. Exs. № 298)»).

**ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**; **ВК**; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич.; Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах.; **ЮЗ**: Ерев., Севан., Занг., Ю. Караб.

Указан для всех горных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 244); **ЦЗ**: Триал.-Н. Карг., Лори.; **ЮЗЗ**: Месх. (Гроссгейм, 1945: 210).

Юго-Зап. Азия (Турция).

##### Subsect. 2. **Spectabiles**

17 (399). **M. rhodocalyx** (Albov) Woronow, 1914, в Фомин и Воронов, Опред. раст. Кавк. и Крыма, 2, 2: 180. — *Alsine rhodocalyx* Albov, 1894, Bull. Herb. Boiss. 2: 255.

Описан с Западного Кавказа. Lectotypus (McNeill, 1963: 325): «Transcaucasia. Plantes du district Tschernomorsky (Province de la Mer Noire). Mt. Fichte paturages alpine, 14 IX 1893, № 479, N. Alboff» (LE!)

**ЗК:** Бело-Лаб.; **ЗЗ:** Абх.

Эндемик.

18 (400). **M. pseudoimbricata** Lazkov, 2010, Бот. журн. 95, 10: 1481. — *Alsine imbricata* Bieb. f. *glandulosa* Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math), sér. 7, 15, 2: 207 (Fl. Cauc.).

Описан с Кавказа («versus m. Elbrus in rup. alp.»). Lectotypus (Лазьков, 2010: 1481): «In rupibus mont. ad fl. Malka, 13 VII» (LE!).

**ЦК:** Малк.

Указан для **ЦК:** В. Тер. (Харадзе, 1938: 201).

Эндемик.

От *M. rhodocalyx* отличается зеленоватой чашечкой и тремя столбиками.

19 (401). **M. imbricata** (Bieb.) Woronow, 1914, в Фомин и Воронов, Опред. раст. Кавк. и Крыма, 2, 2: 180. — *Arenaria imbricata* Bieb. 1808, Fl. Taur-cauc. 1: 344. — *Minuartia colchica* Charadze, 1938, Тр. Тбил. бот. инст. 2: 206.

Описан с Кавказа. Lectotypus (McNeill, 1963: 328): «Ex alpinis Caucasie, Kobi, 1802» (LE!).

**ЗК:** Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Нах., Мегр.-Зан.

Указан для **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЗЗ:** Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах. (Гроссгейм, 1945: 211, 212).

Юго-Зап. Азия (Турция).

20 (402). **M. inamoena** (C. A. Mey.) Woronow, 1914, в Фомин и Воронов, Опред. раст. Кавк. и Крыма, 2, 2: 180. — *Arenaria inamoena* C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 218.

Описан с Кавказа. Lectotypus (McNeill, 1963: 326): «In summis alpinis Elborus (alt. 9500 p.), 10 VII 1829 [C. A. Meyer]» (LE!).

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.

Указан для **ВК:** Ассо-Арг.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Гроссгейм, 1945: 212).

Эндемик.

*M. inamoena* в типичной форме хорошо отличается от *M. imbricata*, однако встречаются промежуточные растения, имеющие форму и длину лепестков почти как у *M. inamoena*, но часто более жесткое опушение чашечки (*M. imbricata* f. *hirsuta* Rupr. — *M. inamoena* var. *hirsuta* (Rupr.) Charadze).

21 (403). **M. brotherana** (Trautv.) Woronow, 1914, в Фомин и Воронов, Опред. раст. Кавк. и Крыма, 2, 2: 179. — *Stellaria brotherana* Trautv. 1882, Increm. Fl. Phaen. Ross. 1: 129. — *Arenaria brotherana* Trautv. 1883, Тр. Петерб. бот. сада, 8: 151. — *Minuartia ruprechtiana* Charadze, 1938, Тр. Тбил. бот. инст. 2: 208. — *M. trautvetteriana* Sosn. et Charadze, 1938, Тр. Тбил. бот. инст. 2: 210.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (Лазьков, 2010: 1482): «Ossetia, in alpe Kad-lasen, pr. fl. Didi Liachva, 20 VII 1881, A. H. et V. F. Brotherus» (LE!).

**ЦК:** Малк., В. Тер.; **ЗЗ:** Инг.-Рион.

Указан для **ВК:** В. Сулак. (Гуссейнов, 1990: 236).

Эндемик.

Вероятно, указан для **ВК** ошибочно.

По-видимому, *M. brotherana* — сильно дернистая высокогорная форма *M. imbricata*.

22 (404). **M. charadzeae** Lazkov, 2010, Бот. журн. 95, 10: 1481. — *Alsine imbricata* Bieb. f. *obtusifolia* Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 207 (Fl. Саус.). — *Minuartia ruprechtiana* Charadze, 1938, Тр. Тбил. бот. инст. 2: 208, р. p., quoad descr., excl. syn. *Stellaria brotherana* et *Alsine brotherana*. — *Stellaria brotherana* auct. non Trautv.: Харадзе, 1938, Тр. Тбил. бот. инст. 2: 208. — *Minuartia brotheriana* auct. non (Trautv.) Woronow: Харадзе, 1938, цит. соч.: 208; она же, 1978, Фл. Груз. изд. 2, 4: 81.

Описан с Кавказа («in rupib. subalp. Kobi»). *Lectotypus* (Лазьков, 2010: 1481): «In rupib. m. ... Kchele pr. Kobi, Hohenacker» (LE!).

**ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Тер.; **ВК;** **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.; Ширв.

Эндемик.

Номенклатурные и таксономические вопросы, связанные с этим видом, рассмотрены в отдельной работе (Лазьков, 2010).

#### Sect. 7. **Tryphane** (Fenzl) Hayek

23 (405). **M. verna** (L.) Hiern. 1899, Journ. Bot. (London), 37: 320. — *Arenaria verna* L. 1767, Mantissa Pl. 1: 72.

Описан из Южной Европы. *Lectotypus* (Halliday, 1964: 12): Herb. Linn. 585.30 (LINN).

**ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел., Пшад.-Джубг.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос; **ЮЗЗ:** Месх.

Указан для всех горных районах Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 244); **ЗК:** Бело-Лаб. (Гроссгейм, 1945: 210), Уруп-Теб. (Воробьева, Онопченко, 2001: 36), В. Куб.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг. (Очиаури, 1981: 56), Кубин. (Гроссгейм, 1945: 210); **ЗЗ:** Абх. (Колаковский, 1980: 167), Адж. (Дмитриева, 1960: 317), Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах. (Гроссгейм, 1945: 210),

Европа; Средиз.; Сев., Ср., Центр., Вост. Азия.

#### 18 (71). **Queria** L.\*

1 (406). **Q. hispanica** L. 1753, Sp. Pl.: 90. — *Scleranthus hamatus* Hausskn. et Bornm. 1891, Mitt. Geogr. Ges. Thür. Jena, 9: 17. — *Minuartia hamata* (Hausskn. et Bornm.) Mattf. 1921, Bot. Jahrb. Syst. 57, 2: 29.

\* Г. А. Лазьков.