

Описан из Испании.

ВП: Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ;** **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг. (Галушко, 1978: 242); **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах. (Гвиниашвили, 1978: 74); **ЮЗ:** Севан., Дар. (Гроссгейм, 1945: 202).

Атл., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Ирак, Иран), Ср. Азия.

19 (72). *Sagina* L.*

Sect. 1. *Sagina*

1 (407). *S. apetala* Ard. 1764, Animadv. Bot. Spec. Alt. 2: 22; Гвин. 1978, Фл. Груз. изд. 2, 4: 67. — *S. ciliata* Fries, 1816, in Lilj. Utkast Sv. Fl. ed. 3: 713. — *S. oxyssepala* Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 663; Штейнб. 1936, Фл. СССР, 6: 475; Гвин. 1978, цит. соч.: 68.

Описан по культивированным растениям неизвестного происхождения. *Le ct o t y p u s* (Crow, 1978: 73); Herb. Linn. 177.2 (LINN).

ЗЗ: Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ВЗ:** Ширв.; **Т:**

Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Иран, Турция).

Как *S. apetala* разными авторами определялись растения как с отогнутыми при плодах, более притупленными, эллиптическими, так и прижатыми к коробочке, яйцевидно-ланцетными, заостренными чашелистиками. Судя по протологу (Arduino, 1764), именно последние должны относиться к *S. apetala*. Противоположного мнения придерживался Р. Е. Boissier (1867), поэтому он и описал вид *S. oxyssepala*.

2 (408). *S. procumbens* L. 1753, Sp. Pl.: 128.

Описан из Европы. *Le ct o t y p u s* (Jonsell, Jarvis, 1993: 83); [Icon] J. F. Séguier, 1754, Pl. Veronensis, 1: 421, tab. 5, fig. 5.

ЗП: З. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Тер.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗ:** Севан., Нах.

Указан для **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг. (Очиаури, 1981: 57); **ЗЗ:** Абх. (Колаковский, 1980: 170), Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрин.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев. (Гроссгейм, 1945: 200).

Европа; Средиз.; Вост. Азия; Сев. Америка.

Для точного установления видовой принадлежности необходимы дополнительные сборы вида из районов **ЦК:** В. Тер. («Терская область, окрестности Владикавказа, левый берег Терека у лесной Караулки, на выгоне, 5 VI 1916, Н. Введенский»); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. («Местность Эрмани по дороге к Дигору 2 VIII 1938, Е. В. Шмидт; [там же] на берегу Эрмани-дон, против села Хсэнаг кау, 4 VII 1938, И. Абрамов»). Изученные нами образцы из указанных районов обладают железисто опушенными цветоножками и чашелистиками, что приближает их к испанскому *S. nevadensis* Boiss.

3 (409). *S. saginoides* (L.) H. Karst. 1882, Deutsche Fl.: 539. — *Spergula saginoides* L. 1753, Sp. Pl.: 441.

* Г. А. Лазыков.

Описан из Европы и Сибири. *Lectotypus* (Crow, 1978: 34): Herb. Linn. 604.6 (LINN).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **БК; ЦК:** Малк., В. Тер.; **ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Указан для всех высокогорных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 242);

ЮЗ: Севан. (Гроссгейм, 1945: 200).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Ирак, Иран), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

Sect. 2. **Spargella** (Rchb.) W. D. J. Koch

4 (410). **S. nodosa** (L.) Fenzl, 1833, Vers. Darstell. Alsin.: tab. ad p. 18. — *Spergula nodosa* L. 1753, Sp. Pl.: 440.

Описан по гербарным материалам из Европы. *Lectotypus* (Crow, 1978: 25): Herb. Linn. 604.4 (LINN).

ЦК: В. Тер.; **БК:** В. Сулак.

Европа; Сев. Азия; Сев. Америка (заносное).

Нахождение на Кавказе этого вида вызывает сомнение, так как имеются только старые, никем не повторенные сборы Лаговского, этикетки которого, к сожалению, не всегда достоверны.

Trib. 2. **Scleranthae** Link ex DC.

20 (73). **Scleranthus** L.*

1 (411). **S. annuus** L. 1753, Sp. Pl.: 406.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 1993: 86): Herb. Linn. 578.1 (LINN).

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставро., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; БК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЗП:** З. Ставро.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 247); **ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ЮЗ:** Севан. (Гроссгейм, 1945: 220).

Европа; Средиз.; Юго-Зап., Вост. (заносное) Азия; Сев. Африка.

2 (412). **S. polycarpus** L. 1756, Cent. Pl. 2: 17.

Описан по гербарным материалам из Франции и Италии. *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 1994: 158): Herb. Linn. 578.3 (LINN).

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП; ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум.; **БК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ; ЮЗ:** Нах., Занг., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЦК:** Малк.; **БК:** Кубин.; **ЗЗ:** Рион.-Квир. (Гроссгейм, 1945: 220), Адж. (Дмитриева, 1960: 318); **ЮЗ:** Севан. (Гроссгейм, 1945: 220).

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **БК:** Ассо-Арг. (Галушко, 1978: 247).

Европа; Средиз.

* Г. А. Лазьков.