

Fam. 43. **CARYOPHYLLACEAE** Juss., nom. cons.

Subfam. 1. **ILLECEBROIDEAE** Arn.
(*PARONYCHIOIDEAE* A. St.-Hil. ex Fenzl)

Trib. 1. **Sperguleae** Dumort.

1 (54). **Spergula** L.*

Sect. 1. **Spergula**

1 (291). **S. arvensis** L. 1753, Sp. Pl.: 440. — *S. sativa* Boenn. 1824, Prodr. Fl. Monast. Westphal.: 135. — *S. vulgaris* Boenn. 1824, l. c.: 135.

Описан из Европы. *Лектотипус* (Turrill, 1956: 24): Herb. Linn. 604.1 (LINN).

ЗК: Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **БК:** Ассо-Арг.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Караб.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Галушко, 1978: 247); **ВП:** Тер.-Кум. (Гуссейнов, 1990: 236); **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** Малк. (Галушко, 1978: 247); **БК:** Ман.-Самур. (Гуссейнов, 1990: 236); **ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Лори. (Гроссгейм, 1945: 222).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное).

2 (55). **Spergularia** (Pers.) J. Presl et C. Presl, nom. cons.*

Sect. 1. **Diandrae** Tzvel.

1 (292). **S. diandra** (Guss.) Heldr. et Sart. 1855, in Heldr. Herb. Graec. Norm.: №№ 492, 1124. — *Arenaria diandra* Guss. 1827, Fl. Sicul. Prodr. 1: 515. — *Lepigonum microspermum* Kindb. 1863, Monogr. Gen. Lepigon.: 26. — *Spergularia microsperma* (Kindb.) Asch. 1867, in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 1: 305. — *S. adenophora* Vved. et Botsch. 1941, Бот. мат. (Ташкент), 3: 4. — *S. campestris* auct. non (L.) Asch.: Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 223, p. p.

Описан с Сицилии. *Лектотипус* (Snogerup, Snogerup, 1997: 236): «[Italy, Sicily] in argillosis inundates maritimis, Gussone» (NAP).

ВЗ: Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Севан., Нах.

Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран), Ср. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное).

Sect. 2. **Spergularia**

2 (293). **S. salina** J. Presl et C. Presl, 1819, Fl. Čech.: 95. — ?*Arenaria rubra* L. β. *marina* L. 1753, Sp. Pl.: 423. — *Holosteum sperguloides* Lehm. 1828, Nov. Stirp. Pugil. 1: 21. — *Arenaria halophila* Bunge, 1830, in Ledeb. Fl. Alt. 2: 162. — ?*Spergularia marina* (L.) Griseb. 1843, Spicil. Fl. Rumel. 1: 213. — *S. rubra* (L.) J. Presl et C. Presl var. *pinquis* Fenzl, 1843, in Ledeb. Fl. Ross. 2, 4: 167. — *S. sperguloides* (Lehm.) Heynh. 1846, Nomencl. Bot. 2: 690. — *S. bungeana* Tzvel. 2000, Новости сист. высш. раст. 32: 29. — *S. pinquis* (Fenzl) Tzvel. 2000, цит. соч.: 29.

* Г. А. Лазьков.

Описан из Чехии.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Кум.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **Т:**

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ВП:** Тер.-Сулак. (Гроссгейм, 1945: 223).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран), Ср. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное).

3 (294). **S. rubra** (L.) J. Presl et C. Presl, 1819, Fl. Čech.: 95. — *Arenaria rubra* a. *campestris* L. 1753, Sp. Pl.: 423. — *S. campestris* (L.) Asch. 1859, Fl. Prov. Brandenb. 2: 94.

Описан из Европы. Lectotypus (Roszbach, 1940: 109): Herb. Linn. 585.20 (LINN).

ВК: Ман.-Самур. («Derbent, Lagowski»); **ЗЗ:** Инг.-Рион. («Груз. ССР, ст. Зугдиди, эксп. Массаетова»).

Указан для **ЗП:** З. Ставр. (Танфильев, Кононов, 1987: 40); **ВП:** В. Ставр. (Галушко, 1978: 247), Тер.-Кум. (Гроссгейм, 1945: 223), Тер.-Сулак. (Галушко, 1978: 247); **ЦЗ;** **ЗК:** Уруп-Теб. (Гроссгейм, 1945: 223), **ЗК:** В. Куб. (Гроссгейм, 1945: 223); **ВК:** В. Сулак. (Галушко, 1978: 247); **ЦК:** В. Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 40), В. Тер. (Гвинианидзе, 1978: 112); **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **Т** (Гроссгейм, 1945: 223).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран) Азия; Сев. Америка (заносное); Австралия (заносное).

В Гербарии LE имеются только 2 достоверных образца. По-видимому, многие указания ошибочны.

Sect. 3. **Leiosperma** (Kindb.) Tzvel.

4 (295). **S. media** (L.) C. Presl, 1826, Fl. Sicul. 1: 161. — *Arenaria media* L. 1762, Sp. Pl. ed. 2: 606. — *A. marginata* DC. 1805, in DC. et Lam. Fl. Fr. ed. 3, 4, 2: 793, nom. illeg. — *Spergularia marginata* (DC.) Kitt. 1844, Taschenb. Fl. Deutschl. ed. 2: 1003.

Описан из Германии и Франции. Lectotypus (Roszbach, 1940: 121): Herb. Linn. 585.23 (LINN).

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк.; **ВК;** **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Ерев.; **Т:**

Указан для **ЗП:** З. Ставр. (Гроссгейм, 1945: 222), В. Ставр. (Галушко, 1978: 247); **ЦК:** В. Кум., В. Тер. (Галушко, 1978: 247); **ЗЗ:** Адж. (Гвинианидзе, 1978: 111).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран), Ср. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное).

Н. Н. Цвелёв (2004) указал для Кавказа *S. bosconei* (Scheele) Asch. et Graebn. Этот вид собирался только на территории Турции.