

3 (413). **S. uncinatus** Schur, 1850, Verh. Mitt. Siebenb. Ver. Naturw. 1, 7: 107.

Описан из Европы.

ЗК: Бело-Лаб.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос., Лори.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Дар., Нах., Мегр.-Зан.; **Т:**

Указан для **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг. (Очиаури, 1981: 57); для всех горных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 247); **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Гроссгейм, 1945: 220), Абх. (Колаковский, 1980: 172); **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Занг. (Гроссгейм, 1945: 220).

Центр., Юго-Вост. Европа.

4 (414). **S. perennis** L. 1753, Sp. Pl.: 406.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 1994: 158): Herb. Linn. 578.2 (LINN).

ЗЗ: Рион.-Квир., Адж.; **ЮЗЗ:** Месх.

Указан для **ЮЗЗ:** Араг. (Гроссгейм, 1945: 220); **ЗЗ:** Абх. (Гвинианидзе, 1978: 210). Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция).

Subfam. 3. CARYOPHYLLOIDEAE Arn.

Trib. 1. **Caryophylleae** Lam. et DC.

21 (74). **Acanthophyllum** C. A. Mey.*

Sect. 1. **Acanthophyllum**

1 (415). **A. mucronatum** C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 210.

Описан из Талыша. *Lectotypus* (Schiman-Czeika, 1988: 280): «In locis lapidosis aridis prope pagum Swant, 22 VI 1830 [C. A. Meyer]» (LE!).

ЮЗ: Ерев., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. (Туркменистан) Азия.

Sect. 2. **Oligosperma** Schiman-Czeika

2 (416). **A. squarrosus** Boiss. 1853, Diagn. Pl. Or. sér. 2, 1: 81.

Описан из Ирана и Пакистана. *Lectotypus* (Schiman-Czeika, 1988: 302): «In collibus aridis pr. u. Schiras, 30 V 1812 [1842], № 440, Th. Kotschy» (G; *isolecotypi* — LE (2)!, P, WU).

ЮЗ: Нах.

Юго-Зап. Азия (Иран, Афганистан).

22 (75). **Allochrusa** Bunge*

1 (417). **A. bungei** Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 561.

* Г. А. Лазыков.