

Subgen. 4. **Pseudosaponaria** F. N. Williams

Sect. **Pseudosaponaria**

26 (445). **G. pilosa** Huds. 1767, Philos. Trans. Roy. Soc. London (Biol.), 56: 252. — *Silene porrigens* Gouan ex L. 1768, Syst. Nat. ed. 12, 3: 230. — *Gypsophila porrigens* (Gouan ex L.) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 557.

Описан по культивированным в Ботаническом саду Челси растениям неизвестного происхождения. *Л е с т о т у р у с* (Barkoudah, 1962: 152): «Cultivated in Chelsea Gardens» (BM).

Указан для **ВЗ**: Караб. (Рупрехт, 1869: 182); **ЮЗ**: Ерев. (Тахтаджян, Фёдоров, 1972: 79), Нах. (Рупрехт, 1969: 182).

Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. Азия.

24 (77). **Vaccaria** Wolf*

1 (446). **V. hispanica** (Mill.) Rauschert, 1965, Wiss. Zeitschr. Univ. Halle, 14: 496; Rauschert, 1966, Feddes Repert. 73, 1: 52. — *Saponaria hispanica* Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: in corrig., № 4. — *S. segetalis* Neck. 1768, Delic. Gallo-Belg. 1: 194, nom. illeg. — *Vaccaria pyramidata* Medik. 1789, Philos. Bot. 1: 96. — *Saponaria vaccaria* L. var. *grandiflora* Fisch. ex Ser. 1824, in DC. Prodr. 1: 365. — *Vaccaria grandiflora* (Fisch. ex Ser.) Jaub. et Spach, 1850, Ill. Pl. Or. 3: tab. 231. — *V. segetalis* (Neck.) Garcke, 1864, in Asch. Fl. Prov. Brandenb. 1: 84.

Описан по культивированным растениям неизвестного происхождения. *Л е с т о т у р у с* (Burt, Lewis, 1952: 342): Herb. Clifford: 166, «*Saponaria* 2» (BM).

ЗП; **ЗК**: Бело-Лаб.; **ЦК**: В. Тер.; **ВК**: В. Сулак.; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ**; **ЮЗЗ**; **ЮЗ**; **Т**.

Указан для всех районов Предкавказья (Галушко, 1978: 262); **ЗК**: Уруп-Теб.; **ЦК**: В. Кум., Малк.; **ЦЗ**: Лори. (Гроссгейм, 1945: 278).

Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср., Вост. (заносное), Южн. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное).

25 (78). **Saponaria** L.*

Subgen. 1. **Saponaria**

Sect. **Saponaria**

1 (447). **S. glutinosa** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 322.

Описан из Крыма. *Л е с т о т у р у с* (Шулц, 1984: 1479): «*Ex Tauria*» (LE!).

ЗП: Аз.-Куб.; **СЗЗ**: Анап.-Гел.

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия; Сев. Африка.

2 (448). **S. officinalis** L. 1753, Sp. Pl.: 408.

Описан из Центральной Европы. *Л е с т о т у р у с* (Шулц, 1984: 1479): Herb. Linn. 580.1 (LINN).

* Г. А. Лазьков.

ЗП; ВП: В. Ставр.; **ЗК; ЦК; ВК:** Ассо-Арг.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Месх.

Указан для **ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак. (Галушко, 1978: 268); **ВК:** Кубин. (Рзазаде, 1952: 386); **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Севан. (Гроссгейм, 1945: 386).

Атл., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

Subgen. 2. **Saporizae** Simmler

Sect. 1. **Parviflorae** (Simmler) V. A. Shultz

3 (449). **S. cerastoides** Fisch. ex C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 212. Описан из Ленкорани. *Lectotypus* (Шулц, 1984: 1480): «Lenkoran, 29 V 1830 [C. A. Meyer]» (LE!).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; **Т:**

Указан для **ЗЗ:** Абх., Адж. (Гвинианидзе, 1978: 206), Рион.-Квир. (Гроссгейм, 1945: 296).

Юго-Зап. Азия (Иран, Турция).

Sect. 2. **Proteinia** Ser.

Subsect. **Bifidae** (Simmler) V. A. Shultz

4 (450). **S. orientalis** L. 1753, Sp. Pl.: 409.

Описан с «Востока». *Lectotypus* (Шулц, 1984: 1481): Herb. Linn. 580.10 (LINN).

ВК; ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ; Т:**

Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. (Туркменистан) Азия.

5 (451). **S. viscosa** C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 212.

Описан из Талыша. *Lectotypus* (Шулц, 1984: 1481): «In campis et collibus siccis lapidosis pr. pagum Swant, 20 VI 1830, № 145 [C. A. Meyer]» (LE!).

ЮЗ: Дар., Нах., Мегр.-Зан.; **Т:**

Юго-Зап. Азия (Турция, Ирак, Иран).

Subgen. 3. **Spanizium** (Griseb.) Lazkov comb. nova.

— *Spanizium* Griseb. 1843, Spic. Fl. Rumel. 1: 180

Typus: Saponaria prostrata Willd. (*Spanizium ocyroides* Griseb.).

Sect. **Spanizium** (Griseb.) Boiss.

6 (452). **S. prostrata** Willd. 1809, Enum. Pl. Horti Berol. 1: 465. — *Spanizium ocyroides* Griseb. 1843, Spic. Fl. Rumel. 1: 180. — *S. prostratum* (Willd.) V. A. Shultz, 1984, Бот. журн. 69, 4: 530.

Описан из Турции. *Lectotypus* (Hedge, 1967: 146): «Cultivated specimen grown at the Berlin Botanic Garden from seed from Galatia» (B-WILLD).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Месх.

Указан для **ЗЗ:** Рион.-Квир.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах. (Гроссгейм, 1945: 296).
Юго-Зап. Азия (Турция).

26 (79). *Dianthus* L.*

Sect. 1. *Armerium* F. N. Williams

1 (453). *D. armeria* L. 1753, Sp. Pl.: 410.

Описан из Европы.

ЗП; ЗК: Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК; ВК:** Ман.-Самур., Кубин.;
СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-
Муровд., Ширв.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Нах.; **Т:**

Атл., Сев., Центр., Южн., Юго-Вост. (Крым), Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап.
Азия (Турция, сев. Иран).

2 (454). *D. pseudarmeria* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 323.

Описан из Крыма. *Lectotypus* (Kuzmina, 2003: 96): «In Tauria» (LE!).

ЗП: З. Ставр.; **ЗК:** Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** Ассо-Арг.,
В. Сулак., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Зернов, 2006: 259); **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш.
(Галушко, 1978: 263).

Центр., Южн., Юго-Вост. (Крым), Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).

Sect. 2. *Carthusiani* (Boiss.) F. N. Williams

Subsect. 1. *Microlepidus* F. N. Williams

3 (455). *D. membranaceus* Borbás, 1876, Österr. Bot. Zeitschr. 26: 125. — *D. rehmannii* Włocki, 1880, Kosmos (Lvov), 5: 494. — *D. pseudobarbatus* Bess. ex Włocki, 1885, Deutsche Bot. Monatsschr. 3, 9: 131. — *D. glabriusculus* auct. non (Kit.) Borbás: Клеопов, 1929, Вісн. Київ. бот. саду, 14: 11.

Описан из Западной Украины.

?**ЗП:** Аз.-Куб.

Центр., Вост. Европа.

Вид *D. rehmannii*, впоследствии относимый самим В. Włocki (1884) в синонимы *D. membranaceus*, описан «с Кавказа», однако среди изученного кавказского материала *D. membranaceus* обнаружен не был.

Subsect. 2. *Carthusianoides* F. N. Williams

4 (456). *D. borbasii* Vandas, 1886, Öesterr. Bot. Zeitschr. 36: 193.

Описан из Украины.

ЗП: З. Ставр.

* М. Л. Кузьмина: секции *Armerium*, *Macrolepidus*, *Barbulatum*, *Carthusiani*; А. А. Нерсесян: секции *Dianthus*, *Fimbriati*, *Verruculosi*.