

28 (81). **Petrorhagia** (Ser. ex DC.) Link*

Sect. **Pseudogypsophila** (A. Br.) P. W. Ball et Heywood

1 (516). **P. alpina** (Hablitz) P. W. Ball et Heywood, 1964, Bull. Brit. Mus. (Bot.), 3, 4: 145. — *Gypsophila alpina* Hablitz, 1783, Neue Nord. Beytr. Phys. Geogr. Erd- Völkerbeschreib. 4: 57. — *G. stricta* Bunge, 1829, in Ledeb. Icon. Pl. Fl. Ross. 1: 4, tab. 5. — *Tunica stricta* (Bunge) Fisch. et C. A. Mey. 1837, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 4: 50. — *Fiedleria alpina* (Hablitz) Ovcz. 1967, Докл. АН ТаджССР, 10, 1: 52.

Описан из Ирана. Лектотипус (Бобров, 1958: 1546): «[Гилян] in alpinibus Samamisisicis [S. G. Gmelin]» (LE!).

ЗЗ: Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ;** **Т.**

Указан для **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт. (Гвинианидзе, 1978: 176); **ВЗ:** Мургу-Муровд. (Шишкин, Аветисян, 1956: 178); **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах. (Гвинианидзе, 1978: 176).

Юго-Зап. (от Турции до Пакистана), Ср., Центр., Южн. (вост. Пакистан) Азия.

2 (517). **P. saxifraga** (L.) Link, 1831, Handbuch, 2: 235. — *Dianthus saxifragus* L. 1753, Sp. Pl.: 413. — *Tunica saxifraga* (L.) Scop. 1772, Fl. Carniol. ed. 2, 1: 300.

Описан из Европы. Лектотипус (Jonsell, Jarvis, 1994: 157): Herb. Burser XVI: 42 (UPS-BURSER).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг.; **ЗЗ;** **ЦЗ;** **ВЗ;** **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **Т.**

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

3 (518). **P. cretica** (L.) P. W. Ball et Heywood, 1964, Bull. Brit. Mus. (Bot.), 3, 4: 142. — *Saponaria cretica* L. 1762, Sp. Pl. ed. 2: 584. — *Tunica cretica* (L.) Fisch. et C. A. Mey. 1837, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 4: 49. — *T. pachygona* Fisch. et C. A. Mey. 1837, l. c.: 50.

Описан с Крита. Лектотипус (Davis, 1957: 164): Herb. Linn. 580.4 (LINN).

ВЗ: Ширв.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мегр.-Зан.

Указан для **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Гвинианидзе, 1978: 178).

Средиз.; Юго-Зап. (Сирия, Ирак, Иран), Ср. (Туркменистан) Азия.

29 (82). **Velezia** L.*

1 (519). **V. rigida** L. 1753, Sp. Pl.: 332.

Описан из Южной Европы. Лектотипус (Strid in Cafferty, Jarvis, 2004: 1053): Herb. Linn. 326.1 (LINN!)

ВП: Тер.-Сулак.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ;** **ЮЗ:** Ерев., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ВК:** В. Сулак. (Галушко, 1978: 269); **ЮЗ:** Дар. (Гроссгейм, 1945: 298).

* Г. А. Лазьков.