

28 (81). **Petrorhagia** (Ser. ex DC.) Link*

Sect. **Pseudogypsophila** (A. Br.) P. W. Ball et Heywood

1 (516). **P. alpina** (Hablitz) P. W. Ball et Heywood, 1964, Bull. Brit. Mus. (Bot.), 3, 4: 145. — *Gypsophila alpina* Hablitz, 1783, Neue Nord. Beytr. Phys. Geogr. Erd- Völkerbeschreib. 4: 57. — *G. stricta* Bunge, 1829, in Ledeb. Icon. Pl. Fl. Ross. 1: 4, tab. 5. — *Tunica stricta* (Bunge) Fisch. et C. A. Mey. 1837, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 4: 50. — *Fiedleria alpina* (Hablitz) Ovcz. 1967, Докл. АН ТаджССР, 10, 1: 52.

Описан из Ирана. Лектотипус (Бобров, 1958: 1546): «[Гилян] in alpinibus Samamisisicis [S. G. Gmelin]» (LE!).

ЗЗ: Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ;** **Т.**

Указан для **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт. (Гвинианидзе, 1978: 176); **ВЗ:** Мургу-Муровд. (Шишкин, Аветисян, 1956: 178); **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах. (Гвинианидзе, 1978: 176).

Юго-Зап. (от Турции до Пакистана), Ср., Центр., Южн. (вост. Пакистан) Азия.

2 (517). **P. saxifraga** (L.) Link, 1831, Handbuch, 2: 235. — *Dianthus saxifragus* L. 1753, Sp. Pl.: 413. — *Tunica saxifraga* (L.) Scop. 1772, Fl. Carniol. ed. 2, 1: 300.

Описан из Европы. Лектотипус (Jonsell, Jarvis, 1994: 157): Herb. Burser XVI: 42 (UPS-BURSER).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Тиб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг.; **ЗЗ;** **ЦЗ;** **ВЗ;** **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **Т.**

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

3 (518). **P. cretica** (L.) P. W. Ball et Heywood, 1964, Bull. Brit. Mus. (Bot.), 3, 4: 142. — *Saponaria cretica* L. 1762, Sp. Pl. ed. 2: 584. — *Tunica cretica* (L.) Fisch. et C. A. Mey. 1837, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 4: 49. — *T. pachygona* Fisch. et C. A. Mey. 1837, l. c.: 50.

Описан с Крита. Лектотипус (Davis, 1957: 164): Herb. Linn. 580.4 (LINN).

ВЗ: Ширв.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мегр.-Зан.

Указан для **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Гвинианидзе, 1978: 178).

Средиз.; Юго-Зап. (Сирия, Ирак, Иран), Ср. (Туркменистан) Азия.

29 (82). **Velezia** L.*

1 (519). **V. rigida** L. 1753, Sp. Pl.: 332.

Описан из Южной Европы. Лектотипус (Strid in Cafferty, Jarvis, 2004: 1053): Herb. Linn. 326.1 (LINN!)

ВП: Тер.-Сулак.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ;** **ЮЗ:** Ерев., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ВК:** В. Сулак. (Галушко, 1978: 269); **ЮЗ:** Дар. (Гроссгейм, 1945: 298).

* Г. А. Лазыков.

Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (от Турции и Ирака до Пакистана), Южн. (вост. Пакистан), Ср. Азия.

Trib. 2. **Sileneae** DC.

30 (83). **Silene** L., nom. cons.*

Subgen. 1. **Behen** (Moench) Bunge

Sect. 1. **Behen** (Moench) Dumort.

1 (520). **S. crispata** Steven, 1856, Bull. Soc. Nat. Moscou, 29, 1: 315. — *S. cserei* auct. non Baumg.: Шишк. 1936, Фл. СССР. 6: 598, р. р., quoad syn. *S. crispata*.

Описан из Украины. *Le ct o t y p u s* (Иконников, 1975: 198): «Sudak» (LE!).

СЗЗ: Анап.-Гел.

Юго-Вост. Европа.

От широко распространенного вида *S. cserei* Baumg. отличается преимущественно тупобугорчатыми семенами и, отчасти, волнистыми по краю листьями.

2 (521). **S. cserei** Baumg. 1817, Enum. Stirp. Transsilv. 3: 345. — *S. saponariifolia* Schott ex Bess. 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 47. — *S. schottiana* Schur, 1866, Enum. Pl. Transsilv. 103. — *S. conringiifolia* Andr. ex Rogow. 1869, Обозр. высш. спор. раст. Киев. окр.: 44. — *S. aeoniopsis* Bornm. 1940, Feddes Repert. (Beih.) 89, 1: 112. — *S. alexeji* Kolak. 1948, Зам. сист. георг. раст. (Тбилиси), 14: 65. — *S. cserei* subsp. *aeoniopsis* (Bornm.) Chowdhuri, 1957, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 22: 269. — *S. caliacrae* Jordanov et Panov, 1966, Фл. Бълг. 3: 473, 593. — *S. anatolica* Melzh. et A. Baytop, 1980, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 38, 3: 449.

Описан из Румынии.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**: В. Кум., Малк.; **ВК**: Ман.-Самур.; **ЗЗ**: Абх.

Указан для **ЗП**: З. Ставр. (Танфильев, Кононов, 1987: 40); **ВП**: В. Ставр.; **ЗК**: Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1978: 256); **ВК**: Кубин. (Гроссгейм, 1945: 235).

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция); Сев. Америка (зачносное).

3 (522). **S. vulgaris** (Moench) Garcke, 1869, Fl. N. Mitt.-Deutschl. ed. 9: 64. — *Behen vulgaris* Moench, 1794, Methodus: 709. — *Cucubalus behen* L. 1753, Sp. Pl.: 414. — *C. latifolius* Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: № 2. — *C. venosus* Gilib. 1782, Fl. Lithuan. 2: 165, nom. inval. — *Silene cucubalus* Wibel, 1790, Prim. Fl. Werth.: 241. — *S. inflata* Sm. 1800, Fl. Brit.: 467, nom. illeg. — *S. commutata* Guss. 1827, Fl. Sicul. Prodr. 1: 499. — *S. puberula* Jord. ex Boreau, 1857, Fl. Centre Fr. ed. 3, 2: 94, non Bertol. 1842. — *S. wallichiana* Klotzsch, 1862, Bot. Ergebn. Reise Waldem.: 139, tab. 30. — *S. venosa* (Gilib.) Asch. 1864, Fl. Prov. Brandenb. 1: 86. — *S. cucubalus* var. *bosniaca* Beck, 1891, Ann. Naturh. Mus. (Wien), 6: 333. — *S. bosniaca* (Beck) Hand.-Mazz. 1905, Österr. Bot. Zeitschr. 55: 428. — *S. latifolia* (Mill.) Britten et Rendle, 1907, List Brit. Seed-Pl. Ferns: 5, non Poir. 1789. — *S. vulgaris* (Moench) Garcke var.

* Г. А. Лазьков.