

Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (от Турции и Ирака до Пакистана), Южн. (вост. Пакистан), Ср. Азия.

Trib. 2. **Sileneae** DC.

30 (83). **Silene** L., nom. cons.*

Subgen. 1. **Behen** (Moench) Bunge

Sect. 1. **Behen** (Moench) Dumort.

1 (520). **S. crispata** Steven, 1856, Bull. Soc. Nat. Moscou, 29, 1: 315. — *S. cserei* auct. non Baumg.: Шишк. 1936, Фл. СССР. 6: 598, р. р., quoad syn. *S. crispata*.

Описан из Украины. *Le ct o t y p u s* (Иконников, 1975: 198): «Sudak» (LE!).

СЗЗ: Анап.-Гел.

Юго-Вост. Европа.

От широко распространенного вида *S. cserei* Baumg. отличается преимущественно тупобугорчатыми семенами и, отчасти, волнистыми по краю листьями.

2 (521). **S. cserei** Baumg. 1817, Enum. Stirp. Transsilv. 3: 345. — *S. saponariifolia* Schott ex Bess. 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 47. — *S. schottiana* Schur, 1866, Enum. Pl. Transsilv. 103. — *S. conringiifolia* Andr. ex Rogow. 1869, Обозр. высш. спор. раст. Киев. окр.: 44. — *S. aeoniopsis* Bornm. 1940, Feddes Repert. (Beih.) 89, 1: 112. — *S. alexeji* Kolak. 1948, Зам. сист. георг. раст. (Тбилиси), 14: 65. — *S. cserei* subsp. *aeoniopsis* (Bornm.) Chowdhuri, 1957, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 22: 269. — *S. caliacrae* Jordanov et Panov, 1966, Фл. Бълг. 3: 473, 593. — *S. anatolica* Melzh. et A. Baytop, 1980, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 38, 3: 449.

Описан из Румынии.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**: В. Кум., Малк.; **ВК**: Ман.-Самур.; **ЗЗ**: Абх.

Указан для **ЗП**: З. Ставр. (Танфильев, Кононов, 1987: 40); **ВП**: В. Ставр.; **ЗК**: Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1978: 256); **ВК**: Кубин. (Гроссгейм, 1945: 235).

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция); Сев. Америка (заносное).

3 (522). **S. vulgaris** (Moench) Garcke, 1869, Fl. N. Mitt.-Deutschl. ed. 9: 64. — *Behen vulgaris* Moench, 1794, Methodus: 709. — *Cucubalus behen* L. 1753, Sp. Pl.: 414. — *C. latifolius* Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: № 2. — *C. venosus* Gilib. 1782, Fl. Lithuan. 2: 165, nom. inval. — *Silene cucubalus* Wibel, 1790, Prim. Fl. Werth.: 241. — *S. inflata* Sm. 1800, Fl. Brit.: 467, nom. illeg. — *S. commutata* Guss. 1827, Fl. Sicul. Prodr. 1: 499. — *S. puberula* Jord. ex Boreau, 1857, Fl. Centre Fr. ed. 3, 2: 94, non Bertol. 1842. — *S. wallichiana* Klotzsch, 1862, Bot. Ergebn. Reise Waldem.: 139, tab. 30. — *S. venosa* (Gilib.) Asch. 1864, Fl. Prov. Brandenb. 1: 86. — *S. cucubalus* var. *bosniaca* Beck, 1891, Ann. Naturh. Mus. (Wien), 6: 333. — *S. bosniaca* (Beck) Hand.-Mazz. 1905, Österr. Bot. Zeitschr. 55: 428. — *S. latifolia* (Mill.) Britten et Rendle, 1907, List Brit. Seed-Pl. Ferns: 5, non Poir. 1789. — *S. vulgaris* (Moench) Garcke var.

* Г. А. Лазьков.

commutata (Guss.) Coode et Cullen, 1967, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 28, 1: 3. — *Oberna pubicaulis* Galushko ex Taisumov, 2009, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 5: 70. — ?*Silene cserei* auct. non Baumg.: Карягин, 1952, Фл. Азерб. 3: 323.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Aeschimann, Vocquet, 1983: 204): Herb. Linn. 582.4 (LINN).

ВП; ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ЦК:** В. Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 40); для всех горных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 256); **ЦЗ:** Лори.; для всех районов Грузии (Гвинианидзе, 1978: 132); **ЮЗ:** Дар. (Гроссгейм, 1945: 235).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Южн. Азия; Сев., Центр. Африка; Сев. Америка (заносное).

Sect. 2. **Fimbriatae** (Boiss.) Bornm.

4 (523). **S. lacera** (Steven) Sims, 1821, Curtis's Bot. Mag. 48: tab. 2255. — *Cucubalus lacerus* Steven, 1812, Mém. Soc. Nat. Moscou, 3: 262.

Описан с Кавказа («Inter fragmina schistosa ad rivum Chodjal sub pago Chinalug»).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК; СЗЗ; ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд.

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ЦК:** В. Кум. (Галушко, 1978: 255); **ЮЗ:** Севан. (Шишкин, Аветисян, 1956: 124).

Эндемик.

5 (524). **S. multifida** (Adams) Rohrb. 1868, Monogr. *Silene*: 88. — *Cucubalus multifidus* Adams, 1805, in Weber u. Mohr, Beitr. Naturk. 1: 57. — *Silene fimbriata* Sims, 1806, Curtis's Bot. Mag. 23: tab. 908. — *S. macrophylla* Lag. 1816, Gen. Sp. Pl.: 15.

Описан из Грузии. *Lectotypus* (Лазьков, 1996: 104): «In summitate montis Kaischaur, Adams» (LE!).

ВП: В. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Занг., Мегр.-Зан.

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; всех лесных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 255); **ЗЗ:** Рион.-Квир. (Гроссгейм, 1945: 236); всех районов Грузии (Гвинианидзе, 1978: 133); **ЮЗ:** Дар. (Шишкин, Аветисян, 1956: 124), Ю. Караб. (Гроссгейм, 1945: 236).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

Sect. 3. **Procumbentes** (Chowdhuri) Devyatov et V. N. Tikhom.

6 (525). **S. procumbens** Murray, 1786, Comment. Götting. ser. 2, 7: 83, tab. 2, fig. 1–6.

Описан с Урала («Nullo adscripto nomine huius semina inter Uralensia multa a. 1779 collecta a generosissima L. B. ab Asch obtinui, quae subsequente anno terae mandata demum a. 1784 flores tulerunt»). *Lectotypus* (Lazkov, hoc loco): [Icon] J. A. Murr. 1786, Comment. Götting. ser. 2, 7: tab. 2, fig. 1–6.

Указан для **ЗП**: З. Ставр. (Гроссгейм, 1945: 236; Танфильев, Кононов, 1987: 40).

Вост. Европа; Сев., Ср. Азия.

Subgen. 2. *Siphonomorpha* (Otth) Endl.

Sect. 1. *Saxifragoideae* Willk.

7 (526). **S. lenkoranica** Lazkov, 2010, Бот. журн. 95, 10: 1483.

Описан из Азербайджана. *Турпу*: «Transcaucasia, Azerbajdjan, prov. Baku, distr. Lenkoran, in monte Nodus-Galasi, 16 VIII 1928, B. Klopotovskyy» (LE!).

Т.

Эндемик.

Sect. 2. *Siphonomorpha* Otth

8 (527). **S. nutans** L. 1753, Sp. Pl.: 417.

Описан из Северной Европы. *Lectotypus* (Jeanmonod, Vocquet, 1983: 394): Herb. Linn. 583.18 [specim. medium] (LINN).

Указан для **ЗП**: З. Ставр. (Гроссгейм, 1945: 254); **ЗК**: Уруп-Теб. (Танфильев, Кононов, 1987: 41).

Европа; Средиз.; Сев. Азия.

9 (528). **S. italica** (L.) Pers. 1805, Syn. Pl.: 498. — *Cucubalus italicus* L. 1759, Syst. Nat. ed. 10, 2: 1030.

Описан, вероятно, из Италии. *Lectotypus* (Ghafoor in Jafri, El-Gadi, 1978: 85): Herb. Linn. 582.13 (LINN).

ЗП; **ВП**: В. Ставр.; **ЗК**; **ЦК**; **ВК**; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ**; **ЮЗ**: Ерев., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб; **Т.**

Указан для **ВП**: Тер.-Сулак.; **СЗЗ**: Пшад.-Джубг.; **ЦЗ**: Триал.-Н. Карт., Лори.; **ВЗ**: Н. Кур., Караб.; **ЮЗ**: Севан., Дар. (Гроссгейм, 1945: 254).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. (Туркменистан) Азия; Сев. Африка.

Sect. 3. *Spergulifoliae* (Boiss.) Schischk.

10 (529). **S. alpicola** Schischk. 1927, Изв. Томск. унив. 77, 3: 291.

Описан с Западного Кавказа. *Lectotypus* (Лазьков, 1996: 102): «Кубанская экспедиция, Б. Бамбак (Парныгу), течение р. Бамбачки (гай Андреевского), 18 VII 1906, Б. Н. Клопотов» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЗЗ:** Абх.

Эндемик.

11 (530). **S. argentea** Ledeb. 1842, Fl. Ross. 1: 311. — *S. pruinosa* Boiss. 1842, Diagn. Pl. Or. sér. 1, 1: 23. — *S. cappadocica* Boiss. et Heldr. 1849, in Boiss. Diagn. Pl. Or. sér. 1, 8: 86. — *S. pestalozzae* Boiss. 1849, l. c. 8: 87. — *S. brachycarpa* Boiss. et Bal. 1859, in Boiss. Diagn. Pl. Or. sér. 2, 6: 29. — *S. armeniaca* Rohrb. 1867, Index Sem. Horto Bot. Berol. App. 2: 5. — *S. brotherana* Sommier et Levier, 1893, Тр. Петерб. бот. сада, 13: 36. — *S. cappadocica* Boiss. et Heldr. β. *glandulosa* Freyn, 1895, Bull. Herb. Boiss. 3: 78. — *S. muradica* Schischk. 1920, Вестн. Тифл. бот. сада, 1: 27. — *S. supina* Bieb. subsp. *pruinosa* (Boiss.) Chowdhuri, 1957, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 22: 266.

Описан из Закавказья. *Л е с т о т ы п у с* (Лазьков, 1996: 101): «E provinciis transcaucasicis occidentalibus versus fines turcicas, Nordmann» (LE!).

?ЗЗ: Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Месх.

Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Ирак).

Встречаются формы, промежуточные между *S. argentea* и *S. spergulifolia* (Willd.) Bieb.

12 (531). **S. arguta** Fenzl, 1842, Pugil. Pl. Nov. Syr. Tauri Occ.: 8. — *S. sisia-nica* Boiss. et Buhse, 1860, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, 12: 37. — *S. prilipkoana* Schischk. 1936, Тр. Бот. инст. АН АзербСССР, 2: 277. — *S. pachyneura* Schischk. 1937, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 3: 191.

Описан из Турции («Hab. in subalpinis ad alpinis Tauri occidentalis (Kotschy. — Specimen unicum)»). *Л е с т о т ы п у с* (Lazkov, hoc loco): «In monte Tauro, aestate, 1836, № 83, Th. Kotschy» (LE!).

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Занг., Мерг.-Зан.

Юго-Зап. Азия (Турция, Ирак, Иран).

13 (532). **S. caucasica** Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 622. — *S. tatjanae* Schischk. 1937, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 3: 179.

Описан из Дагестана. *Л е с т о т ы п у с* (Melzheimer, 1988: 431): «Tufandagh, 31 VII 1830 [С. А. Мейер]» (LE!).

ВК; ВЗ: Алаз.-Агрич.; **ЮЗ:** Нах., Занг., Мерг.-Зан.

Указан для **ВЗ:** Ширв. (Гроссгейм, 1945: 252).

Эндемик.

14 (533). **S. cephalantha** Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 613. — *S. transcaucasica* Bordz. 1912, Тр. Бот. сада Юрьев. унив. 13: 19. — *S. repens* auct. non Patr.: Boiss. 1867, l. c.: 614.

Описан из Турции («Hab. in Armenia Turcica ad Palanteuken (Ку Suppl. 774)»). *Л е с т о т ы п у с* (Lazkov, hoc loco): «Iter Cilicico-Kurdicum 1859. Plantae in Karduchia ad Erzerum lectae. Suppl. 774 *Silene cephalantha* Boiss. Crescit in Palantekin frequens alt. 7500 ped., 10 VIII 1859, T. Kotschy» (G; isolectotypi — W!, WU).

ВК: Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ; ВЗ:** Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ.**

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

- 15 (534). **S. caespitosa** Steven, 1812, Mém. Soc. Nat. Moscou, 3: 262.
 Описан из Азербайджана («In rupibus circa pagum Sudur provinciae Kubensis, Fl. Junio»). *Lectotypus* (Lazkov, hoc loco): «Alp. Cauc. or.» (LE!).
БК: Кубин.
 Эндемик.
- 16 (535). **S. commelinifolia** Boiss. 1842, Diagn. Pl. Or. sér. 1, 1: 35. — *S. heterophylla* Freyn, 1897, Bull. Herb. Boiss. 5, 1: 585. — *S. commelinifolia* var. *ovatifolia* Melzh. 1988, in Rech. f. Fl. Iran. 163: 61.
 Описан по гербарным материалам из Ирана и Турции. *Lectotypus* (Melzheimer, 1988: 460): «Armenia, № 4206, Aucher-Eloy» (G; isolecotypus — LE!).
ЮЗ: Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.
 Юго-Зап. Азия (Ирак, Иран).
- 17 (536). **S. depressa** Bieb. 1808, Fl. Taur. Cauc. 1: 336.
 Описан из Грузии. *Lectotypus* (Лазьков, 1996: 102): «Ex Iberia, 1806, Steven» (LE!).
ЦЗ: Карт.-Ю. Ос., Лори.; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Занг., Ю. Караб.
 Указан для **ЮЗ:** Мегр.-Зан. (Гроссгейм, 1945: 252).
 Эндемик.
- 18 (537). **S. humilis** C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 215.
 Описан из Дагестана. *Lectotypus* (Лазьков, 1996: 103): «Inter fragmina schisti in alpibus Tufandagh cum Sedo roseo, 31 VII 1830, № 164 [C. A. Meyer]» (LE!).
БК.
 Эндемик.
- 19 (538). **S. ikonnikovii** Lazkov, 1996, Бот. журн. 81, 7: 109.
 Описан из Дагестана. *Турис*: «Агульский р-н Дагестана, альп. область близ перевала Кокмагдаг, h — 3200 м, 4 VIII 1940, Р. Еленевский» (LE!).
БК: В. Сулак., Ман.-Самур.
 По-видимому, является гибридом между *S. cephalantha* и *S. caucasica*. По признакам близок к *S. cephalantha*, но отличается железисто опушенной чашечкой.
- 20 (539). **S. kubanensis** Sommier et Levier, 1895, Тр. Петерб. бот. сада, 13: 37.
 Описан с Кавказа. *Lectotypus* (Лазьков, 1996: 99): «Kuban in alta valle fl. Tieberda ad rupes, 1500 m, 31 VIII 1890, S. L.» (LE!).
ЗК: В. Куб.
 Эндемик.
- 21 (540). **S. linearifolia** Otth, 1824, in DC. Prodr. 1: 374. — *S. petraea* Adams, 1805, in Weber u. Mohr, Beitr. Naturk. 1: 58, non Waldst. et Kit. 1803. — *S. angustifolia* Bieb. 1808, Fl. Taur. Cauc. 1: 337, non Poir. 1789. — *S. melikjanii* Taisumov et Teimurov, 2010, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 115, 1: 70.

Описан с Кавказа («in Alpibus Caucasicis»). *Lectotypus* (Lazkov, hoc loco): «Alp. Sauc., m. Steven» (G, photo — LE!).

ЦК: В. Тер.; **ВК; ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Н. Кур.

Эндемик.

22 (541). **S. lipskyi** Lazkov, 1996, Бот. журн. 81, 4: 96. — *S. humilis* auct. non C. A. Mey., p. p.: Шишк. 1936, Фл. СССР, 6: 662; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 250; Гвиниан. 1978, Фл. Груз. изд. 2, 4: 151.

Описан из Грузии. *Турп* s: «Центральный Кавказ, г. Казбек, 9–11000', 24 VII 1898, Н. Десулави» (LE!).

ЗК: В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.

Эндемик.

23 (542). **S. lychnidea** C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 213. — *S. subuniflora* Sommier et Levier, 1893, Тр. Петерб. бот. сада, 13: 39.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (Лазьков, 1996: 100): «In alpina ad rivulorum margines versus fl. Elborus, alt. 7500 ped., 13 VII 1829, № 20 [C. A. Meyer]» (LE!, cum isoelectotypo).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ЗЗ:** Абх.

Эндемик.

24 (543). **S. meyeri** Fenzl ex Boiss. et Buhse, 1860, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, 12: 38. — *S. delectabilis* Turrill, 1929, Kew Bull. 1929: 225.

Описан из Азербайджана. *Lectotypus* (Лазьков, 1996: 102): «In rupestribus altiorum montium Talusch, VI 1830 [C. A. Meyer]» (LE!).

ЮЗ: Ерев., Севан., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.; **Т.**

Указан для **ЦЗ:** Лори. (Шишкин, Аветисян, 1956: 140).

Юго-Зап. Азия (Иран).

25 (544). **S. montbretiana** Boiss. 1842, Diagn. Pl. Or. sér. 1, 1: 26. — *S. aucheriana* Boiss. 1842, l. c.: 27. — *S. hohenackeri* Boiss. 1853, Diagn. Pl. Or. sér. 2, 1: 71. — ?*S. montbretiana* Boiss. var. *kurdica* Boiss. et Noë, 1856, in Boiss. Diagn. Pl. Or. sér. 2, 5: 55. — *S. oligophylla* Melzh. 1985, Pl. Syst. Evol. 150: 313.

Описан из Ирана. *Lectotypus* (Chowdhuri, 1957: 266): «Persia, Dalm-Kou, № 4208, Aucher-Eloy» (G; isoelectotypus — LE!).

Т.

Юго-Зап. Азия (Иран).

26 (545). **S. palinotricha** Fenzl ex Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 621. — *S. grossheimii* Schischk. 1931, Тр. геобот. обслед. пастб. Азерб. ССР, сер А, 7: 89.

Описан из Ирана. *Lectotypus* (Ghazanfar, 1983: 106): «Pl. Pers. bor., in jugo Nasserou m Demavend, 21 VI 1843, № 344, Th. Kotschy» (BM!; isoelectotypi — G, LE!, W!).

ВЗ: Ширв.

Юго-Зап. Азия (Иран).

27 (546). **S. pungens** Boiss. 1842, Diagn. Pl. Or. sér. 1, 1: 32. — *S. chustupica* Nersesian, 2007, Фл. растит. и раст. рес. Арм. 16: 104, рис. 1, 2.

Описан из Турции. *Л е с т о т у р у с* (Ghazanfar, 1983: 106): «In Olymпо Armeniae, 29 V 1849, № 450, Aucher-Eloy» (G-BOIS; isolectotypi — K!, LE!).

ЮЗ: Занг.

Юго-Зап. Азия (Турция, Ирак, Иран).

28 (547). **S. pygmaea** Adams, 1805, in Weber u. Mohr, Beitr. Natur. 1: 59. — *S. spathulata* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 341, nom. illegit., superfl. — *S. petraea* Ledeb. et Schrank, 1824, Syll. Pl. Nov. 1: 211. — *S. ledebourii* Heynh. 1846, Alph. Aufz. Gew. 2: 667.

Описан из Осетии («Hab. in Ossetia»). *Л е с т о т у р у с* (Lazkov, hoc loco): «Habitat ad Lars pago Ossetio, Adams» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Эндемик.

29 (548). **S. schafta** S. G. Gmel. ex Fisch. et C. A. Mey. 1838, in Hohen. Bull. Soc. Nat. Moscou, 12: 397. — *S. pichleri* Stapf, 1886, Denkschr. Akad. Wiss. Math.-Naturw. Kl. (Wien), 51: 283.

Описан из Азербайджана. *Л е с т о т у р у с* (Melzheimer, 1988: 466): «In rupestribus montis Keridachi, tr. Suwant, X, Hohenack.» (LE!).

Т.

Юго-Зап. Азия (Иран).

30 (549). **S. spergulifolia** (Willd.) Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 305. — *Cucubalus spergulifolius* Willd. 1799, Sp. Pl. 2, 1: 690.

Описан из Армении. *Л е с т о т у р у с* (Melzheimer, Greuter, 1979: 619): «[Armenia] Vieweg» (B-WILLD (B –W 08600 –01 0)).

ЦК: Малк., В. Тер.; **ВК; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт. (Гвинианидзе, 1978: 146), Лори.; **ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗ:** Дар. (Гроссгейм, 1945: 247).

Юго-Зап. Азия (Турция).

31 (550). **S. supina** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 336.

Описан с Кавказа. *Л е с т о т у р у с* (Лазьков, 1996: 101): «Ex Caucaso, ad thermas constantinontanas, 1798» (LE!).

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.

Вост. Европа.

Образцы, приведенные во «Flora Iranica» (Melzheimer, 1988) под названием *S. supina*, относятся к видам *S. microphylla* Boiss. и *S. montbretiana*.

Sect. 4. **Odontopetalae** Schischk. ex Chowdhuri

32 (551). **S. raddeana** Trautv. 1873, Тр. Петерб. бот. сада, 2: 472. — *S. araxina* Trautv. 1875, l. c. 3, 2: 278. — *S. artwinensis* Schischk. 1927, Изв. Томск. унив. 77, 3: 291.

Описан из Турции. *Lectotypus* (Лазьков, 1996: 99): «Aschich-dade, 29 VI 1871, Radde» (LE!).

ЮЗ: Дар., Нах.

Указан для **ЮЗ:** Занг. (Шишкин, Аветисян, 1956: 124).

Юго-Зап. Азия (Турция).

Отличается от *S. odontopetala* Fenzl только наличием густых железистых волосков на листьях. Развитость стеблевых листьев имеет скорее экологическую обусловленность.

33 (552). **S. odontopetala** Fenzl, 1842, Pugil. Pl. Nov. Syr. Tauri Occ. 1: 9; Melzh. 1988, in Rech. f. Fl. Iran. 163: 374, tab. 120, 447 (fig. 1–3), excl. syn. *S. raddeana* Trautv. — *S. physocalyx* Ledeb. 1842, Fl. Ross. 1: 321.

Описан из Турции («Hab. in alpibus Tauri occidentalis (Kotschi, coll. № 82)»). *Lectotypus* (Lazkov, hoc loco): «Hab. monte Tauro, Aestate 1836, № 82, Th. Kotschi» (G; isolectotypus — LE!).

Указан для **ЗЗ:** Адж. (Дмитриева, 1960: 321); **ЮЗЗ:** Месх. (Гвинианидзе, 1978: 134).

Юго-Зап. Азия (Ливан, Сирия, Турция).

Sect. 5. **Succulentae** (Boiss.) Chowdhuri

34 (553). **S. succulenta** Forssk. 1775, Fl. Aegypt.-Arab.: 89.

Описан из Египта. *Lectotypus* (Greuter, 1997: 253): «Alexandriae ad catacombas, № 567, Forsskål» (C).

ЮЗ: Ерев.

Средиз.; Сев. Африка.

В Гербарии LE имеется единственный образец этого вида: «Арм. ССР, Вединский район, пески между с. Веди и Гореван, 30 V 1939, А. Оганесян». При последующих трехкратных поисках в указанном на этикетке месте вид не найден, о чем свидетельствует прикрепленная на гербарный лист заметка А. А. Гроссгейма. Произрастание этого вида на Кавказе нуждается в подтверждении. Возможно, это был случайный занос или этикетка фальшивая.

Sect. 6. **Sclerocalycinae** (Boiss.) Schischk.

35 (554). **S. bupleuroides** L. 1753, Sp. Pl.: 421. — *S. longiflora* Ehrh. 1792, Beitr. Naturk. 7: 144. — *S. ucrainica* Klokov, 1952, Фл. УРСР, 4: 656. — *S. mariae* Klokov, 1952, цит. соч.: 657. — *S. odessana* Klokov, 1952, цит. соч.: 657.

Описан из Ирана. *Lectotypus* (Greuter, 1997: 264): Herb. Clifford: 171, «*Silene* 3, fol. 1» (BM).

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ.**

Указан для **ВЗ:** Мург.-Муровд. (Гроссгейм, 1945: 244).

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. (Туркменистан) Азия.

36 (555). **S. chlorifolia** Sm. 1789, Pl. Icon. Ined. 1: 13, tab. 13. — *S. perfoliata* Otth, 1824, in DC. Prodr. 1: 384. — *S. morganae* Freyn, 1897, Bull. Herb. Boiss. 5: 586.

Описан из Турции. *Lectotypus* (Melzheimer, 1988: 399): «Armenia, Tournefort» (OXF).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **БК;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ;** **Т.**

Указан для **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Н. Кур. (Гроссгейм, 1945: 246).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

37 (556). **S. lasiantha** C. Koch, 1841, Linnaea, 15: 712. — *S. sahendica* Boiss. et Buhse, 1860, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, 12: 38. — *S. marschallii* auct. non C. A. Mey.: Melzh. 1988, in Rech. f. Fl. Iran. 163: 387, p. p., quoad syn. *S. lasiantha* et *S. sahendica*.

Описан из Армении («In Armenia occidentali»).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос., Лори.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

38 (557). **S. longidens** Schischk. 1922, Бюлл. Муз. Груз. 1: 16.

Описан из Азербайджана. *Lectotypus* (Лазьков, 1996: 100): «Gub. Vaku, distr. Shemacha, in declivis m. Nijal supra p. Zarnov, in abruptis lapidosis, 6100', 31 VII 1900, Alexeenko» (TBI; isoelectotypi (6) — LE!).

ВЗ: Ширв.

Эндемик.

39 (558). **S. peduncularis** Boiss. 1842, Diagn. Pl. Or. sér. 1, 1: 30. — *S. arguta* Boiss. et Buhse, 1860, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, 12: 37, non Fenzl, 1842.

Описан из Ирана. *Lectotypus* (Melzheimer, 1988: 408): «Seidkhoji, № 4219, Aucher-Eloy» (G; isoelectotypus — K!).

ЮЗ: Нах.

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

Растения из Нахичевани несколько отличаются от типовых образцов *S. peduncularis*, и, возможно, относятся к новому виду. Для окончательного решения этого вопроса необходимы дополнительные сборы.

40 (559). **S. solenantha** Trautv. 1881, Тр. Петерб. бот. сада, 7, 2: 421.

Описан из Дагестана. *Lectotypus* (Лазьков, 1996: 105): «Schalbus Dagh, 1880, № 119, Becker» (LE!; isoelectotypi — LE (2)!, TBI).

БК: Ман.-Самур.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Эндемик.

41 (560). **S. tenella** C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 216.

Описан из Талыша. *Lectotypus* (Лазьков, 1996: 105): «M. Talusch, № 1867, Meyer» (LE!).

Т.

Юго-Зап. Азия (Иран).

Sect. 7. **Lasiostemones** (Boiss.) Schischk.

42 (561). **S. marschallii** C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 214. — *S. lasiopetala* Fenzl, 1842, Pugil. Pl. Nov. Syr. Tauri Occ. 1: 8. — *S. puberula* Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 636, non Bertol. — *S. propinqua* Schischk. 1922, Бюлл. Муз. Груз. 1: 14, табл. 4; Melzh. 1988, in Rech. f. Fl. Iran. 163: 384, tab. 131, 449 (fig. 4–6). — *S. praestans* Schischk. 1941, Бот. мат. (Ленинград), 9, 3: 106.

Описан из Азербайджана. *Lectotypus* (Лазыков, 1996: 106): «In altioribus montibus Talüsch, locis siccis lapidosis, VI 1830 [C. A. Meyer]» (LE!).

ЦЗ: Карг.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ;** **Т.**

Указан для **ВК:** В. Сулак. (Гуссейнов, 1990: 235), Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд. (Гроссгейм, 1945: 243).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

Указания для **ВК**, по-видимому, ошибочные.

Sect. 8. **Tataricae** Chowdhuri

43 (562). **S. eremitica** Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 644. — *S. salsuginosa* Fomin, 1904, Тр. Тифл. бот. сада, 6, 3: 34.

Описан из Ирана. *Lectotypus* (Coode, Cullen, 1967: 202): «[Iran] in eremose arenoso subsalso prov. Aderbidjan Persise inter Khoi et Seidkhodji, Szowits» (G).

ЮЗ: Ерев., Нах.

Указан для **ЮЗ:** Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

44 (563). **S. tatarica** (L.) Pers. 1805, Syn. Pl.: 497. — *Cucubalus tataricus* L. 1753, Sp. Pl.: 415. — *Silene ruthenica* Otth, 1824, in DC. Prodr. 1: 370.

Описан из Восточной Европы («in Tataria»). *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 1994: 156): Herb. Linn. 582.15 (LINN!).

Указан для бассейна Терека без указания конкретного местонахождения (Гроссгейм, 1945: 241).

Сев., Центр., Вост. Европа.

Sect. 9. **Compactae** (Boiss.) Schischk.

45 (564). **S. compacta** Fisch. ex Hornem. 1813, Hort. Bot. Hafn. 1: 417. — *S. ispi-rensis* Khokhr. 1997, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 102, 4: 46, non Boiss. 1856.

Описан, вероятно, с Кавказа («Hab. in Russia?»).

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставро.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Тиб.; **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ;** **ЦЗ;** **ВЗ;** **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Мегр.-Зан.

Указан для всех горных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 250); **ЗК:** Адаг.-Пшиш., В. Куб.; **СЗЗ:** Пшад.-Джубг. (Гроссгейм, 1945: 240); для всех районов Грузии (Гвинианидзе, 1978: 136).

Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

Sect. 10. **Rigidulae** (Boiss.) Schischk.

46 (565). **S. arenosa** C. Koch, 1841, Linnaea, 15: 711. — *S. cabulica* Bornm. 1934, Bot. Jahrb. Syst. 66: 221. — *S. austroiranica* Rech. f., Aellen et Esfand. 1951, Bot. Jahrb. Syst. 75: 349.

Описан из Закавказья («Prope flumen Araxin in arena frequenter»). *Lectotypus* (Lazkov, hoc loco): «Ad Araxen, 1837, № 873, Koch» (LE!).

ЮЗ: Ерев., Нах.

Указан для **ЮЗ:** Мегр.-Зан. (Гроссгейм, 1945: 254).

Юго-Зап. (от Турции до Пакистана), Южн. (вост. Пакистан) Азия.

Sect. 11. **Suffruticosae** (Rohrb.) Schischk.

47 (566). **S. fruticulosa** Bieb. 1798, Tabl. Prov. Mer. Casp.: 115. — *S. suffrutescens* Bieb. 1800, Besch. Länd. Terek Casp.: 175, nom. illeg., superfl. — *S. caspica* Pers. 1805, Syn. Pl. 1: 497, nom. illeg., superfl. — *S. leptopetala* Schrenk, 1844, Bull. Acad. Sci. Pétersb. 2: 198.

Описан из Азербайджана. *Lectotypus* (Лазьков, 2002: 130): «Ex montibus Schirvanensibus, a. 1796» (LE!).

ВЗ: Ширв.

Вост. Европа.

Sect. 12. **Chloranthae** (Rohrb.) Schischk.

48 (567). **S. chlorantha** (Willd.) Ehrh. 1792, Beitr. Naturk. 7: 144. — *Cucubalus chloranthus* Willd. 1787, Fl. Berol. Prodr.: 155, tab. 5, fig. 9. — *S. elata* Otth, 1824, in DC. Prodr. 1: 370. — ?*S. subspathulata* Schur, 1866, Enum. Pl. Transsilv.: 102.

Описан из Германии.

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЦК:** В. Кум.

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев. Азия.

49 (568). **S. chloropetala** Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 195 (Fl. Cauc.).

Описан из Дагестана. *Lectotypus* (Шишкин, 1936: 623, «тип»): «Caucasus orient., Dagestania superior montosa, Anzuch, supra fl. Avar., 640-670 h., 16 VII 1861, Ruprecht» (LE!).

ВК.

Эндемик.

50 (569). **S. dagestanica** Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 194 (Fl. Cauc.).

Описан из Дагестана. *Lectotypus* (Шишкин, 1936: 623, «тип»): «Caucasus orient., Dagestania superior montosa, Kaputscha, in rupib. ad fl., pr. Kalaki, 800 hex., 17 VII 1861, Ruprecht» (LE!, cum isolectotуро).

ВК: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.

Эндемик.

51 (570). **S. panjutinii** Kolak. 1980, Фл. Абх. изд. 2, 1: 177. — *S. boissieri* Panjutin, 1946, Бот. мат. (Ленинград), 9, 3: 107, non J. Gay ex Coss., 1849.

Описан из Абхазии. *Л е с т о т у р у с* (Гвинианидзе, 1978: 142): «Абхазия, Бзыбский хребет, ур. Япсху, скалистое плато, 1800 м, 28 VII 1936, П. Панютин» (ТВИ; *isolectotypus* — LE!).

ЗЗ: Абх.

Эндемик.

52 (571). **S. saxatilis** Sims, 1806, Curtis's Bot. Mag. 18: tab. 689; Vieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 338. — *S. tenuis* Willd. 1809, Enum. Pl. Horti Berol. 1: 474. — *S. ruprechtii* Schischk. 1925, в Гроссг., Сосн. и Шишк. Фл. Тифл. 1: 204. — *S. zangezura* Jelen. 1960, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 64, 5: 120.

Описан по растениям, выращенным в ботаническом саду, полученным, вероятно, с Кавказа (в протологе по ошибке указано «из Сибири») («Introduced a few years since from Siberia by Mr. Loddiges, Nurseryman et Hackney»). *Л е с т о т у р у с* (Lazkov, hoc loco): [Icon] J. Sims, 1806, Curtis's Bot. Mag.: tab. 689.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК;** **ВК;** **ЗЗ;** **ЦЗ;** **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Севан., Дар., Нах., Занг.

Указан для всех горных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 252); для всех районов Грузии (Гвинианидзе, 1978: 139); **ЮЗ:** Ерев., Мегр.-Зан. (Шишкин, Авестисян, 1956: 132).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

53 (572). **S. shahrudensis** Rech. f. 1951, Bot. Jahrb. Syst. 75: 352. — *S. parrowiana* auct. non. Boiss. et Hausskn. ex Boiss.: Лазьков, 1996, Бот. журн. 81, 8: 106.

Описан из Ирана. *Т у р у с:* «Plants of Iran, Shahrud, Khorassan, on dry mountain slope, in clumps, fl. yellow, plant viscid, 26 IX 1940, № 16943, W. Koelz» (W!).

ЮЗ: Нах.

Юго-Зап. Азия (Иран).

Sect. 13. **Otites** (Adans.) Otth

54 (573). **S. borysthenica** (Gruner) Walters, 1964, Feddes Repert. (Beih.) 69, 1: 41. — *S. otites* Sm. *γ. borysthenica* Gruner, 1868, Bull. Soc. Nat. Moscou, 41, 3: 126. — *Cucubalus parviflorus* Ehrh. 1792, Beitr. Naturk. 7: 143, non Lam. 1778. — *Silene parviflora* (Ehrh.) Pers. 1805, Syn. Pl. 1: 497, non Moench, 1794. — *Viscago parviflora* Hornem. 1813, Hort. Bot. Hafn.: 411. — *Otites parviflorus* (Ehrh.) Grossh. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 255. — *Silene borysthenica* subsp. *parviflora* (Hornem.) Šourková, 1977, Preslia, 49, 1: 12.

Описан из Украины («In collibus arenosis reg. demissae ad Borysthenem, d. 26 Jul.»).

ЗП; **ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЦК:** В. Тер.

Указан для **ЗК:** Уруп-Теб., В. Куб. (Танфильев, Кононов, 1984: 40); **ЦК:** В. Кум. (Гроссгейм, 1945: 255).

Сев., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев., Центр. Азия.

55 (574). **S. cyri** Schischk. 1925, в Гроссг., Сосн. и Шишк. Фл. Тифл. 1: 102, in clav. — *Otites cyri* (Schischk.) Grossh. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 255. — *Silene turcomanica* Клеоров, 1936, Журн. Инст. бот. АН УРСР, 9: 108.

Описан с Кавказа. Лектотипус (Гвинианидзе, 1978: 156): «Tiflis, V 1867, Radde» (TGM; isolectotypi (2) — LE!).

ВП: Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ВК;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт., Лори.; **ВЗ;** **ЮЗ:** Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ВП:** В. Ставр.; **ЮЗ:** Дар. (Гроссгейм, 1945: 255).

Вост. Европа; Юго-Зап. (Иран), Ср. (Туркменистан) Азия.

56 (575). **S. chersonensis** (Zapal.) Клеоров, 1929, Вісн. Київ. бот. саду, 9: 9. — *S. densiflora* d'Urv. var. *chersonensis* Zapal. 1911, Consp. Fl. Gallic. Crit. 3: 489. — *Otites densiflorus* (d'Urv.) Grossh. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 255, p. p., quoad syn. *Silene chersonensis*. — *Silene densiflora* auct. non d'Urv.: Лазьков, 1996, Бот. журн. 81, 8: 109, p. p., quoad syn. *S. chersonensis*.

Описан из Украины.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп.-Теб.; **ЦК;** **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.

Центр., Вост. Европа; Сев., Центр., Азия.

57 (576). **S. densiflora** d'Urv. 1822, Mém. Soc. Linn. Paris 1: 303; Лазьков, 1996, Бот. журн. 81, 8: 109, p. p., excl. syn. *Silene chersonensis* (Zapal.) Клеоров et *S. donetzica* Клеоров. — *Otites densiflorus* (d'Urv.) Grossh. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 255, p. p., excl. syn. *Silene chersonensis* et *S. donetzica*. — *Silene otites* auct. non (L.) Sm.: Coode et Cullen, 1967, Fl. Turk. 2: 203, p. p., quoad syn. *S. densiflora*.

Описан из Крыма. Лектотипус (Wrigley, 1986: 76): «In pascuis Tauriae, prope Kerch, 1820, D'Urville» (P; isolectotypus — K!).

ЗП: Аз.-Куб.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.

Указан для **ЗП:** З. Ставр. (Гроссгейм, 1945: 255; Галушко, 1978: 257; Танфильев, Кононов, 1987: 40); **ВК:** Ман.-Самур. (Гуссейнов, 1990: 235).

Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).

По-видимому, указания относятся к другому виду.

58 (577). **S. donetzica** Клеоров, 1936, Журн. Инст. бот. АН УРСР, 9: 116. — *S. densiflora* d'Urv. subsp. *sillingeri* Hendrych, 1948, Stud. Bot. Čechosl. 9, 2-4: 116. — *S. donetzica* subsp. *sillingeri* (Hendrych) Šourková, 1977, Preslia, 49, 1: 12. — *Otites densiflorus* (d'Urv.) Grossh. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 255, p. p., quoad syn. *Silene donetzica* Клеоров. — *S. densiflora* auct. non d'Urv.: Лазьков, 1996, Бот. журн. 81, 8: 109, p. p., quoad syn. *S. donetzica*.

Описан по гербарным материалам из Украины и с Кавказа. Лектотипус (Wrigley, 1986: 75): «USSR, DN3, Ukraine, Stalinskaja Oblast', Amvrosievka distr., in declivibus cretaceis ad fossam stepaceam Vjelyi Jar dictam, 1931, Клеоров» (KW).

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.

Указан для **ЦК:** В. Кум. (Клеоров, 1936: 116).

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа.

От *S. chersonensis* отличается коротко опушенными в нижней части стеблями.

59 (578). **S. roopiana** Kleopow, 1936, Журн. Инст. бот. АН УРСР, 9: 115. — *Otites roopianus* (Kleopow) Grossh. 1945, Фл. Кавк. изд 2, 3: 256. — *Silene otites* auct. non (L.) Sm.: Coode et Cullen, 1967, Fl. Turk. 2: 203, p. p., quoad syn. *S. roopiana*.

Описан из Турции. Lectotypus (Лазьков, 1996: 109): «Armenia Rossica, in via inter pagos Czuruk et Sarabkhana (prov. Kars), 26 VI 1910, F. Roop» (LE!).

Указан для **ЗЗ**: Адж.; **ЮЗЗ**: Месх. (Гвинианидзе, 1978: 157).

Юго-Зап. Азия (Турция).

От других видов группы *S. otites* отличается изогнутыми и полуприжатými волосками на листьях, напоминающими таковые у *S. borysthena*.

60 (579). **S. wolgensis** (Hornem.) Oth, 1824, in DC. Prodr. 1: 370. — *Viscago wolgensis* Hornem. 1819, Suppl. Hort. Bot. Hafn.: 48. — *Silene effusa* Fisch. ex Oth, 1824, in DC. Prodr. 1: 370. — *Otites wolgensis* (Hornem.) Grossh. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 255. — *O. orae-syvashicae* Klokov, 1952, Фл. УРСР, 4: 658. — *Silene orae-syvashicae* (Klokov) Czer. 1981, Сосуд. раст. СССР: 171.

Описан из России («W. suppl. Hab. ad Wolgam D. F. intr. 1815»).

ЗП; **ВП**; **ЦК**: В. Тер.; **ВК**: Ассо-Арг., Ман.-Самур.

Указан для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 257); **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК**: В. Кум. (Гроссгейм, 1945: 255).

Юго-Вост., Вост. Европа; Сев., Ср., Центр. Азия.

Sect. 14. **Dianthoideae** (Chowdhuri) Lazkov

61 (580). **S. dianthoides** Pers. 1805, Syn. Pl. 1: 500. — *S. melanophylla* Boiss. 1842, Diagn. Pl. Or. sér. 1, 1: 24. — *S. calyculata* C. Koch, 1847, Linnaea, 19: 56. — *S. marcowiczii* Schischk. 1922, Бюлл. Муз. Груз. 1: 11. — *S. froedinii* Rech. f. 1951, Bot. Jahrb. Syst. 75: 350.

Описан с «Востока».

ЗК: Бело-Лаб., В. Куб.; **ЦК**: Малк., В. Тер.; **ЗЗ**: Инг.-Рион.; **ЦЗ**: Карг.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карг., Лори.; **ВЗ**: Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ**: Араг.; **ЮЗ**.

Указан для **ЗЗ**: Адж. (Хохряков, 1995: 19); **ВК**: В. Сулак., Ман.-Самур. (Гусейнов, 1990: 235).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

По-видимому, указан для **ВК** ошибочно.

Subgen. 3. **Silene**

Sect. 1. **Dichotomae** (Rohrb.) Chowdhuri

62 (581). **S. dichotoma** Ehrh. 1792, Beitr. Naturk. 7: 143; Coode a. Cullen, 1967, Fl. Turk. 2: 234, p. p., excl. subsp. *euxina* (Rupr.) Coode et Cullen; Chater et al. 1993, Fl. Europ. ed. 2, 1: 216, p. p., excl. subsp. *euxina*. — *S. talyschensis* Schischk. 1922, Бюлл. Муз. Груз. 1: 7, табл. 2.

Описан из Центральной Европы.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП**: В. Ставр.; **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК**: В. Тер.; **ЗЗ**: Абх.; **Т**.

Указан для **ЦК**: Малк. (Гроссгейм, 1945: 239).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа.

63 (582). **S. iberica** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 335. — *S. thirkeana* C. Koch, 1847, Linnaea, 19: 56.

Описан из Грузии. *Lectotypus* (Лазьков, 1996: 108): «Iberia, Steven» (LE!).

БК: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ**: Карг.-Ю. Ос., Лори.; **ВЗ**: Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ**; **ЮЗ**.

Указан для **БК**: Ассо-Арг. (Очиаури, 1981: 57); **ЗЗ**: Абх., Рион.-Квир. (Гроссгейм, 1945: 239), Адж. (Дмитриева, 1960: 320); **ЦЗ**: Триал.-Н. Карг.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек. (Гроссгейм, 1945: 239).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

64 (583). **S. euxina** (Rupr.) Hand.-Mazz. 1909, Ann. Naturh. Mus. (Wien), 23: 154. — *S. dichotoma* Ehrh. *β. euxina* Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 184 (Fl. Cauc.). — *S. mathei* Pénzes, 1959, Feddes Repert. 62: 20. — *S. euxina* var. *bulgarica* Jordanov et Panov, 1966, Фл. Бълг. 3: 509, 596. — *S. dichotoma* subsp. *euxina* (Rupr.) Coode et Cullen, 1967, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 28, 1: 8.

Описан из Закавказья. *Lectotypus* (Coode, Cullen, 1967: 236): «Transcaucasia occident., Guria, in litore marino pr. Poti, 19 IX 1861» (LE!).

ЗЗ: Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.

Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).

Sect. 2. **Silene**

65 (584). **S. gallica** L. 1753, Sp. Pl.: 417, nom. cons. — *S. anglica* L. 1753, l. c.: 416, nom. rej. — *S. quinquevulnera* L. 1753, l. c.: 416, nom. rej.

Описан из Франции. *Lectotypus* (Greuter, 1995: 102): Herb. Linn. 583.11 (LINN).

ЦК: В. Тер.; **ЗЗ**: Абх., Инг.-Рион., Адж.; **Т**.

Указан для **ЦК**: Малк.; **БК**: Ассо-Арг. (Галушко, 1978: 254); **ЗЗ**: Туап.-Адл., Рион.-Квир. (Гроссгейм, 1945: 240).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция); Сев. Африка.

66 (585). **S. nocturna** L. 1753, Sp. Pl.: 416. — *S. brachypetala* Robill. et Castigl. ex DC. 1815, in DC. et Lam. Fl. Fr. ed. 3, Suppl.: 607.

Описан по гербарным материалам из Италии и Америки. *Lectotypus* (Ghafoor in Jafri, El-Gadi, 1978: 91): Herb. Linn. 583.8 (LINN).

Т.

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. Европа.

Sect. 3. **Psammophilae** (Talavera) Greuter

67 (586). **S. pendula** L. 1753, Sp. Pl.: 418.

Описан с Сицилии и Крита. *Lectotypus* (Talavera, 1978: 162): Herb. Linn. 583.35 (LINN).

ЗП: 3. Ставр.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион. Заносное Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.

Subgen. 4. **Conosilene** (Rohrb.) F. N. Williams

Sect. **Coniomorpha** Otth

68 (587). **S. conica** L. 1753, Sp. Pl.: 418. — *S. subconica* auct. non Friv.: Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1: 256.

Описан из Испании. *Lectotypus* (Melzheimer, 1988: 483): Herb. Linn. 583.30 (LINN).

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Сулак.; **ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг; **ЮЗ.**

Указан для всех районов Предкавказья (Галушко, 1978: 256); **ЗЗ:** Адж. (Гроссгейм, 1945: 234); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Гвинианидзе, 1978: 162), Триал.-Н. Карт. (Гроссгейм, 1945: 234); **ВЗ; ЮЗЗ:** Месх. (Гвинианидзе, 1978: 162).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Иран, Афганистан), Ср. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное).

69 (588). **S. conoidea** L. 1753, Sp. Pl.: 418.

Описан из Испании. *Lectotypus* (Burt, Levis, 1952: 343): Herb. Linn. 583.29 (LINN).

ВК: Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Ширв.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЦЗ:** Лори.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб. (Гроссгейм, 1945: 235); **ЮЗЗ:** Месх. (Гвинианидзе, 1978: 162); **ЮЗ:** Севан., Дар. (Гроссгейм, 1945: 235).

Атл., Сев., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. (Ладожско-Ильменский, Верхне-Днепрский и Волжско-Камский р-ны — заносное) Европа; Средиз.; Юго-Зап. (от Турции и Ирака до Пакистана), Ср., Центр., Вост., Южн. (вост. Пакистан) Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное).

70 (589). **S. coniflora** Nees ex Otth, 1824, in DC. Prodr. 1: 371.

Описан из Месопотамии («in Mesopotamiâ (v. s. ex h. Olivier)»).

ВЗ: Ширв.

Указан для **ЮЗ:** Нах. (Гроссгейм, 1949: 82).

Юго-Зап. (от Турции и Ирака до Пакистана), Ср., Южн. (вост. Пакистан) Азия.

31 (84). **Viscaria** Bernh., nom. cons.*

1 (590). **V. vulgaris** Bernh. 1800, Syst. Verz. Erfurt: 261. — *Lychnis viscaria* L. 1753, Sp. Pl.: 436. — *L. viscosa* Gilib. 1782, Fl. Lituaniæ. 2: 171, nom. inval. — *Vis-*

* Г. А. Лазыков.