

Описан с Сицилии и Крита. *Lectotypus* (Talavera, 1978: 162): Herb. Linn. 583.35 (LINN).

**ЗП:** 3. Ставр.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион. Заносное Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.

Subgen. 4. **Conosilene** (Rohrb.) F. N. Williams

Sect. **Coniomorpha** Otth

68 (587). **S. conica** L. 1753, Sp. Pl.: 418. — *S. subconica* auct. non Friv.: Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1: 256.

Описан из Испании. *Lectotypus* (Melzheimer, 1988: 483): Herb. Linn. 583.30 (LINN).

**ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Сулак.; **ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг; **ЮЗ.**

Указан для всех районов Предкавказья (Галушко, 1978: 256); **ЗЗ:** Адж. (Гроссгейм, 1945: 234); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Гвинианидзе, 1978: 162), Триал.-Н. Карт. (Гроссгейм, 1945: 234); **ВЗ; ЮЗЗ:** Месх. (Гвинианидзе, 1978: 162).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Иран, Афганистан), Ср. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное).

69 (588). **S. conoidea** L. 1753, Sp. Pl.: 418.

Описан из Испании. *Lectotypus* (Burt, Levis, 1952: 343): Herb. Linn. 583.29 (LINN).

**ВК:** Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Ширв.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЦЗ:** Лори.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб. (Гроссгейм, 1945: 235); **ЮЗЗ:** Месх. (Гвинианидзе, 1978: 162); **ЮЗ:** Севан., Дар. (Гроссгейм, 1945: 235).

Атл., Сев., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. (Ладожско-Ильменский, Верхне-Днепрский и Волжско-Камский р-ны — заносное) Европа; Средиз.; Юго-Зап. (от Турции и Ирака до Пакистана), Ср., Центр., Вост., Южн. (вост. Пакистан) Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное).

70 (589). **S. coniflora** Nees ex Otth, 1824, in DC. Prodr. 1: 371.

Описан из Месопотамии («in Mesopotamiâ (v. s. ex h. Olivier)»).

**ВЗ:** Ширв.

Указан для **ЮЗ:** Нах. (Гроссгейм, 1949: 82).

Юго-Зап. (от Турции и Ирака до Пакистана), Ср., Южн. (вост. Пакистан) Азия.

31 (84). **Viscaria** Bernh., nom. cons.\*

1 (590). **V. vulgaris** Bernh. 1800, Syst. Verz. Erfurt: 261. — *Lychnis viscaria* L. 1753, Sp. Pl.: 436. — *L. viscosa* Gilib. 1782, Fl. Lituani. 2: 171, nom. inval. — *Vis-*

\* Г. А. Лазыков.

*caria vulgaris* Röhl. 1812, *Deutschl. Fl.* ed. 2, 2: 275. — *Steris viscaria* (L.) Raf. 1840, *Autik. Bot.*: 27. — *Viscaria viscosa* (Gilib.) Asch. 1860, *Fl. Prov. Brandenb.* 1: 85; Горшк. 1936, *Фл. СССР*, 6: 576, cum auct. bas. Scop. — *Silene viscaria* (L.) Jess. 1879, *Deutsche Excurs.-Fl.*: 280. — *Viscaria viscaria* (L.) Voss, 1896, in *Vilm. Blumengärtn.* ed. 3: 100, comb. inval.

Описан из Европы.

**ЗП:** 3. Ставр.; **ЦК:**

Сев., Центр., Вост. Европа.

Долгое время вид приводился как *V. viscosa* и с разным авторством — (Gilib.) Asch. или (Scop.) Asch. Название базионима — *Lychnis viscosa* Gilib. — «ном. illeg.», так как работа J. E. Gilibert (1782) «*Flora lituanica inchoata*», в которой оно предложено, является безусловно отвергаемой (McNeill et al., 2006: App. VI). *L. viscosa* Scop. должно считаться комбинацией *L. viscosa* (L.) Scop. 1772, *Fl. Carn.* ed. 2, 1: 306, так как оно основано на *Cucubalus viscosus* L. 1753, *Sp. Pl.*: 414. Эти растения в настоящем Конспекте рассматриваются как *Elisanthe viscosa* (L.) Rupr.

### 32 (85). **Coronaria** Guett.\*

#### Subgen. 1. **Coronaria**

1 (591). **C. tomentosa** A. Br. 1843, *Flora* (Regensb.), 26: 368. — *Agrostemma coronaria* L. 1753, *Sp. Pl.*: 436. — *Lychnis coriacea* Moench, 1794, *Methodus*: 709, nom. illeg. — *Coronaria coriacea* (Moench) Schischk. 1936, *Фл. СССР*, 6: 699, comb. inval.

Описан из Италии. *Lectotypus* (Ghazanfar, Nasir, 1986: 55): *Herb. Linn.* 601.2 (LINN).

**ЮЗ:** Нах., Занг.; **Т:**

Указан для **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Гвинианидзе, 1978: 117).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Иран, Пакистан), Ср., Южн. (вост. Пакистан) Азия; Сев. Африка.

#### Subgen. 2. **Coccyganthe** (Rchb.) Devjatov et V. N. Tikhom.

2 (592). **C. flos-cuculi** (L.) A. Br. 1843, *Flora* (Regensb.), 26: 386. — *Lychnis flos-cuculi* L. 1753, *Sp. Pl.*: 436. — *Coccyganthe flos-cuculi* (L.) Fourr. 1868, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, sér. 2, 16: 345.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Sell in Jonsell, Jarvis, 1994: 158): *Herb. Clifford*: 174, «*Lychnis 2*» (BM).

**ЗП:** 3. Ставр.; **ЦК:** В. Тер.

Европа; Средиз.; Сев. Азия.

### 33 (86). **Elisanthe** (Fenzl) Fenzl\*

#### Sect. 1. **Carpophora** (Klotzsch) Devjatov et V. N. Tikhom.

1 (593). **E. viscosa** (L.) Rupr. 1869, *Mém. Acad. Sci. Pétersb.* (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 200 (Fl. Cauc.). — *Cucubalus viscosus* L. 1753, *Sp. Pl.*: 414. — *Melan-*

\* Г. А. Лазыков.