

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Ирак, Иран), Ср., Центр. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное).

Sect. 4. **Petrocoma** (Rupr.) Lazkov

5 (597). **E. hoefftiana** (C. A. Mey.) Lazkov, 2010, Бот. журн. 95, 10: 1485. — *Silene hoefftiana* C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 215. — *Petrocoma hoefftiana* (C. A. Mey.) Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 200 (Fl. Cauc.).

Описан с Кавказа («In rupestribus Caucasi occidentalis versus rivulum Kassaut (alt. 1000 hexap.) et prope acidulum Nartzana (alt. 600 hexap.)»). Лекто-тип у с (Лазьков, 2010: 1485): «In rupestribus prope acidulum Nartzana, 12 VIII 1829 [C. A. Meyer]» (LE!).

**ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., Малк., В. Тер.; **БК:** Асцо-Арг.

Эндемик.

34 (87). **Melandrium** Röhl.\*

1 (598). **M. album** (Mill.) Garcke, 1858, Fl. N. Mitt.-Deutschl. ed. 4: 55. — *Lychnis alba* Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: № 4.

Описан из Европы по культивированным растениям неизвестного происхождения.

Возможны заносы.

Атл., Сев., Центр., Вост. Европа; Ср., Центр., Вост. (заносное) Азия.

Все указания *M. album* для Кавказа относятся к следующему виду.

2 (599). **M. latifolium** (Poir.) Maire, 1936, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, 27: 211. — *Silene latifolia* Poir. 1789, Voy. Barbarie, 2: 165. — *Lychnis divaricata* Rchb. 1826, Icon. Bot. Pl. Crit. 4: 3. — *Melandrium divaricatum* (Rchb.) Fenzl, 1842, in Ledeb. Fl. Ross. 1: 328. — *M. eriocalycinum* Boiss. 1853, Diagn. Pl. Or. sér. 2, 1: 78. — *M. eriocalycinum* var. *persicum* Boiss. et Buhse, 1860, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, 12: 39. — *M. album* (Mill.) Garcke subsp. *eriocalycinum* (Boiss.) Hayek, 1924, Feddes Repert. (Beih.), 30, 1: 286. — *M. boissieri* Schischk. 1925, в Гроссг., Сосн. и Шишк. Фл. Тифл. 1: 205. — *M. persicum* (Boiss. et Buhse) Bornm. 1935, Feddes Repert. 39: 92. — *Silene alba* (Mill.) E. H. L. Krause subsp. *eriocalycina* (Boiss.) Walters, 1964, Feddes Repert. 69, 1: 48. — *S. latifolia* subsp. *eriocalycina* (Boiss. et Buhse) Greuter et Burdet, 1982, Willdenowia, 12: 189. — *S. latifolia* subsp. *persica* (Boiss. et Buhse) Melzh. 1988, in Rech. f. Fl. Iran. 163: 473. — *Melandrium album* auct. non (Mill.) Garcke, p. p., quoad pl. ex Cauc.: Шишк. 1936, Фл. СССР, 6: 725; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 260; Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1: 259; Гвиниан. 1978, Фл. Груз. изд. 2, 4: 123.

Описан из Алжира.

\* Г. А. Лазьков.

**ЗП; ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ; ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ; Т.**

Указан для **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт., Лори.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ:** Араг. (Гроссгейм, 1945: 261).

Атл., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран), Ср. (Туркменистан); Сев. Африка.

3 (600). **M. balansae** Boiss. 1888, Fl. Or. Suppl.: 109. — *M. saxosum* Khokhr. 1989, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 6: 95. — ?*M. sylvestre* auct. non (Schkuhr) Röhl., р. р., quoad pl. ex Саус.: Шишк. 1936, Фл. СССР, 6: 725; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 260. — ?*M. rubrum* auct. non (Weigel) Garcke, р. р., quoad pl. ex Саус.: Гвиниан. 1978, Фл. Груз. изд. 2, 4: 121.

**ЗК:** Бело-Лаб.; **ЗЗ.**

Юго-Зап. Азия (Турция).

### 35 (88). **Cucubalus** L.\*

1 (601). **C. baccifer** L. 1753, Sp. Pl.: 414.

Описан из Европы. Lectotypus (Walters in Jarvis et al., 1993: 39): Herb. Linn. 582.1 (LINN).

**ЗП:** 3. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **Т.**

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум. (Галушко, 1978: 259), Тер.-Сулак. (Гроссгейм, 1945: 261); **ЦК:** В. Тер. (Галушко, 1978: 259); **ЗЗ:** Абх. (Гвинианидзе, 1978: 164); **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек. (Гроссгейм, 1945: 261).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Ирак, Иран, Афганистан).

### 36 (89). **Agrostemma** L.\*

1 (602). **A. githago** L. 1753, Sp. Pl.: 435.

Описан из Европы. Lectotypus (Ghafoor in Jafri, El-Gadi, 1978: 56): Herb. Linn. 601.1 (LINN).

**ЗП; ВП:** Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК; ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.; **Т.**

Указан для всех районов Предкавказья (Галушко, 1978: 249); **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ЗЗ:** Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт., Лори.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ:** Ю. Караб. (Гроссгейм, 1945: 227).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Южн. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка.

\* Г. А. Лазьков.