

6 (59). *Paronychia* Mill.*

Subgen. 1. *Paronychia*

1 (300). *P. argentea* Lam. 1779, Fl. Fr. 3: 230. — *Illecebrum paronychia* L. 1753, Sp. Pl.: 206.

Описан по гербарным материалам из Испании и Франции. *Lectotypus* (Chaudhri, 1968: 211): Herb. Linn. 290.14, «Hort. Cliff. 41» (LINN).

Указан для **ЮЗ**: Нах. (Долматова, 1989: 108).

Атл., Южн. Европа.

Subgen. 2. *Anoplonychia* (Fenzl) Chaudhri

Sect. 1. *Anoplonychia* Fenzl

2 (301). *P. azerbaijanica* Chaudhri, 1968, Meded. Bot. Mus. Utrecht, 285: 253, pl. 13, fig. 11–15.

Описан с Кавказа. *Typus*: «USSR, Azerbaijan, Nagorno-Karabakh, distr. Gardut, c. 750 m, 19 V 1948, A. A. Grossheim et al.» (TGM).

ЮЗ: Ю. Караб.

Указан для **ЮЗ**: Мегр.-Зан. (Долматова, 1989: 109).

Эндемик.

3 (302). *P. cephalotes* (Bieb.) Bess. 1830, Cat. Hort. Cremeneci: 4. — *Illecebrum cephalotes* Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 169, p. p., excl. pl. ex Tiflis. — *I. capitatum* auct. non L.: Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 174, p. p., excl. pl. ex Tiflis.

Описан по гербарным материалам из Крыма и Кавказа. *Lectotypus* (Chaudhri, 1968: 255): «Ex Tauria [Bieberstein]» (LE!).

СЗЗ: Анап.-Гел.

Юго-Вост., Вост. Европа.

P. cephalotes указан для Кавказа рядом авторов (Шишкин, 1936; Гроссгейм, 1945). Образец этого вида: «Новороссийск, 6 V 1892 [В. И. Липский]» хранится в Гербарии LE, однако А. П. Долматова (1989) не привела его для Кавказа.

Sect. 2. *Heterosepalae* Chaudhri

4 (303). *P. kurdica* Boiss. 1843, Diagn. Pl. Or. sér. 1, 3: 10.

Описан из Ирака. *Lectotypus* (Chaudhri, 1968: 267) «Iraq, ad rupes calc. sacuminis m. Gara Kurdistan, 27 VII 1841, № 334, Th. Kotschy» (G; isolectotypi — HAL, JE, S).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ**: Араг.; **ЮЗ**: Ерев., Севан., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т**.

Указан для **ЮЗЗ**: Месх. (Долматова, 1989: 109).

Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Ливан, Ирак, Иран).

5 (304). *P. splendens* Steven, 1856, Bull. Soc. Nat. Moscou, 29, 3: 184.

* Г. А. Лазьков.

Описан из Нахичевани. *Lectotypus* (Chaudhri, 1968: 272): «In siccis lapidosus colluim secus Nakchichevan, 12 VI 1829, № 396, Szovits» (LE!).

ЮЗ: Ерев., Дар., Нах., Ю. Караб.

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

7 (60). *Herniaria* L.*

Sect. 1. *Herniaria*

1 (305). *H. glabra* L. 1753, Sp. Pl.: 218. — *H. suavis* Klokov, 1947, Бот. журн. АН УРСР, 4, 1–2: 70.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Pugsley, 1930: 214): Herb. Linn. 312.1 (LINN).

ЗП: З. Ставр.; **ЦК:** В. Тер.; **ВК:** В. Сулак.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карг.; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ;** **Т:**

Указан для **ЗК:** Уруп-Теб. (Воробьева, Онипченко, 2001: 36); **ЗЗ:** Адж. (Дмитриева, 1960: 319); **ЦЗ:** Лори. (Шишкин, Аветисян, 1956: 105); **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Гвинианидзе, 1978: 213), Иорск.-Шек. (Гроссгейм, 1945: 226).

Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Африка.

2 (306). *H. caucasica* Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 241 (Fl. Cauc.). — *H. zervudachii* Hand.-Mazz. 1909, Ann. Naturh. Mus. (Wien), 23: 149.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (Chaudhri, 1968: 329): «Caucasus orient., Chewsuria, in m. Vorbalo, alt. 1510 hex., 13 IX 1860, Ruprecht» (LE!).

ЦК: В. Тер.; **ВК:** Асо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ВК:** Кубин. (Гроссгейм, 1945: 226); **ЮЗЗ:** Месх. (Гвинианидзе, 1978: 214); **ЮЗ:** Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т** (Гроссгейм, 1945: 226).

Юго-Зап. (Турция, Иран, Афганистан), Ср., Центр. Азия.

3 (307). *H. cinerea* DC. 1815, in DC. et Lam. Fl. Fr. ed. 3, Suppl.: 375. — *H. hirsuta* auct. non L.: Мурав. 1936, Фл. СССР, 6: 571, р. р., quoad syn. et icon.; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 226, р. р., quoad syn.; Карягин, 1952, Фл. Азерб. 3: 316, р. р., quoad syn.; Шишк. и В. Е. Авет. 1956, Фл. Арм. 2: 105, р. р., quoad syn.

Описан из Франции. *Lectotypus* (Hartvig, 1997: 231): «[France, near Montpellier] inter Grès et Castelnaud, 1814, M. Pouzin» (G).

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карг.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Атл., Южн. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср., Южн. (вост. Пакистан) Азия; Сев. Африка.

4 (308). *H. hirsuta* L. 1753, Sp. Pl.: 218; Мурав. 1936, Фл. СССР, 6: 571, р. р., excl. syn. et icon.; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 226, р. р., excl. syn.; Карягин,

* Г. А. Лазьков.