

Описан из Нахичевани. *Lectotypus* (Chaudhri, 1968: 272): «In siccis lapidosus colluim secus Nakchichevan, 12 VI 1829, № 396, Szovits» (LE!).

ЮЗ: Ерев., Дар., Нах., Ю. Караб.

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

7 (60). *Herniaria* L.*

Sect. 1. *Herniaria*

1 (305). *H. glabra* L. 1753, Sp. Pl.: 218. — *H. suavis* Klokov, 1947, Бот. журн. АН УРСР, 4, 1–2: 70.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Pugsley, 1930: 214): Herb. Linn. 312.1 (LINN).

ЗП: З. Ставр.; **ЦК:** В. Тер.; **ВК:** В. Сулак.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карг.; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ;** **Т:**

Указан для **ЗК:** Уруп-Теб. (Воробьева, Онипченко, 2001: 36); **ЗЗ:** Адж. (Дмитриева, 1960: 319); **ЦЗ:** Лори. (Шишкин, Аветисян, 1956: 105); **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Гвинианидзе, 1978: 213), Иорск.-Шек. (Гроссгейм, 1945: 226).

Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Африка.

2 (306). *H. caucasica* Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 241 (Fl. Cauc.). — *H. zervudachii* Hand.-Mazz. 1909, Ann. Naturh. Mus. (Wien), 23: 149.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (Chaudhri, 1968: 329): «Caucasus orient., Chewsuria, in m. Borbalo, alt. 1510 hex., 13 IX 1860, Ruprecht» (LE!).

ЦК: В. Тер.; **ВК:** Асо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ВК:** Кубин. (Гроссгейм, 1945: 226); **ЮЗЗ:** Месх. (Гвинианидзе, 1978: 214); **ЮЗ:** Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т** (Гроссгейм, 1945: 226).

Юго-Зап. (Турция, Иран, Афганистан), Ср., Центр. Азия.

3 (307). *H. cinerea* DC. 1815, in DC. et Lam. Fl. Fr. ed. 3, Suppl.: 375. — *H. hirsuta* auct. non L.: Мурав. 1936, Фл. СССР, 6: 571, р. р., quoad syn. et icon.; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 226, р. р., quoad syn.; Карягин, 1952, Фл. Азерб. 3: 316, р. р., quoad syn.; Шишк. и В. Е. Авет. 1956, Фл. Арм. 2: 105, р. р., quoad syn.

Описан из Франции. *Lectotypus* (Hartvig, 1997: 231): «[France, near Montpellier] inter Grès et Castelnaud, 1814, M. Pouzin» (G).

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карг.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Атл., Южн. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср., Южн. (вост. Пакистан) Азия; Сев. Африка.

4 (308). *H. hirsuta* L. 1753, Sp. Pl.: 218; Мурав. 1936, Фл. СССР, 6: 571, р. р., excl. syn. et icon.; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 226, р. р., excl. syn.; Карягин,

* Г. А. Лазьков.

1952, Фл. Азерб. 3: 316, р. р., excl. syn.; Шишк. и В. Е. Авет. 1956, Фл. Арм. 2: 105, р. р., excl. syn.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Hartvig, 1997: 231): Herb. Linn. 312.2 (LINN).

ВЗ: Алаз.-Агрнич., Ширв.; **ЮЗ:** Нах.; **Т:**

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб.; **ЗК:** Уруп-Теб.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Мегр.-Зан., Ю. Караб. (Гроссгейм, 1945: 226).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран), Ср. Азия; Сев. Африка.

5 (309). **H. incana** Lam. 1789, Encycl. Méth. Bot. 3: 124 — *H. besseri* Fisch. ex Hornem. 1819, Suppl. Hort. Bot. Hafn.: 127.

Описан из южной Франции. *Lectotypus* (Chaudhri, 1968: 370): «S. France, Bourg-d'Oisans, M. Liottard» (P-LA).

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ: Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЗЗ:** Абх. (Колаковский, 1980: 162); **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Н. Кур. (Гроссгейм, 1945: 226).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран), Ср. (Туркменистан) Азия.

Sect. 2. **Paronychiella** F. N. Williams

6 (310). **H. polygama** J. Gay, 1846–1847, in Duch. Rev. Bot. Recueil Mens. 2: 371. — *H. euxina* Клоков, 1947, Бот. журн. АН УРСР, 4, 1–2: 74.

Описан по гербарным материалам с Украины, из Западной Сибири и Китая. *Lectotypus* (Chaudhri, 1968: 380): «Kioviae in Russia minori, Unio itiner, 1839, R. F. Hohenacker» (L; isolectotypi (2) — LE!).

ЗП: 3. Ставр.

Указан для **ВП:** В. Ставр. (Галушко, 1978: 249).

Юго-Вост., Вост. Европа; Ср., Центр. Азия.

Subfam. 2. MINUARTIOIDEAE Beilschm.

(ALSINOIDEAE Beilschm.)

Trib. 1. **Alsineae** Lam. et DC.

8 (61). **Arenaria** L.*

Subgen. 1. **Arenaria**

Sect. 1. **Arenaria**

1 (311). **A. serpyllifolia** L. 1753, Sp. Pl.: 423. — *A. viscida* Lois. 1809, Journ. Bot. (Desvaux), 2: 324. — *A. uralensis* Spreng. 1825, Syst. Veg. 2: 396.

* Г. А. Лазьков.