

1952, Фл. Азерб. 3: 316, р. р., excl. syn.; Шишк. и В. Е. Авет. 1956, Фл. Арм. 2: 105, р. р., excl. syn.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Hartvig, 1997: 231): Herb. Linn. 312.2 (LINN).

ВЗ: Алаз.-Агрич., Ширв.; **ЮЗ:** Нах.; **Т:**

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб.; **ЗК:** Уруп-Теб.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Мегр.-Зан., Ю. Караб. (Гроссгейм, 1945: 226).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран), Ср. Азия; Сев. Африка.

5 (309). **H. incana** Lam. 1789, Encycl. Méth. Bot. 3: 124 — *H. besseri* Fisch. ex Hornem. 1819, Suppl. Hort. Bot. Hafn.: 127.

Описан из южной Франции. *Lectotypus* (Chaudhri, 1968: 370): «S. France, Bourg-d'Oisans, M. Liottard» (P-LA).

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ: Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЗЗ:** Абх. (Колаковский, 1980: 162); **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Н. Кур. (Гроссгейм, 1945: 226).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран), Ср. (Туркменистан) Азия.

Sect. 2. **Paronychiella** F. N. Williams

6 (310). **H. polygama** J. Gay, 1846–1847, in Duch. Rev. Bot. Recueil Mens. 2: 371. — *H. euxina* Клоков, 1947, Бот. журн. АН УРСР, 4, 1–2: 74.

Описан по гербарным материалам с Украины, из Западной Сибири и Китая. *Lectotypus* (Chaudhri, 1968: 380): «Kioviae in Russia minori, Unio itiner, 1839, R. F. Hohenacker» (L; isolectotypi (2) — LE!).

ЗП: 3. Ставр.

Указан для **ВП:** В. Ставр. (Галушко, 1978: 249).

Юго-Вост., Вост. Европа; Ср., Центр. Азия.

Subfam. 2. MINUARTIOIDEAE Beilschm.

(ALSINOIDEAE Beilschm.)

Trib. 1. **Alsineae** Lam. et DC.

8 (61). **Arenaria** L.*

Subgen. 1. **Arenaria**

Sect. 1. **Arenaria**

1 (311). **A. serpyllifolia** L. 1753, Sp. Pl.: 423. — *A. viscida* Lois. 1809, Journ. Bot. (Desvaux), 2: 324. — *A. uralensis* Spreng. 1825, Syst. Veg. 2: 396.

* Г. А. Лазьков.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 1993: 21): Herb. Clifford: 173, «*Arenaria 2*» (BM).

ЗП; ВП: В. Ставро.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ; ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 246).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. (заносное), Южн. (вост. Пакистан) Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное).

2 (312). **A. leptoclados** (Rchb.) Guss. 1845, Fl. Sicul. Syn. 2: 824. — *A. serpyllifolia* L. *β. leptoclados* Rchb. 1841, Icon. Fl. Germ. Helv. 5–6: 32.

Описан из Европы, без указания точного местонахождения. *Lectotypus* (Phitos, 1997: 166): [Icon] H. G. L. Reichenbach, 1841, Icon. Fl. Germ. Helv. 5–6: tab. 216, fig. 4941 *β.*».

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Кум.; **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** Асо-Арг., В. Сулак.; **СЗЗ:** Пшад.-Джубг.; **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Занг., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ВП:** Тер.-Сулак.; **ЦК:** В. Тер.; **СЗЗ:** Пшад.-Джубг. (Гроссгейм, 1945: 215); **ЗЗ:** Адж. (Дмитриева, 1960: 318); **ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т** (Гроссгейм, 1945: 215).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран), Ср. Азия; Сев. Африка.

Вид слабо отличается от предыдущего.

Sect. 2. **Rotundifolia** McNeill

3 (313). **A. rotundifolia** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 343.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (McNeill, 1963: 263): «*Ex albus Caucasica, Kaischaur, 1802 [Bieberstein]*» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Севан., Нах., Мегр.-Зан.; **Т.**

Указан для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 247).

Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран), Ср. Азия.

Subgen. 2. **Eremogone** (Fenzl) Fenzl

Sect. 1. **Capillares** McNeill

4 (314). **A. lychnidea** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 347.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (McNeill, 1963: 291): «*Ex albus Caucasica, comm. Adams*» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК; ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.

Указан для всех горных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 246).
Юго-Зап. Азия (Турция).

Sect. 2. **Eremogone**

5 (315). **A. brachypetala** (Grossh.) T. N. Popova, 1972, Новости сист. высш. раст. 9: 160. — *A. graminea* C. A. Mey. var. *brachypetala* Grossh. 1928, Beih. Bot. Centralbl. 44, 2: 209.

Описан из Ирана. *Lectotypus* (Попова, 1972: 160): «*Persia borealis*, prov. Tabris (Atropatania), prope Tabris, 1350–1500 m, 25 VI [19]24, A. Grossheim» (LE!).

ЮЗ: Ерев.

Юго-Зап. (Иран) Азия.

Гвоздичные в работе А. А. Гроссгейма (Grossheim, 1928) обработаны Б. К. Шишкиным, но описание разновидности *A. graminea* C. A. Mey. var. *brachypetala*, по-видимому, принадлежит Гроссгейму.

6 (316). **A. cucubaloides** Sm. 1789, Pl. Icon. Ined. 1: 17, tab. 17.

Описан с Кавказа («*Sponte nascitur in Armeniâ. Herb. Tourn.*»)

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан.

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

7 (317). **A. graminea** C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 220.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (McNeill, 1963: 292): «*In campis et collibus siccis lapidosis prope pagum Swant, 20 VI 1830, Meyer*» (LE!, cum isolectotypis 2).

Т.

Указан для **ВК:** Ман.-Самур. (Гуссейнов, 1990: 236).

Юго-Зап. Азия (Иран).

По-видимому, указан для **ВК** ошибочно.

8 (318). **A. gypsophiloides** L. 1767, Mantissa Pl.: 71. — *A. caricifolia* Boiss. 1860, in Tchich. Asie Min. Bot. 1: 235.

Описан с «Востока» («*Habitat in Oriente*»).

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ;** **Т.**

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

9 (319). **A. longifolia** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 345. — *A. graminifolia* auct. non Schrad.: Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 217. — *A. stenophylla* auct. non Ledeb.: Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1: 246.

Описан по гербарным материалам из Восточной Европы. *Lectotypus* (McNeill, 1963): «*Ex dit. Wolgicis, Saratow, Sareptaе*» (LE!).

ЗП: 3. Ставро.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Гроссгейм, 1945: 217); **ВП:** В. Ставро. **ЦК:** В. Кум. (Галушко, 1978: 246); **ВК:** В. Сулак. (Гуссейнов, 1990: 236).

Вост. Европа; Сев., Ср., Центр. Азия.

По-видимому, указан для **ВК** ошибочно.

10 (320). **A. steveniana** Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 692. — *A. graminea* C. A. Mey. β. *parviflora* Fenzl, 1842, in Ledeb. Fl. Ross. 1: 362. — *A. blepharophylla* Boiss. var. *parviflora* (Fenzl) McNeill, 1963, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 24, 3: 293.

Описан с Кавказа («Hab. in Armeniâ Rossicâ prope Erivan (Stev.!) et ad lacum Göktchai (Bunge!)»).

ЦК: В. Кум.; **БК:** Ман.-Самур.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карг.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

Из **ЦК:** В. Кум.; **БК:** Ман.-Самур. имеются только старые сборы, возможно, с ошибочными этикетками.

Sect. 3. **Glomeriflorae** F. N. Williams

11 (321). **A. dianthoides** Sm. 1789, Pl. Icon. Ined. 1: 16, tab. 16.

Описан с Кавказа («Sponte nascitur in Armeniâ. Herb. Tourn.»).

ЮЗЗ: Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ;** **Т.**

Указан для **ВП:** Тер.-Сулак. (Гуссейнов, 1990: 236).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

По-видимому, указан для **ВП** ошибочно.

Sect. 4. **Rigidae** McNeill

12 (322). **A. holostea** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 345.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (McNeill, 1963: 297): «Ex Caucaso iberico» (LE — Herb. Vieb!).

ЦК: В. Тер.; **БК:** В. Сулак., Ман.-Самур.

Указан для **ЗК:** В. Куб.; **ЦК:** Малк. (Галушко, 1978: 246).

Эндемик.

13 (323). **A. macrantha** Schischk. 1936, Фл. СССР, 6: 886, 552. — *A. holostea* Bieb. subsp. *macrantha* (Schischk.) McNeill, 1963, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 24, 3: 297. — *A. szovitsii* auct. non Boiss.: Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 221; Ахундов, 1952, Фл. Азерб. 3: 207; Шишк. и В. Е. Авет. 1956, Фл. Арм. 2: 74.

Описан с Кавказа. *Typus*: «Эриванская губ., Сурмалинский у., близ с. Такялту, каменистые склоны, 10 VI 1913, № 12254, Ю. Воронов» (LE!).

ЮЗ: Ерев., Нах.

Юго-Зап. Азия (Турция).

9 (62). **Dichodon** (Bartl.) Rchb.*

Sect. 1. **Perennia** Ikonn.

1 (324). **D. cerastoides** (L.) Rchb. 1842, Icon. Fl. Germ. Helv. 5: 34 — *Stellaria cerastoides* L. 1753, Sp. Pl.: 422. — *Cerastium cerastoides* (L.) Britton, 1894, Mem. Torrey Bot. Club, 5: 150.

* И. В. Соколова.