

Fam. 44. **AMARANTHACEAE** Juss., nom. cons.*

Subfam. **AMARANTHOIDEAE** Burnett

Trib. **Amarantheae** Rchb.

1 (90). **Amaranthus** L.

Subgen. 1. **Amaranthus**

Sect. 1. **Amaranthus**

Subsect. 1. **Amaranthus**

1 (603). **A. caudatus** L. 1753, Sp. Pl.: 990. — *A. leucospermus* auct. non S. Watson: Вас. 1936, Фл. СССР, 6: 360.

Описан по материалам из Южной Америки и Азии.

ЗЗ: Туап.-Адл.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Указан для **ЗЗ:** Адж. (Гроссгейм, 1945: 171; Капеллер, 1947: 188; Дмитриева, 1990, 2: 112).

Указан в качестве культивируемого для Ставропольского края (Танфильев, Кононов, 1987: 37); Азербайджана (Карягин, 1952: 262).

Южн. Америка. Культивируется как декоративное и кормовое растение в тропических, субтропических и отчасти умеренных странах, иногда дичает.

2 (604). **A. retroflexus** L. 1753, Sp. Pl.: 991.

Описан из Северной Америки.

ЗП; ВП: В. Ставро.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК; ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах.; **Т.**

Указан для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 232; Муртазалиев, 2009, 1: 128); Ставропольского края (Танфильев, Кононов, 1987: 37); **ВП:** Тер.-Сулак.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт., Лори; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Дар. (Гроссгейм, 1945: 172; Капеллер, 1947: 191; Аветисян, 1956: 222); Азербайджана (Карягин, 1952: 264).

Сев. Америка. Заносное почти по всему земному шару.

Subsect. 2. **Hybrida** Mosyakin et K. R. Robertson

3 (605). **A. hybridus** L. 1753, Sp. Pl.: 990. — *A. chlorostachys* Willd. 1790, Hist. Amaranth.: 34, tab. 10, fig. 19. — *A. patulus* Bertol. 1837, Comment. Itin. Neapol.: 19. — *A. paniculatus* auct. non L.: Voiss. 1879, Fl. Or. 4: 989; Гроссг. 1930, Фл. Кавк. 2: 83.

Описан из Северной Америки.

ЗП: Аз.-Куб.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** В. Сулак., Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Адж.; **Т.**

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пишиш.; **ВК:** Ассо-Арг.; **ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Караб. (Гроссгейм, 1945: 172; Капеллер, 1947: 189; Аветисян, 1956: 221).

* Ю. Л. Меницкий.

Сев., Южн. Америка. Заносное во многих регионах Сев. Америки, Европы (юг), Африки, Азии и Австралии.

4 (606). **A. powellii** S. Watson, 1875, Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 10: 347.

Описан из Северной Америки.

Указан для **ЗЗ**: Туап.-Адл. (Зернов, 2006: 244).

Сев. Америка. Заносное и иногда натурализовавшееся почти по всей Америке, во многих странах Европы, Азии, Африки и Австралии.

5 (607). **A. hypochondriacus** L. 1753, Sp. Pl.: 991; Мосякин, 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 15.

Описан из Северной Америки.

Указан для **ЗЗ**: Туап.-Адл. (Зернов, 2006: 244).

Сев. Америка. Культивируется во многих странах мира, иногда дичает.

6 (608). **A. cruentus** L. 1759, Syst. Nat. ed. 10, 2: 1269; Гусев, 1972, Бот. журн. 57, 5: 460. — *A. paniculatus* L. 1763, Sp. Pl. ed. 2: 1406. — *A. hybridus* L. subsp. *cruentus* (L.) Thell. var. *paniculatus* (L.) Thell. 1912, Fl. Advent. Montpellier: 205; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 172.

Описан без указания родины.

Указан для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 232); Кавказа (Васильченко, 1936: 361; Гроссгейм, 1945: 172)

Сев. Америка. Культивируется во многих странах мира.

Sect. 2. **Dubia** Mosyakin et K. R. Robertson

7 (609). **A. spinosus** L. 1753, Sp. Pl.: 991.

Описан из Индии.

ЗЗ: Абх.

Указан для **ЗЗ**: Адж. (Гроссгейм, 1945: 171; Дмитриева, 1990, 2: 111).

Южн. Америка. Широко распространен в тропиках и субтропиках земного шара и иногда заносится в умеренную зону.

Subgen. 2. **Albersia** (Kunth) Gren. et Godr.

Sect. 1. **Blitopsis** Dumort.

8 (610). **A. lividus** L. 1753, Sp. Pl.: 990. — *A. blitum* L. 1753, l. c.: 990.

Описан из Европы.

ЗП; **ВП**: В. Ставро.; **ЗК**: Адаг.-Пшиш.; **ЦК**; **ВК**: Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ**: Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Ширв., Н. Кур.

Указан для **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ВК**: В. Сулак. (Гроссгейм, 1945: 175; Галушко, 1978: 232; Муртазалиев, 2009, 1: 128); **ВЗ**: Алаз.-Агрич.; **ЮЗЗ**: Мех. (Гроссгейм, 1945: 175; Капеллер, 1947: 194).

Родина, вероятно, тропики Старого Света. Распространился почти повсеместно от тропиков до умеренной зоны земного шара.

9 (611). **A. viridis** L. 1762, Sp. Pl. ed. 2: 1405. — *A. lividus* auct. non L.: Вас. 1936, Фл. СССР, 6: 366, р. р.

Описан по материалам из Европы и Бразилии.

ЗП: Аз.-Куб.; **ЗЗ:** Абх.; **ВЗ:** Н. Кур.

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Зернов, 2006: 244).

Родина, вероятно, Южн. Америка. Широко распространился в субтропических и тропических областях земного шара.

10 (612). **A. deflexus** L. 1771, Mantissa Alt.: 295.

Описан по культивированным образцам неизвестного происхождения.

СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **Т:**

Указан для **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 128), Ман.-Самур. (Галушко, 1978: 231); **ЗЗ:** Адж. (Гроссгейм, 1945: 175; Дмитриева, 1990, 2: 111); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек. (Гроссгейм, 1945: 175; Капеллер, 1947: 195; Карягин, 1952: 266).

Родина Южн. Америка. Распространился почти повсеместно.

Sect. 2. **Pyxidium** Moq.

11 (613). **A. graecizans** L. 1753, Sp. Pl.: 990. — *A. angustifolius* Lam. 1783, Encycl. Méth. Bot. 1: 115. — *A. pallidus* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 339. — *A. blitum* auct. non L.: Вас. 1936, Фл. СССР, 6: 364; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 171; Капеллер, 1947, Фл. Груз. 3: 193; Карягин, 1952, Фл. Азерб. 3: 265.

Описан из Северной Америки.

ВК: В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Абх., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **Т:**

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг. (Гроссгейм, 1945: 174; Галушко, 1978: 232); **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Зернов, 2006: 244); **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Дар., Нах. (Гроссгейм, 1945: 174; Капеллер, 1975: 236; Карягин, 1952: 256; Аветисян, 1956: 222).

Атл., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Южн. Азия; Африка; Сев., Южн. Америка; Австралия. Родина, предположительно, Средиземноморье.

12 (614). **A. blitoides** S. Watson, 1877, Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 12: 273.

Описан из Северной Америки.

ВП: В. Ставр., Тер.-Кум.; **ВК:** Ман.-Самур.; **ЮЗ:** Мегр.-Зан.; **Т:**

Указан для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 232); Ставропольского края (Танфильев, Кононов, 1987: 37); **ЗП:** Аз.-Куб.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Зернов, 2006: 244), Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв. (Гроссгейм, 1945: 299; Капеллер, 1947: 192, 1975: 234; Карягин, 1952: 264).

Сев. Америка. Заносное во многих странах Европы, Азии, Южн. Америки и Австралии.

13 (615). **A. albus** L. 1759, Syst. Nat. ed. 10, 2: 1268.

Описан из Северной Америки.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Тер.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх., Адж.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Дар.; **Т:**

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ВП:** Тер.-Сулак.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Уруп-Теб; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** Ассо-Арг. (Гроссгейм, 1945: 174; Галушко, 1978: 232; Танфильев, Кононов, 1987: 37; Зернов, 2006: 244; Мургазалиев, 2009, 1: 127); **ЗЗ:** Туап.-Адл., Рион.-Квир.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек. (Гроссгейм, 1945: 174; Карягин, 1952: 264; Капеллер, 1975: 235; Зернов, 2006: 244).

Сев., Центр. Америка. Заносное и часто вполне натурализовавшееся почти повсюду.

Subfam. 2. GOMPHRENOIDEAE Lindl.

Trib. **Gomphreneae** Fenzl

2 (91). **Alternanthera** Forssk.

1 (616). **A. sessilis** (L.) DC. 1813, Cat. Pl. Horti Monsp.: 77. — *Gomphrena sessilis* L. 1753, Sp. Pl.: 225. — *Alternanthera sessilis* (L.) R. Br. 1810, Prodr. Fl. Nov. Holland. 1: 417, nom. inval.

Описан из Австралии.

ВЗ: Н. Кур.; **Т:**

Средиз.; Вост., Юго-Вост., Южн. Азия; Африка; Америка; Австралия.

Fam. 45. CHENOPODIACEAE Vent., nom. cons.*

Subfam. 1 CHENOPODIOIDEAE Burnett

Trib. 1. **Polycnemeae** Benth. et Hook. f.

(*Amaranthaceae* Juss. subfam. *Polycnemoideae* Raf.: Takht. 2009, Flow. Pl. ed. 2: 142)

1 (92). **Polycnemon** L.

1 (617). **P. arvense** L. 1753, Sp. Pl.: 35. — *P. vulgare* Pall. 1771, Reise Russ. Reich. 1: 142.

Описан из Европы.

ЗП: Аз.-Куб.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Адж.; **ВЗ:** Иорск.-Шек.; **ЮЗ:** Ерев.

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК:** Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** В. Тер. (Гроссгейм, 1945: 118; Галушко, 1978: 216; Танфильев, Кононов, 1987: 34); **ВК:** В. Сулак. (Мургазалиев, 2009, 1: 129); **ЮЗ:** Севан. (Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 291).

* Ю. Л. Меницкий (Меницкий, 1994).