

13 (615). **A. albus** L. 1759, Syst. Nat. ed. 10, 2: 1268.

Описан из Северной Америки.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Тер.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх., Адж.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Дар.; **Т:**

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ВП:** Тер.-Сулак.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Уруп-Теб; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** Ассо-Арг. (Гроссгейм, 1945: 174; Галушко, 1978: 232; Танфильев, Кононов, 1987: 37; Зернов, 2006: 244; Мургазалиев, 2009, 1: 127); **ЗЗ:** Туап.-Адл., Рион.-Квир.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек. (Гроссгейм, 1945: 174; Карягин, 1952: 264; Капеллер, 1975: 235; Зернов, 2006: 244).

Сев., Центр. Америка. Заносное и часто вполне натурализовавшееся почти повсюду.

Subfam. 2. GOMPHRENOIDEAE Lindl.

Trib. **Gomphreneae** Fenzl

2 (91). **Alternanthera** Forssk.

1 (616). **A. sessilis** (L.) DC. 1813, Cat. Pl. Horti Monsp.: 77. — *Gomphrena sessilis* L. 1753, Sp. Pl.: 225. — *Alternanthera sessilis* (L.) R. Br. 1810, Prodr. Fl. Nov. Holland. 1: 417, nom. inval.

Описан из Австралии.

ВЗ: Н. Кур.; **Т:**

Средиз.; Вост., Юго-Вост., Южн. Азия; Африка; Америка; Австралия.

Fam. 45. CHENOPODIACEAE Vent., nom. cons.*

Subfam. 1 CHENOPODIOIDEAE Burnett

Trib. 1. **Polycnemeae** Benth. et Hook. f.

(*Amaranthaceae* Juss. subfam. *Polycnemoideae* Raf.: Takht. 2009, Flow. Pl. ed. 2: 142)

1 (92). **Polycnemum** L.

1 (617). **P. arvense** L. 1753, Sp. Pl.: 35. — *P. vulgare* Pall. 1771, Reise Russ. Reich. 1: 142.

Описан из Европы.

ЗП: Аз.-Куб.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Адж.; **ВЗ:** Иорск.-Шек.; **ЮЗ:** Ерев.

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК:** Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** В. Тер. (Гроссгейм, 1945: 118; Галушко, 1978: 216; Танфильев, Кононов, 1987: 34); **ВК:** В. Сулак. (Мургазалиев, 2009, 1: 129); **ЮЗ:** Севан. (Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 291).

* Ю. Л. Меницкий (Меницкий, 1994).

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция), Ср., Центр. Азия.

2 (618). **P. majus** A. Вг. 1841, Flora (Regensb.), 24: 151.

Описан из Германии.

ЗП; ВП: В. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Занг.

Указан для **ЗК:** Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер. (Гроссгейм, 1945: 118; Галушко, 1978: 216; Танфильев, Кононов, 1987: 34); **ВК:** Ман.-Самур. (Муртазалиев, 2009, 1: 129); **ВЗ:** Караб. (Карягин, 1952: 184).

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция), Ср., Центр. Азия.

Trib. 2. **Beteae** Volkens

2 (93). **Hablitzia** Bieb.

1 (619). **H. tamnoides** Bieb. 1817, Мém. Soc. Nat. Moscou, 5: 24; id. 1819, Fl. Taug.-Саус. 3: 170.

Описан с Кавказа (р-н Кавказских Минеральных Вод, окр. Константиногорска [с 1830 г. — г. Пятигорск]). *Le s t o t y p u s* (Menitsky, hoc loco): «In sylvis ad thermas Constantinomontanis, inter Urticam, Aparinem et al., 1813 [Bieberstein]» (LE!).

ЦК; ВК: Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Занг.

Указан для **ЗП:** 3. Ставр. (Танфильев, Кононов, 1987: 34); **ЗК:** Уруп-Теб., В. Куб.; **ВК:** В. Сулак. (Гроссгейм, 1945: 118; Галушко, 1978: 216); **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт. (Капеллер, 1975: 164), Лори (Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 280); **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек.; **ЮЗ:** Нах., Мегр.-Зан. (Гроссгейм, 1945: 118; Карягин, 1952: 185).

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, сев.-зап. Иран).

3 (94). **Beta** L.

1 (620). **B. maritima** L. 1762, Sp. Pl. ed. 2: 322. — *B. vulgaris* L. [var.] *perennis* L. 1753, Sp. Pl.: 222. — *B. vulgaris* var. *maritima* (L.) Моq. 1840, Chenop. Monogr. Enum.: 15. — *B. perennis* (L.) Freyn, 1877, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 27: 414. — *B. vulgaris* subsp. *maritima* (L.) Arcang. 1882, Comp. Fl. Ital.: 592.

Описан из Европы.

ЗК: Бело-Лаб.; **ВК:** Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Н. Кур., Караб.

Указан для **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 130); **ВЗ:** Мург.-Муровд. (Рзазаде, 1952: 189); **ЮЗ:** Ерев. (Гроссгейм, 1945: 120; Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 286).

Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция).