

Описан из Закавказья (Грузия, Армения).

ВЗ: Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Ю. Караб. Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция).

Trib. 5. **Camphorosmeae** Moq.

10 (101). **Pandertia** Fisch. et C. A. Mey.

1 (662). **P. pilosa** Fisch. et C. A. Mey. 1835, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 2: 46. Описан из Талыша («in montibus Talysch ...»).

БК: Ман.-Самур.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах.; **Т:**

Указан для **ЗК:** В. Куб. (Танфильев, Кононов, 1987: 35).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

Все образцы из Южного Закавказья в Гербарии LE, определенные разными авторами как *P. turkestanica* Пјin, по признакам придатков околоцветника относятся к *P. pilosa*.

11 (102). **Camphorosma** L.

1 (663). **C. monspeliaca** L. 1753, Sp. Pl.: 112.

Описан из Южной Европы.

1a. **C. monspeliaca** L. subsp. **monspeliaca**. — *C. ruthenica* Vieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 112.

ЗП; БК: Ман.-Самур.

Указан для **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум. (Галушко, 1978: 223; Танфильев, Кононов, 1987: 35); **БК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 137), Кубин. (Гроссгейм, 1945: 138); **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Зернов, 2006: 239); **ВЗ:** Ширв., Н. Кур. (Гроссгейм, 1945: 138; Карягин, 1952: 210); **ЮЗЗ:** Месх. (Капеллер, 1947: 160).

Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция), Ср., Центр. Азия.

1b. **C. monspeliaca** L. subsp. **lessingii** (Litv.) Aellen, 1967, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 28, 1: 31. — *C. lessingii* Litv. 1905, Тр. Бот. муз. Акад. наук, 2: 96. — *C. monspeliaca* var. *ruthenica* Trautv. 1867, Bull. Soc. Nat. Moscou, 40, 3: 57, non *C. ruthenica* Vieb. 1819.

Описан из Казахстана.

БК: Ман.-Самур.; **ВЗ; ЮЗ:** Ерев., Мегр.-Зан.

Указан для **ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **БК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 137).

Вост. Европа; Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср., Центр. Азия.

12 (103). **Kochia** Roth

1 (664). **K. prostrata** (L.) Schrad. 1809, Neues Journ. Bot. 3, 3–4: 85. — *Salsola prostrata* L. 1753, Sp. Pl.: 222.