

Описан из Закавказья (Грузия, Армения).

**ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Ю. Караб. Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция).

Trib. 5. **Camphorosmeae** Moq.

10 (101). **Pandertia** Fisch. et C. A. Mey.

1 (662). **P. pilosa** Fisch. et C. A. Mey. 1835, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 2: 46. Описан из Талыша («in montibus Talysch ...»).

**ВК:** Ман.-Самур.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах.; **Т:**

Указан для **ЗК:** В. Куб. (Танфильев, Кононов, 1987: 35).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

Все образцы из Южного Закавказья в Гербарии LE, определенные разными авторами как *P. turkestanica* Пјin, по признакам придатков околоцветника относятся к *P. pilosa*.

11 (102). **Camphorosma** L.

1 (663). **C. monspeliaca** L. 1753, Sp. Pl.: 112.

Описан из Южной Европы.

1a. **C. monspeliaca** L. subsp. **monspeliaca**. — *C. ruthenica* Vieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 112.

**ЗП; ВК:** Ман.-Самур.

Указан для **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум. (Галушко, 1978: 223; Танфильев, Кононов, 1987: 35); **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 137), Кубин. (Гроссгейм, 1945: 138); **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Зернов, 2006: 239); **ВЗ:** Ширв., Н. Кур. (Гроссгейм, 1945: 138; Карягин, 1952: 210); **ЮЗЗ:** Месх. (Капеллер, 1947: 160).

Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция), Ср., Центр. Азия.

1b. **C. monspeliaca** L. subsp. **lessingii** (Litv.) Aellen, 1967, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 28, 1: 31. — *C. lessingii* Litv. 1905, Тр. Бот. муз. Акад. наук, 2: 96. — *C. monspeliaca* var. *ruthenica* Trautv. 1867, Bull. Soc. Nat. Moscou, 40, 3: 57, non *C. ruthenica* Vieb. 1819.

Описан из Казахстана.

**ВК:** Ман.-Самур.; **ВЗ; ЮЗ:** Ерев., Мегр.-Зан.

Указан для **ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 137).

Вост. Европа; Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср., Центр. Азия.

12 (103). **Kochia** Roth

1 (664). **K. prostrata** (L.) Schrad. 1809, Neues Journ. Bot. 3, 3–4: 85. — *Salsola prostrata* L. 1753, Sp. Pl.: 222.

Описан из Северной Азии.

**ЗП; ВП; ЦК; ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Мегр.-Зан.; **Т:**

Указан для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 224); **ЗК:** Уруп-Теб. (Гроссгейм, 1945: 141).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср., Центр., Вост., Южн. Азия.

2 (665). **K. laniflora** (S. G. Gmel.) Borbás, 1900, Balaton Tavanak Partmellekenek Novenyfoldr.: 340. — *Salsola laniflora* S. G. Gmel. 1774, Reise Russland, 1: 160. — *S. dasyantha* Pall. 1803, III. Pl.: 19. — *S. tenuifolia* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 188. — *Kochia dasyantha* (Pall.) Schrad. 1809, Neues Journ. Bot. 3, 3–4: 86.

Описан с юга Восточной Европы.

**ЗП:** З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Н. Кур.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 138); **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ВК:** В. Сулак. (Галушко, 1978: 224, Муртазалиев, 2009, 1: 138); **ВЗ:** Ширв. (Карягин, 1952: 214).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Ср., Центр. Азия.

3 (666). **K. iranica** Bornm. 1908, Bull. Herb. Boiss. sér. 2, 8: 546.

Описан из юго-восточного Ирана.

Возможно нахождение в **ЮЗ**, так как указан для сопредельной территории Турции (с. Аралых [Аралык] б. Сурмалинского округа [пров. Ыгдыр]) (Гроссгейм, 1945: 1420).

Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср., Центр. Азия.

4 (667). **K. scoparia** (L.) Schrad. 1809, Neues Journ. Bot. 3, 3–4: 85. — *Chenopodium scoparium* L. 1753, Sp. Pl.: 221. — *Salsola scoparia* (L.) Bieb. 1811, Mém Soc. Nat. Moscou, 1: 144.

Описан по материалам из Греции и Японии.

**ЗП:** З. Ставр.; **ВП; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах. (Гроссгейм, 1945: 142; Исаев, 1952: 214; Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 308; Муртазалиев, 2009, 1: 138).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср., Центр. Вост., Южн. Азия; Сев., Южн. Америка (заносное).

### 13 (104). **Bassia** All.

1 (668). **B. hyssopifolia** (Pall.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 547. — *Salsola hyssopifolia* Pall. 1771, Reise Russ. Reich. 1: 491. — *Kochia hyssopifolia* (Pall.) Roth, 1802, Neue Beytr. Bot.: 176. — *Echinopsilon hyssopifolium* (Pall.) Moq. 1840, Chenop. Monogr. Enum.: 87.

Описан из Западного Казахстана (низовья Урала).