

Описан из Северной Азии.

ЗП; ВП; ЦК; ВК; СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карг.; **ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Мегр.-Зан.; **Т:**

Указан для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1978: 224); **ЗК:** Уруп-Теб. (Гроссгейм, 1945: 141).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср., Центр., Вост., Южн. Азия.

2 (665). **K. laniflora** (S. G. Gmel.) Borbás, 1900, Balaton Tavanak Partmellekenek Novenyfoldr.: 340. — *Salsola laniflora* S. G. Gmel. 1774, Reise Russland, 1: 160. — *S. dasyantha* Pall. 1803, III. Pl.: 19. — *S. tenuifolia* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 188. — *Kochia dasyantha* (Pall.) Schrad. 1809, Neues Journ. Bot. 3, 3–4: 86.

Описан с юга Восточной Европы.

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Н. Кур.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 138); **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ВК:** В. Сулак. (Галушко, 1978: 224, Муртазалиев, 2009, 1: 138); **ВЗ:** Ширв. (Карягин, 1952: 214).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Ср., Центр. Азия.

3 (666). **K. iranica** Bornm. 1908, Bull. Herb. Boiss. sér. 2, 8: 546.

Описан из юго-восточного Ирана.

Возможно нахождение в **ЮЗ**, так как указан для сопредельной территории Турции (с. Аралых [Аралык] б. Сурмалинского округа [пров. Ыгдыр]) (Гроссгейм, 1945: 1420).

Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср., Центр. Азия.

4 (667). **K. scoparia** (L.) Schrad. 1809, Neues Journ. Bot. 3, 3–4: 85. — *Chenopodium scoparium* L. 1753, Sp. Pl.: 221. — *Salsola scoparia* (L.) Bieb. 1811, Mém Soc. Nat. Moscou, 1: 144.

Описан по материалам из Греции и Японии.

ЗП: З. Ставр.; **ВП; ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах. (Гроссгейм, 1945: 142; Исаев, 1952: 214; Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 308; Муртазалиев, 2009, 1: 138).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср., Центр. Вост., Южн. Азия; Сев., Южн. Америка (заносное).

13 (104). **Bassia** All.

1 (668). **B. hyssopifolia** (Pall.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 547. — *Salsola hyssopifolia* Pall. 1771, Reise Russ. Reich. 1: 491. — *Kochia hyssopifolia* (Pall.) Roth, 1802, Neue Beitr. Bot.: 176. — *Echinopsilon hyssopifolium* (Pall.) Moq. 1840, Chenop. Monogr. Enum.: 87.

Описан из Западного Казахстана (низовья Урала).

ВП; ВК: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев.; **Т:**

Указан для **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Нах. (Гроссгейм, 1945: 140; Капеллер, 1947: 161; Карягин, 1952: 212; Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 300).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр. Азия; Сев. Америка (заносное).

2 (669). **B. sedoides** (Pall.) Asch. 1867, in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 1: 187, in adnot. — *Salsola sedoides* Pall. 1771, Reise Russ. Reich. 1: 213. — *Suaeda sedifolia* Pall. 1803, III. Pl.: 41. — *Kochia sedoides* (Pall.) Schrad. 1809, Neues Journ. Bot. 3, 3–4: 86. — *Echinopsilon sedoides* (Pall.) Moq. 1834, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 2: 127.

Описан по материалам из бассейнов Волги и Урала.

ЗП; ВП; ВК: Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Н. Кур.

Указан для **ЦК:** В. Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 36); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Капеллер, 1947: 161); **ВЗ:** Иорск.-Шек. (Гроссгейм, 1945: 140; Капеллер, 1947: 161).

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев., Ср., Центр. Азия.

3 (670). **B. hirsuta** (L.) Asch. 1867, in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 1: 187. — *Chepodium hirsutum* L. 1753, Sp. Pl.: 221. — *Echinopsilon hirsutum* (L.) Moq. 1834, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 2: 127.

Описан из Франции.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр.; **ВК:** Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ВЗ:** Н. Кур.

Указан для **ЗП:** 3. Ставр. (Гроссгейм, 1945: 140; Танфильев, Кононов, 1987: 36).

Атл., Сев., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Ср., Центр. Азия.

Trib. 6. **Corispermeae** Moq.

14 (105). **Corispermum** L.

1 (671). **C. caucasicum** (Pjlin) Pjlin, 1937, Фл. Туркм. 2, 1: 134; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 142, cum auct. (Bunge) Grossh. — *C. aralocaspicum* Pjlin subsp. *caucasicum* Pjlin, 1929, Изв. Главн. бот. сада СССР, 28, 5–6: 637. — *C. laxiflorum* Schrenk var. *caucasicum* Pjlin ex Grossh. 1930, Фл. Кавк. 2: 68, nom. nud.

Описан из Прикаспия («Persia... Caucasus ... Transhyrcania»).

ВП; ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **ЮЗ:** Нах.

Указан для **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 139); **Т** (Исаев, 1952: 215).

Вост. Европа; Юго-Зап. (Иран), Ср. Азия.

2 (672). **C. nitidum** Kit. ex Schult. 1814, Österr. Fl. ed. 2, 1: 7.

Описан из Венгрии.

ВП: Тер.-Кум.; **ВК:** Ман.-Самур.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Зернов, 2006: 241); **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 139); **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Зернов, 2006: 241).

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев. Америка (заносное).