

**ВП; ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев.; **Т:**

Указан для **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Нах. (Гроссгейм, 1945: 140; Капеллер, 1947: 161; Карягин, 1952: 212; Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 300).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр. Азия; Сев. Америка (заносное).

2 (669). **B. sedoides** (Pall.) Asch. 1867, in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 1: 187, in adnot. — *Salsola sedoides* Pall. 1771, Reise Russ. Reich. 1: 213. — *Suaeda sedifolia* Pall. 1803, III. Pl.: 41. — *Kochia sedoides* (Pall.) Schrad. 1809, Neues Journ. Bot. 3, 3–4: 86. — *Echinopsilon sedoides* (Pall.) Moq. 1834, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 2: 127.

Описан по материалам из бассейнов Волги и Урала.

**ЗП; ВП; ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Н. Кур.

Указан для **ЦК:** В. Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 36); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Капеллер, 1947: 161); **ВЗ:** Иорск.-Шек. (Гроссгейм, 1945: 140; Капеллер, 1947: 161).

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев., Ср., Центр. Азия.

3 (670). **B. hirsuta** (L.) Asch. 1867, in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 1: 187. — *Chepodium hirsutum* L. 1753, Sp. Pl.: 221. — *Echinopsilon hirsutum* (L.) Moq. 1834, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 2: 127.

Описан из Франции.

**ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр.; **ВК:** Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ВЗ:** Н. Кур.

Указан для **ЗП:** З. Ставр. (Гроссгейм, 1945: 140; Танфильев, Кононов, 1987: 36).

Атл., Сев., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Ср., Центр. Азия.

## Trib. 6. **Corispermeae** Moq.

### 14 (105). **Corispermum** L.

1 (671). **C. caucasicum** (Pjlin) Pjlin, 1937, Фл. Туркм. 2, 1: 134; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 142, cum auct. (Bunge) Grossh. — *C. aralocaspicum* Pjlin subsp. *caucasicum* Pjlin, 1929, Изв. Главн. бот. сада СССР, 28, 5–6: 637. — *C. laxiflorum* Schrenk var. *caucasicum* Pjlin ex Grossh. 1930, Фл. Кавк. 2: 68, nom. nud.

Описан из Прикаспия («Persia... Caucasus ... Transhyrcania»).

**ВП; ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **ЮЗ:** Нах.

Указан для **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 139); **Т** (Исаев, 1952: 215).

Вост. Европа; Юго-Зап. (Иран), Ср. Азия.

2 (672). **C. nitidum** Kit. ex Schult. 1814, Österr. Fl. ed. 2, 1: 7.

Описан из Венгрии.

**ВП:** Тер.-Кум.; **ВК:** Ман.-Самур.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Зернов, 2006: 241); **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 139); **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Зернов, 2006: 241).

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев. Америка (заносное).

3 (673). **C. orientale** Lam. 1786, Encycl. Méth. Bot. 2: 111.

Описан из Юго-Западной Азии («Levant»).

**ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум.; **БК:** Ман.-Самур.; **ВЗ:** Ширв.; **Т:**

Указан для **БК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 139).

Вост. Европа; Сев., Юго-Зап., Ср, Центр., Вост. Азия.

#### 15 (106). **Agriophyllum** Bieb. ex C. A. Mey.

1 (674). **A. squarrosus** (L.) Moq. 1849, in DC. Prodr. 13, 2: 139. — *Corispermum squarrosus* L. 1753, Sp. Pl.: 4. — *C. pungens* Vahl, 1805, Enum. Pl. 1: 17. — *Agriophyllum arenarium* Bieb. ex C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 163. — *A. pungens* (Vahl) Link ex A. Dietr. 1831, Sp. Pl. 1: 124.

Описан из Восточной Европы.

**ВП;** **БК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв.; **Т:**

Указан для **БК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 139); **ВЗ:** Н. Кур. (Исаев, 1952: 216).

Вост. Европа; Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр., Вост. Азия.

2 (675). **A. lateriflorum** (Lam.) Moq. 1849, in DC. Prodr. 13, 2: 139. — *Eryngium lateriflorum* Lam. 1797, Encycl. Méth. Bot. 4: 756. — *Agriophyllum tournefortii* Fisch. 1867, in Trautv. Bull. Soc. Nat. Moscou, 15, 3: 59.

Описан с «Востока».

**ВЗ:** Ширв.; **ЮЗ:** Нах.

Указан для **БК:** Кубин. (Исаев, 1952: 216); **ЮЗ:** Ерев. (Гроссгейм, 1945: 143; Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 313).

Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр. Азия.

#### 16 (107). **Anthochlamys** Fenzl

1 (676). **A. polygaloides** (Fisch. et C. A. Mey.) Fenzl, 1837, in Endl. Gen. Pl. 4: 300. — *Corispermum polygaloides* Fisch. et C. A. Mey. 1835, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 1: 24.

Описан из Талыша. Тур у s: «In montibus Talüsch, R. F. Hohenacker» (LE!).

**Т:**

Юго-Зап. (Иран), Ср. Азия.

### Subfam. 2. SALICORNIOIDEAE Luerss.

#### Trib. 1. **Halopeplideae** Ulbr.

#### 17 (108). **Halopeplis** Bunge ex Ung.-Sternb.

1 (677). **H. pygmaea** (Pall.) Bunge ex Ung.-Sternb. 1866, Vers. Syst. Salicorn.: 105. — *Salicornia pygmaea* Pall. 1803, Ill. Pl.: 9, tab. 2, fig. 2.

Описан с побережья Каспийского моря (близ устья Кумы) («in oris lacuum sal-sorum ad mare Caspium versus Cumam fl. sitorum»).