

3 (673). **C. orientale** Lam. 1786, Encycl. Méth. Bot. 2: 111.

Описан из Юго-Западной Азии («Levant»).

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум.; **БК:** Ман.-Самур.; **ВЗ:** Ширв.; **Т:**

Указан для **БК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 139).

Вост. Европа; Сев., Юго-Зап., Ср, Центр., Вост. Азия.

15 (106). **Agriophyllum** Bieb. ex C. A. Mey.

1 (674). **A. squarrosus** (L.) Moq. 1849, in DC. Prodr. 13, 2: 139. — *Corispermum squarrosus* L. 1753, Sp. Pl.: 4. — *C. pungens* Vahl, 1805, Enum. Pl. 1: 17. — *Agriophyllum arenarium* Bieb. ex C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 163. — *A. pungens* (Vahl) Link ex A. Dietr. 1831, Sp. Pl. 1: 124.

Описан из Восточной Европы.

ВП; **БК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв.; **Т:**

Указан для **БК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 139); **ВЗ:** Н. Кур. (Исаев, 1952: 216).

Вост. Европа; Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр., Вост. Азия.

2 (675). **A. lateriflorum** (Lam.) Moq. 1849, in DC. Prodr. 13, 2: 139. — *Eryngium lateriflorum* Lam. 1797, Encycl. Méth. Bot. 4: 756. — *Agriophyllum tournefortii* Fisch. 1867, in Trautv. Bull. Soc. Nat. Moscou, 15, 3: 59.

Описан с «Востока».

ВЗ: Ширв.; **ЮЗ:** Нах.

Указан для **БК:** Кубин. (Исаев, 1952: 216); **ЮЗ:** Ерев. (Гроссгейм, 1945: 143; Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 313).

Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр. Азия.

16 (107). **Anthochlamys** Fenzl

1 (676). **A. polygaloides** (Fisch. et C. A. Mey.) Fenzl, 1837, in Endl. Gen. Pl. 4: 300. — *Corispermum polygaloides* Fisch. et C. A. Mey. 1835, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 1: 24.

Описан из Талыша. Ту р и с: «In montibus Talüsch, R. F. Hohenacker» (LE!).

Т:

Юго-Зап. (Иран), Ср. Азия.

Subfam. 2. SALICORNIOIDEAE Luerss.

Trib. 1. **Halopeplideae** Ulbr.

17 (108). **Halopeplis** Bunge ex Ung.-Sternb.

1 (677). **H. pygmaea** (Pall.) Bunge ex Ung.-Sternb. 1866, Vers. Syst. Salicorn.: 105. — *Salicornia pygmaea* Pall. 1803, Ill. Pl.: 9, tab. 2, fig. 2.

Описан с побережья Каспийского моря (близ устья Кумы) («in oris lacuum sal-sorum ad mare Caspium versus Cumam fl. sitorum»).

Указан для **ВП**: Тер.-Кум. (Pallas, 1803: 9; Муртазалиев, 2009, 1: 140).
Вост. Европа; Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр. Азия.

18 (109). **Kalidium** Moq.

1 (678). **K. foliatum** (Pall.) Moq. 1849, in DC. Prodr. 13, 2: 147. — *Salicornia foliata* Pall. 1771, Reise Russ. Reich. 1: 422, 482.

Описан из Казахстана.

ВП: Тер.-Кум.; **БК**: Ман.-Самур.

Указан для **ВП**: Тер.-Сулак. (Гроссгейм, 1945:144; Муртазалиев, 2009, 1: 140);
БК: В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 140); **ВЗ**: Ширв.; **ЮЗ**: Нах. (Мусаев, 1988: 17).

Вост. Европа; Сев., Ср., Центр. Азия.

2 (679). **K. caspicum** (L.) Ung.-Sternb. 1876, Atti Congr. Intern. Bot. Firenze, 1874: 317. — *Salicornia caspica* L. 1753, Sp. Pl.: 4. — *S. pallasii* C. A. Mey. 1838, in Nothen. Enum. Pl. Talysch: 125.

Описан по материалам с побережья Каспийского моря и из Ирана.

БК: Ман.-Самур., **ВЗ**: Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ**: Ерев., Нах.

Указан для **ВП**: Тер.-Кум., Тер.-Сулак. (Гроссгейм, 1945: 144; Галушко, 1978: 225; Муртазалиев, 2009, 1: 140); **БК**: В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 140), Кубин. (Исаев, 1952: 217).

Вост. Европа; Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр. Азия.

Trib. 2. **Salicornieae** Dumort.

19 (110). **Halocnemum** Bieb.

1 (680). **H. strobilaceum** (Pall.) Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 3. — *Salicornia strobilacea* Pall. 1771, Reise Russ. Reich. 1: 481, tab. V, fig. 1–2.

Описан по материалам из прикаспийских районов.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП**; **БК**: Ман.-Самур; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ВЗ**: Ширв., Н. Кур.; **ЮЗ**: Ерев., Нах.

Указан для **ЗП**: З. Ставр.; **ЦК**: В. Кум., В. Тер.; **БК**: Ассо-Арг. (Галушко, 1978: 226; Танфильев, Кононов, 1987: 36), В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 141), Кубин.; **ЦЗ**: Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Иорск.-Шек. (Гроссгейм, 1945: 146; Исаев, 1952: 221).

Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср., Центр. Азия.

20 (111). **Halostachys** C. A. Mey.

1 (681). **H. caspica** (Bieb.) C. A. Mey. 1843, Bull. Phys.-Math. Acad. Sci. (Petersb), 1: 361. — *Halocnemum caspicum* Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 3, excl. syn. — *Salicornia caspica* Pall. 1771, Reise Russ. Reich. 1: 431, non L. 1753. — *Arthrocnemum belangerianum* Moq. 1840, Chenop. Monogr. Enum.: 112. — *Halostachys belangeriana* (Moq.) Botsch. 1954, Бот. мат. (Ленинград), 16: 84.