

Указан для **ВП**: Тер.-Кум. (Pallas, 1803: 9; Муртазалиев, 2009, 1: 140).  
Вост. Европа; Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр. Азия.

#### 18 (109). **Kalidium** Moq.

1 (678). **K. foliatum** (Pall.) Moq. 1849, in DC. Prodr. 13, 2: 147. — *Salicornia foliata* Pall. 1771, Reise Russ. Reich. 1: 422, 482.

Описан из Казахстана.

**ВП**: Тер.-Кум.; **БК**: Ман.-Самур.

Указан для **ВП**: Тер.-Сулак. (Гроссгейм, 1945:144; Муртазалиев, 2009, 1: 140); **БК**: В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 140); **ВЗ**: Ширв.; **ЮЗ**: Нах. (Мусаев, 1988: 17).

Вост. Европа; Сев., Ср., Центр. Азия.

2 (679). **K. caspicum** (L.) Ung.-Sternb. 1876, Atti Congr. Intern. Bot. Firenze, 1874: 317. — *Salicornia caspica* L. 1753, Sp. Pl.: 4. — *S. pallasii* C. A. Mey. 1838, in Nothen. Enum. Pl. Talysch: 125.

Описан по материалам с побережья Каспийского моря и из Ирана.

**БК**: Ман.-Самур., **ВЗ**: Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ**: Ерев., Нах.

Указан для **ВП**: Тер.-Кум., Тер.-Сулак. (Гроссгейм, 1945: 144; Галушко, 1978: 225; Муртазалиев, 2009, 1: 140); **БК**: В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 140), Кубин. (Исаев, 1952: 217).

Вост. Европа; Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр. Азия.

#### Trib. 2. **Salicornieae** Dumort.

#### 19 (110). **Halocnemum** Bieb.

1 (680). **H. strobilaceum** (Pall.) Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 3. — *Salicornia strobilacea* Pall. 1771, Reise Russ. Reich. 1: 481, tab. V, fig. 1–2.

Описан по материалам из прикаспийских районов.

**ЗП**: Аз.-Куб.; **ВП**; **БК**: Ман.-Самур; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ВЗ**: Ширв., Н. Кур.; **ЮЗ**: Ерев., Нах.

Указан для **ЗП**: З. Ставр.; **ЦК**: В. Кум., В. Тер.; **БК**: Ассо-Арг. (Галушко, 1978: 226; Танфильев, Кононов, 1987: 36), В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 141), Кубин.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Иорск.-Шек. (Гроссгейм, 1945: 146; Исаев, 1952: 221).

Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср., Центр. Азия.

#### 20 (111). **Halostachys** C. A. Mey.

1 (681). **H. caspica** (Bieb.) C. A. Mey. 1843, Bull. Phys.-Math. Acad. Sci. (Petersb), 1: 361. — *Halocnemum caspicum* Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 3, excl. syn. — *Salicornia caspica* Pall. 1771, Reise Russ. Reich. 1: 431, non L. 1753. — *Arthrocnemum belangerianum* Moq. 1840, Chenop. Monogr. Enum.: 112. — *Halostachys belangeriana* (Moq.) Botsch. 1954, Бот. мат. (Ленинград), 16: 84.

Описан с побережья Каспийского моря.

**ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.

Указан для **ЗП:** З. Ставр. (Гроссгейм, 1945: 145); **ВП:** В. Ставр. (Галушко, 1978: 226); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Гроссгейм, 1945: 145).

Вост. Европа; Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр. Азия.

## 21 (112). *Microcnemum* Ung.-Sternb.

1 (682). **M. coralloides** (Loscos et J. Pardo) Buen, 1883, Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 431. — *Arthrocnemum coralloides* Loscos et J. Pardo, 1863, Ser. Inconf. Pl. Aragon.: 90. — *Microcnemum coralloides* (Loscos et J. Pardo) Font Quer, 1925, Butl. Inst. Catalana Hist. Nat. 5: 98, comb. superfl.

Описан из Испании.

Средиз.; Юго-Зап. Азия.

1а. **M. coralloides** (Loscos et J. Pardo) Buen subsp. **anatolicum** Wagenitz, 1959, Ber. Deutsch. Bot. Ges. 72: 153, cum auct. (Loscos et J. Pardo) Font-Quer; Тахт. и Фёд. 1972, Фл. Ерев.: 93.

Описан из Турции.

**ЮЗ:** Ерев.

Юго-Зап. Азия (Турция).

Отличается от типового подвида желтоватыми веточками и семенами, густо покрытыми сосочками.

## 22 (113). *Salicornia* L.

1 (683). **S. prostrata** Pall. 1776, Reise Russ. Reich. 1, Anhang: 29; id. 1803, III. Pl.: 8, tab. 3; P. W. Ball, 1967, Fl. Turk. 2: 32; Чер. 1981, Сосуд. Раст. СССР: 182. — *S. herbacea* L. var. *prostrata* (Pall.) Moq. 1840, Chenop. Monogr. Enum.: 115. — *S. herbacea* auct. non L.: Ильин, 1936, Фл. СССР, 6: 172, р. р.; Гроссг. 1930, Фл. Кавк. 2: 71; он же, 1945, цит. соч. изд. 2, 3: 146. — *S. perennans* auct. non Willd.: Цвел. 1993, Укр. бот. журн. 50, 1: 82; он же, 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 73; Зернов, 2006, Фл. Сев.-Зап. Кавк.: 241.

Описан из Европы.

**ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП;** **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.; **Т.**

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Кубин. (Гроссгейм, 1945: 146; Исаев, 1952: 221; Танфильев, Кононов, 1987: 35).

Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср., Центр., Вост., Южн. Азия.

Название «*S. perennans* Willd.» было принято как приоритетное для этого вида (Цвелёв, 1993, 1996), но, как сообщил Н. Freitag, типовой материал *S. perennans* Willd. относится к виду другого рода.