

Описан с побережья Каспийского моря.

ВП: Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.

Указан для **ЗП:** З. Ставр. (Гроссгейм, 1945: 145); **ВП:** В. Ставр. (Галушко, 1978: 226); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Гроссгейм, 1945: 145).

Вост. Европа; Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр. Азия.

21 (112). *Microcnemum* Ung.-Sternb.

1 (682). **M. coralloides** (Loscos et J. Pardo) Buen, 1883, Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 431. — *Arthrocnemum coralloides* Loscos et J. Pardo, 1863, Ser. Inconf. Pl. Aragon.: 90. — *Microcnemum coralloides* (Loscos et J. Pardo) Font Quer, 1925, Butl. Inst. Catalana Hist. Nat. 5: 98, comb. superfl.

Описан из Испании.

Средиз.; Юго-Зап. Азия.

1а. **M. coralloides** (Loscos et J. Pardo) Buen subsp. **anatolicum** Wagenitz, 1959, Ber. Deutsch. Bot. Ges. 72: 153, cum auct. (Loscos et J. Pardo) Font-Quer; Тахт. и Фёд. 1972, Фл. Ерев.: 93.

Описан из Турции.

ЮЗ: Ерев.

Юго-Зап. Азия (Турция).

Отличается от типового подвида желтоватыми веточками и семенами, густо покрытыми сосочками.

22 (113). *Salicornia* L.

1 (683). **S. prostrata** Pall. 1776, Reise Russ. Reich. 1, Anhang: 29; id. 1803, III. Pl.: 8, tab. 3; P. W. Ball, 1967, Fl. Turk. 2: 32; Чер. 1981, Сосуд. Раст. СССР: 182. — *S. herbacea* L. var. *prostrata* (Pall.) Моq. 1840, Chenop. Monogr. Enum.: 115. — *S. herbacea* auct. non L.: Ильин, 1936, Фл. СССР, 6: 172, р. р.; Гроссг. 1930, Фл. Кавк. 2: 71; он же, 1945, цит. соч. изд. 2, 3: 146. — *S. perennans* auct. non Willd.: Цвел. 1993, Укр. бот. журн. 50, 1: 82; он же, 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 73; Зернов, 2006, Фл. Сев.-Зап. Кавк.: 241.

Описан из Европы.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП;** **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.; **Т.**

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Кубин. (Гроссгейм, 1945: 146; Исаев, 1952: 221; Танфильев, Кононов, 1987: 35).

Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср., Центр., Вост., Южн. Азия.

Название «*S. perennans* Willd.» было принято как приоритетное для этого вида (Цвелёв, 1993, 1996), но, как сообщил Н. Freitag, типовой материал *S. perennans* Willd. относится к виду другого рода.