

Описан с побережья Каспийского моря.

ВП: Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.

Указан для **ЗП:** З. Ставр. (Гроссгейм, 1945: 145); **ВП:** В. Ставр. (Галушко, 1978: 226); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Гроссгейм, 1945: 145).

Вост. Европа; Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр. Азия.

21 (112). *Microcnemum* Ung.-Sternb.

1 (682). **M. coralloides** (Loscos et J. Pardo) Buen, 1883, Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 431. — *Arthrocnemum coralloides* Loscos et J. Pardo, 1863, Ser. Inconf. Pl. Aragon.: 90. — *Microcnemum coralloides* (Loscos et J. Pardo) Font Quer, 1925, Butl. Inst. Catalana Hist. Nat. 5: 98, comb. superfl.

Описан из Испании.

Средиз.; Юго-Зап. Азия.

1а. **M. coralloides** (Loscos et J. Pardo) Buen subsp. **anatolicum** Wagenitz, 1959, Ber. Deutsch. Bot. Ges. 72: 153, cum auct. (Loscos et J. Pardo) Font-Quer; Тахт. и Фёд. 1972, Фл. Ерев.: 93.

Описан из Турции.

ЮЗ: Ерев.

Юго-Зап. Азия (Турция).

Отличается от типового подвида желтоватыми веточками и семенами, густо покрытыми сосочками.

22 (113). *Salicornia* L.

1 (683). **S. prostrata** Pall. 1776, Reise Russ. Reich. 1, Anhang: 29; id. 1803, III. Pl.: 8, tab. 3; P. W. Ball, 1967, Fl. Turk. 2: 32; Чер. 1981, Сосуд. Раст. СССР: 182. — *S. herbacea* L. var. *prostrata* (Pall.) Моq. 1840, Chenop. Monogr. Enum.: 115. — *S. herbacea* auct. non L.: Ильин, 1936, Фл. СССР, 6: 172, р. р.; Гроссг. 1930, Фл. Кавк. 2: 71; он же, 1945, цит. соч. изд. 2, 3: 146. — *S. perennans* auct. non Willd.: Цвел. 1993, Укр. бот. журн. 50, 1: 82; он же, 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 73; Зернов, 2006, Фл. Сев.-Зап. Кавк.: 241.

Описан из Европы.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП;** **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.; **Т.**

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Кубин. (Гроссгейм, 1945: 146; Исаев, 1952: 221; Танфильев, Кононов, 1987: 35).

Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср., Центр., Вост., Южн. Азия.

Название «*S. perennans* Willd.» было принято как приоритетное для этого вида (Цвелёв, 1993, 1996), но, как сообщил Н. Freitag, типовой материал *S. perennans* Willd. относится к виду другого рода.

Из окрестностей Пролетарска (правобережье р. Маныч) Ростовской области был описан близкий к *S. prostrata* вид *S. heterantha* S. S. Beer et Demina, 2005, Willdenowia, 35: 255, отличающийся от него центральным цветком в мутовках из трех цветков, сросшимся с осью соцветия, и более крупными (0.7–1.1, а не 0.3–0.5 мм дл.) пыльниками. Вероятно, он встречается и в Предкавказье, но его отличия от *S. prostrata* нуждаются в подтверждении на большем количестве материала. — Прим. Н. Н. Цвелёва.

Subfam. 3. SALSOLOIDEAE Raf.

Trib. 1. Suaeadae Moq.

23 (114). Suaeda Forssk. ex J. F. Gmel., nom. cons.

1 (684). **S. microphylla** Pall. 1803, Ill. Pl.: 52, tab. 44. — *Chenopodium crassifolium* Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 176. — *Schoberia microphylla* (Pall.) C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 159.

Описан по материалам из Восточного Предкавказья и северного Ирана («ad rivum salsum Gorkaja, inter Cumam et Terec fluvios in Caspium defluentem, frequens in littoralibus Persiae»).

ВП: Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **БК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.

Указан для **ЗП:** З. Ставр. (Гроссгейм, 1945: 148; Галушко, 1978: 227; Танфильев, Кононов, 1987: 36); **БК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 142); **ВЗ:** Иорск.-Шек. (Гроссгейм, 1945: 148; Исаев, 1952: 223).

Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр. Азия.

2 (685). **S. altissima** (L.) Pall. 1803, Ill. Pl.: 49. — *Chenopodium altissimum* L. 1753, Sp. Pl.: 221. — *Schanginia altissima* (L.) C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 159. — *Suaeda heterocarpa* Fenzl, 1851, in Ledeb. Fl. Ross. 3: 781.

Описан из окр. Астрахани.

ЗП; ВП; БК: Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.

Указан для **ЦК:** В. Кум. (Гроссгейм, 1945: 149; Танфильев, Кононов, 1987: 36); **БК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 142); **ЗЗ:** Адж.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Капеллер, 1975: 205); **ЮЗ:** Дар., Занг. (Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 329); **Т** (Гроссгейм, 1945: 149).

Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср., Центр. Азия.

3 (686). **S. dendroides** (C. A. Mey.) Moq. 1840, Chenop. Monogr. Enum.: 126. — *Schoberia dendroides* C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 159. — *Salsola fruticosa* Bieb. 1800, Besch. Länd. Terek Casp.: 149, non L. 1762.

Описан с Восточного Кавказа («in campis et collibus argilloso-salsis a Derbent...»).

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **БК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Нах.

Указан для **БК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 142).