

Из окрестностей Пролетарска (правобережье р. Маныч) Ростовской области был описан близкий к *S. prostrata* вид *S. heterantha* S. S. Beer et Demina, 2005, Willdenowia, 35: 255, отличающийся от него центральным цветком в мутовках из трех цветков, сросшимся с осью соцветия, и более крупными (0.7–1.1, а не 0.3–0.5 мм дл.) пыльниками. Вероятно, он встречается и в Предкавказье, но его отличия от *S. prostrata* нуждаются в подтверждении на большем количестве материала. — Прим. Н. Н. Цвелёва.

Subfam. 3. SALSOLOIDEAE Raf.

Trib. 1. Suaedeae Moq.

23 (114). *Suaeda* Forssk. ex J. F. Gmel., nom. cons.

1 (684). **S. microphylla** Pall. 1803, Ill. Pl.: 52, tab. 44. — *Chenopodium crassifolium* Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 176. — *Schoberia microphylla* (Pall.) C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 159.

Описан по материалам из Восточного Предкавказья и северного Ирана («ad rivum salsum Gorkaja, inter Cumam et Terec fluvios in Caspium defluentem, frequens in littoralibus Persiae»).

ВП: Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **БК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.

Указан для **ЗП:** З. Ставр. (Гроссгейм, 1945: 148; Галушко, 1978: 227; Танфильев, Кононов, 1987: 36); **БК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 142); **ВЗ:** Иорск.-Шек. (Гроссгейм, 1945: 148; Исаев, 1952: 223).

Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр. Азия.

2 (685). **S. altissima** (L.) Pall. 1803, Ill. Pl.: 49. — *Chenopodium altissimum* L. 1753, Sp. Pl.: 221. — *Schanginia altissima* (L.) C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 159. — *Suaeda heterocarpa* Fenzl, 1851, in Ledeb. Fl. Ross. 3: 781.

Описан из окр. Астрахани.

ЗП; ВП; БК: Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.

Указан для **ЦК:** В. Кум. (Гроссгейм, 1945: 149; Танфильев, Кононов, 1987: 36); **БК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 142); **ЗЗ:** Адж.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Капеллер, 1975: 205); **ЮЗ:** Дар., Занг. (Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 329); **Т** (Гроссгейм, 1945: 149).

Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср., Центр. Азия.

3 (686). **S. dendroides** (C. A. Mey.) Moq. 1840, Chenop. Monogr. Enum.: 126. — *Schoberia dendroides* C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 159. — *Salsola fruticosa* Bieb. 1800, Besch. Länd. Terek Casp.: 149, non L. 1762.

Описан с Восточного Кавказа («in campis et collibus argilloso-salsis a Derbent...»).

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **БК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Нах.

Указан для **БК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 142).

Вост. Европа; Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр. Азия.

4 (687). **S. acuminata** (C. A. Mey.) Moq. 1831, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 1, 23: 309. — *Schoberia acuminata* C. A. Mey. 1829, in Ledeb. Fl. Alt. 1: 398. — *Suaeda confusa* Pjlin, 1930, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 4: 196. — *S. setigera* auct. non Moq.: Boiss. 1879, Fl. Or. 4: 942. — *S. splendens* auct. non Gren. et Godr.: Гроссг. 1930, Фл. Кавк. 2: 72.

Описан из Восточного Казахстана.

ЗП; ВП; ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ; ЮЗ:** Ерев., Нах.; **Т.**

Указан для **ЦК:** В. Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 36, sub nom. *S. confusa* Pjlin), Малк., В. Тер. (Галушко, 1978: 227, sub nom. *S. confusa*); **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 142); **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Зернов, 2006: 242).

Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап. (Турция), Ср., Центр. Азия.

5 (688). **S. physophora** Pall. 1803, Ill. Pl.: 51. — *Schoberia physophora* (Pall.) C. A. Mey. 1829, in Ledeb. Fl. Alt. 1: 396.

Описан с побережья Каспийского моря.

ВК: Ман.-Самур.

Вост. Европа; Сев., Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр. Азия.

6 (689). **S. salsa** (L.) Pall. 1803, Ill. Pl.: 46. — *Chenopodium salsum* L. 1753, Sp. Pl.: 221. — *Schoberia salsa* (L.) C. A. Mey. 1833, in Eichw. Pl. Nov. Casp.-Cauc.: 6.

Описан из окр. Астрахани.

ЗП; ВП; ЦК: В. Кум.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **ЮЗ:** Нах.; **Т.**

Указан для **ЦК:** В. Тер.; **ВК:** В. Сулак. (Галушко, 1978: 227; Муртазалиев, 2009, 1: 142), Кубин. (Гроссгейм, 1945: 150; Исаев, 1952: 227).

Юго-Вост., Вост. Европа; Сев., Ср., Центр. Азия.

7 (690). **S. crassifolia** Pall. 1803, Ill. Pl.: 54. — *S. salsa* auct. non (L.) Pall.: Ильин, 1936, Фл. СССР, 6: 191.

Описан с южного побережья Каспийского моря.

Указан для прикаспийских районов Кавказа (Грубов, 1966: 73).

Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр. Азия.

8 (691). **S. prostrata** Pall. 1803, Ill. Pl.: 55. — *S. maritima* auct. non (L.) Dumort.: Boiss. 1879, Fl. Or. 4: 941; Гроссг. 1930, Фл. Кавк. 2: 72.

Описан из Поволжья.

ЗП; ВП; ЦК: В. Кум.; **ВК:** Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.; **Т.**

Указан для **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 142).

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап., Ср. Азия.

9 (692). **S. heterophylla** (Kar. et Kir.) Bunge, 1880, Tr. Петерб. бот. сада, 6, 2: 429. — *Schoberia heterophylla* Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Moscou, 14: 734. — *Suaeda corniculata* auct. non C. A. Mey.: Гроссг. 1930, Фл. Кавк. 2: 72.

Описан из Восточного Казахстана.

ЗП: Аз.-Куб.

Указан для **ВЗ:** Иорск.-Шек. (Ильин, 1936: 197; Капеллер, 1947: 172); **ЮЗ:** Ерев. (Гроссгейм, 1945: 150; Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 330).

Вост. Европа; Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр. Азия.

Trib. 2. **Bienertiae** Ulbr.

24 (115). **Bienertia** Bunge ex Boiss.

1 (693). **B. cycloptera** Bunge ex Boiss. 1879, Fl. Or. 4: 945. — *Schoberia cycloptera* Bunge ex Trautv. 1867, Bull. Soc. Nat. Moscou, 40, 3: 64.

Описан из восточного Ирана.

БК: Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.

Вост. Европа; Юго-Зап. (Иран), Ср. Азия.

Trib. 3. **Salsoleae** Dumort.

25 (116). **Noaea** Moq.

1 (694). **N. mucronata** (Forssk.) Asch. et Schweinf. 1887, Mém. Inst. Égypt. 2: 131. — *Salsola mucronata* Forssk. 1775, Fl. Aegypt.-Arab.: 56. — *Anabasis spinosissima* L. f. 1781, Suppl. Pl.: 173. — *A. echinus* Bieb. 1800, Besch. Länd. Terek Casp.: 152. — *Halogeton spinosissimus* (L.) C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 159. — *Noaea spinosissima* (L. f.) Moq. 1849, in DC. Prodr. 13, 2: 209.

Описан из Египта.

БК: Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Мегр.-Зан.; **Т:**

Указан для **БК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 147); **ЮЗЗ:** Месх. (Капеллер, 1947: 180); **ЮЗ:** Дар., Занг. (Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 369).

Средиз.; Юго-Зап. (Турция), Ср. Азия; Сев. Африка.

2 (695). **N. tournefortii** (Spach) Moq. 1849, in DC. Prodr. 13, 2: 208. — *Salsola tournefortii* Spach, 1843, Exs. Pl. Alep. Kurd. Moss.: № 345. — *Noaea leptoclada* (Woronow) Pjin, 1936, Фл. СССР, 6: 269. — *N. mucronata* (Forssk.) Asch. et Schweinf. subsp. *tournefortii* (Spach) Aellen, 1953, Mitt. Basler Bot. Ges. 1, 1: 13.

Описан по материалам из Турции и Ирака.

ЮЗЗ: Джав.-В. Ах; **ЮЗ:** Нах.

Указан для **ВЗ:** Алаз.-Агрич.; **ЮЗЗ:** Месх. (Капеллер, 1947: 181); **ЮЗ:** Дар. (Гроссгейм, 1945: 162; Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 369).

Юго-Зап. Азия (Турция, Ирак, Иран).

3 (696). **N. minuta** Boiss. et Bal. 1859, in Boiss. Diagn. Pl. Or. sér. 2, 4: 76.

Описан из Турции.

ЮЗ: Ерев., Дар.

Юго-Зап. Азия (Турция).