

Тр. Бот инст. АН СССР, сер. 1, 3: 160. — *S. stellulata* Korovin, 1936, Фл. СССР, 6: 877, 262. — *S. flavovirens* Пјин, 1938, Бот. мат. (Ленинград), 7, 10: 207. — *Kaviria tomentosa* (Моқ.) Akhani subsp. *takhtadshanii* (Пјин) Akorian, 2011, Новости сист. высш. раст. 42: 107.

Описан из Ирана. Ту р u s: «Persia circa Teheran, 1825, fl. Belanger») (G).

ЮЗ: Ерев., Нах.

Юго-Зап. (Иран), Ср. Азия.

19 (715). **S. daghestanica** (Turcz. ex Bunge) Turcz. 1884, Тр. Петерб. бот. сада, 9, 1: 133. — Ильин, 1936, Фл. СССР, 6: 264, cum auct. (Turcz.) Lipsky. — *Noaea daghestanica* Turcz. ex Bunge, 1862, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 4, 11: 26.

Описан из Дагестана. Ту р u s: «In Caucasi orientalis provincia Daghestan (Turczan.)» (CWU; isotypus — LE!).

БК: В. Сулак., Ман.-Самур.

Эндемик.

20 (716). **S. foliosa** (L.) Schrad. 1820, in Roem. et Schult. Syst. Veg. 6: 804. — *Anabasis foliosa* L. 1753, Sp. Pl.: 223. — *Salsola clavifolia* Pall. 1773, Reise Russ. Reich. 2: 486, 804. — *Caspia foliosa* (L.) Galushko, 1976, Новости сист. высш. раст. 13: 250. — *Neocaspia foliosa* (L.) Tzvel. 1993, Укр. Бот. журн. 50, 1: 81.

Описан с побережья Каспийского моря.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП;** **ВЗ:** Н. Кур.

Указан для **ЗП:** 3. Ставр. (Танфильев, Кононов, 1987: 36); **БК:** Ман.-Самур. (Мургазалиев, 2009, 1: 144).

Вост. Европа; Сев., Ср., Центр. Азия.

27 (118). **Anabasis** L.

1 (717). **A. eugeniae** Пјин, 1938, Бот. мат. (Ленинград), 7, 10: 215.

Описан из Азербайджана. Ту р u s: «Нахичеванская АССР, окр. г. Джульфа, склоны гор, сложенные пестроцветными гипсоносными глинами, 18 X 1936, № 314, М. и Е. Ильины» (LE!, cum isotypis).

ЮЗ: Нах.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Иран).

2 (718). **A. salsa** (C. A. Mey.) Benth. ex Volkens, 1893, in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3, 1a: 87. — *Brachylepis salsa* C. A. Mey. 1829, in Ledeb. Icon. Pl. Fl. Ross. 1: 12.

Описан из Казахстана.

ВЗ: Н. Кур.

Указан для **ВЗ:** Ширв. (Гроссгейм, 1945: 164; Исаев, 1952: 252).

Вост. Европа; Сев. (Зап. Сибирь), Ср., Центр. Азия.

3 (719). **A. brachiata** Fisch. et C. A. Mey. ex Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Moscou, 15: 433.

Описан по материалам из Джунгарии и с восточного побережья Каспийского моря.

ВЗ: Ширв.

Ср. Азия.

4 (720). **A. aphylla** L. 1753, Sp. Pl.: 223.

Описан с побережья Каспийского моря («Hab. ad maris Caspii litora»).

ВП; ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **ЮЗ:** Нах.

Указан для **ЗП:** З. Ставр. (Танфильев, Кононов, 1987: 37); **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 143); **ВЗ:** Иорск.-Шек. (Исаев, 1952: 255).

Вост. Европа; Сев., Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр. Азия.

Из Закавказья известны 2 разновидности этого вида — var. *australis* (Пјин) Grossh. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 164 (*A. aphylla* subsp. *australis* Пјин, 1938, Бот. мат. (Ленинград), 7, 10: 214. — Тур у с: «Пропе urbem Nachiczevan, 20 X 1936, № 339, М. Пјин et E. Пјина» — LE!), распространенная в Нахичевани, и var. *rubra* (Пјин) Grossh. 1945, цит. соч.: 164 (*A. aphylla* subsp. *rubra* Пјин, 1938, цит. соч.: 214. — Тур у с: «Inter Baku et Schemacha, 23 IX 1936, № 114, М. Пјин et E. Пјина» — LE!) — в районе между Баку и Шемахой.

28 (119). **Seidlitzia** Bunge ex Boiss.

1 (721). **S. florida** (Bieb.) Bunge ex Boiss. 1879, Fl. Or. 4: 951. — *Anabasis florida* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 190.

Описан из Закавказья («In collibus aridis Armeniae Iberiae, versus Cyrum fluvium»).

ВЗ: Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия.

29 (120). **Girgensohnia** Bunge

1 (722). **G. oppositiflora** (Pall.) Fenzl, 1851, in Ledeb. Fl. Ross. 3: 835. — *Sal-sola oppositiflora* Pall. 1773, Reise Russ. Reich. 2: 735. — *Anabasis oppositiflora* (Pall.) Bieb. 1806, Мém. Soc. Nat. Moscou, 1: 148. — *Halogeton oppositiflorus* (Pall.) С. А. Меу. 1829, in Ledeb. Fl. Alt. 1: 378.

Описан из низовий Урала.

ЮЗ: Нах.

Указан для **ЮЗ:** Мегр.-Зан. (Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 375).

Вост. Европа; Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр. Азия.

30 (121). **Halanthium** С. Koch

1 (723). **H. rarifolium** С. Koch, 1843, Linnaea, 17: 314; Ильин, 1936, Фл. СССР, 6: 343, «gariflorum»; Боч. 1959, Бот. мат. (Ленинград), 19: 100. — *H. aucheri* Моq. 1849, in DC. Prodr. 13, 2: 204.

Описан из Южного Закавказья («In planitie ad Арахет»).

ВК: Ман.-Самур.; **ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.

Указан для **ЮЗ:** Ю. Караб. (Исаев, 1952: 259).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).