

Описан по материалам из Джунгарии и с восточного побережья Каспийского моря.

**ВЗ:** Ширв.

Ср. Азия.

4 (720). **A. aphylla** L. 1753, Sp. Pl.: 223.

Описан с побережья Каспийского моря («Hab. ad maris Caspii litora»).

**ВП; ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **ЮЗ:** Нах.

Указан для **ЗП:** З. Ставр. (Танфильев, Кононов, 1987: 37); **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 143); **ВЗ:** Иорск.-Шек. (Исаев, 1952: 255).

Вост. Европа; Сев., Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр. Азия.

Из Закавказья известны 2 разновидности этого вида — var. *australis* (Пјин) Grossh. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 164 (*A. aphylla* subsp. *australis* Пјин, 1938, Бот. мат. (Ленинград), 7, 10: 214. — Турпус: «Пропе urbem Nachiczevan, 20 X 1936, № 339, М. Пјин et E. Пјина» — LE!), распространенная в Нахичевани, и var. *rubra* (Пјин) Grossh. 1945, цит. соч.: 164 (*A. aphylla* subsp. *rubra* Пјин, 1938, цит. соч.: 214. — Турпус: «Inter Baku et Schemacha, 23 IX 1936, № 114, М. Пјин et E. Пјина» — LE!) — в районе между Баку и Шемахой.

#### 28 (119). **Seidlitzia** Bunge ex Boiss.

1 (721). **S. florida** (Bieb.) Bunge ex Boiss. 1879, Fl. Or. 4: 951. — *Anabasis florida* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 190.

Описан из Закавказья («In collibus aridis Armeniae Iberiae, versus Cyrum fluvium»).

**ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия.

#### 29 (120). **Girgensohnia** Bunge

1 (722). **G. oppositiflora** (Pall.) Fenzl, 1851, in Ledeb. Fl. Ross. 3: 835. — *Sal-sola oppositiflora* Pall. 1773, Reise Russ. Reich. 2: 735. — *Anabasis oppositiflora* (Pall.) Bieb. 1806, Мém. Soc. Nat. Moscou, 1: 148. — *Halogeton oppositiflorus* (Pall.) С. А. Меу. 1829, in Ledeb. Fl. Alt. 1: 378.

Описан из низовий Урала.

**ЮЗ:** Нах.

Указан для **ЮЗ:** Мегр.-Зан. (Тахтаджян, Мулкиджанян, 1956: 375).

Вост. Европа; Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр. Азия.

#### 30 (121). **Halanthium** С. Koch

1 (723). **H. rarifolium** С. Koch, 1843, Linnaea, 17: 314; Ильин, 1936, Фл. СССР, 6: 343, «gariflorum»; Боч. 1959, Бот. мат. (Ленинград), 19: 100. — *H. aucheri* Моq. 1849, in DC. Prodr. 13, 2: 204.

Описан из Южного Закавказья («In planitie ad Арахет»).

**ВК:** Ман.-Самур.; **ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.

Указан для **ЮЗ:** Ю. Караб. (Исаев, 1952: 259).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).